

Übung Analysis

Lösungen der Hausübung für 18.3. (Gruppe 1) und für 19.3. (Gruppen 2, 3).

Solutions

1. Induktionsanfang $n = 1$ mit der Gleichung $1 = 1$ ist klar. Induktionsschritt: angenommen, für ein (fixes) $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{k=1}^n (2k - 1) = n^2. \quad (1)$$

Wir müssen dies nun für $n + 1 \in \mathbb{N}$ zeigen:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} (2k - 1) &= \sum_{k=1}^n (2k - 1) + (2n + 2 - 1) \\ &= \sum_{k=1}^n (2k - 1) + 2n + 1 \\ &\stackrel{(*)}{=} n^2 + 2n + 1 \\ &= (n + 1)^2, \end{aligned}$$

wobei wir in $(*)$ die Induktionsannahme (1) verwendeten. Wir folgern, dass (1) auch für $n + 1$ anstelle n gilt, und somit nach dem Prinzip der vollständigen Induktion für alle $n \in \mathbb{N}$.

2. Induktionsanfang $n = 1$ mit der Gleichung $1 = 1$, die klar ist. Induktionsschritt: angenommen, die Aussage stimmt für fixes $n \in \mathbb{N}$; dann wollen wir sie auch für $n + 1 \in \mathbb{N}$ zeigen.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k^2 &= \sum_{k=1}^n k^2 + (n + 1)^2 \stackrel{(*)}{=} \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6} + n^2 + 2n + 1 \\ &= \frac{(n^2 + n)(2n + 1) + 6n^2 + 12n + 6}{6} \\ &= \frac{2n^3 + 9n^2 + 13n + 6}{6} \\ &= \frac{(n + 1)(n + 2)(2n + 3)}{6}, \end{aligned}$$

wobei wir in (*) die Induktionsannahme verwendeten. Also gilt

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

3. Zuerst bemerken wir, dass die Aussage für $n_0 = 0$ wegen $2^{n_0} = 1 = 1 = 0!$ richtig ist, aber nicht für $n_0 = 1$. Nach ein paar Versuchen zeigt sich, dass sie wieder stimmt für $n_0 = 4$. Induktionsschritt: angenommen, die Ungleichung gilt für fixes $n \geq n_0$, also $n \geq 4$; dann

$$2^{n+1} = 2^n \cdot 2 \stackrel{(*)}{\leq} n! \cdot 2 = 2 \cdot [n(n-1) \cdots] \leq [(n+1)n(n-1) \cdots] = (n+1)!,$$

wobei wir in (*) die Induktionsannahme benützten und die letzte Ungleichung wegen $(n+1) \geq 2$ gilt (diese Relation vereitelt den Induktionssanfang bei $n_0 = 0$). Damit haben wir die Ungleichung für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 4$ gezeigt.

4. Hier ist der geeignete Induktionsanfang bei $n_0 = 3$. Induktionsschritt: angenommen, die Ungleichung gilt für fixes $n \geq n_0$, mit $n \in \mathbb{N}$. Es folgt

$$(n+2)! = (n+2)(n+1)! \leq (n+2)n^n.$$

Also haben wir Erfolg, wenn wir $(n+2)n^n \leq (n+1)^{n+1}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ zeigen können, was nach Division beider Seiten durch $(n+1)n^n$ führt zu

$$\frac{n+2}{n+1} \leq \left(\frac{n+1}{n} \right)^n. \quad (2)$$

Nun verwenden wir (a) $1 \leq (1 + \frac{1}{n})^{n-2}$ und (b) $\frac{n+2}{n+1} \leq \left(\frac{n+1}{n} \right)^2$ für alle $n \in \mathbb{N}$; Letzteres ist äquivalent (durch Multiplikation beider Seiten mit $(n+1)n^2$) zur kubischen Ungleichung $n^2(n+2) = n^3 + 2n^2 \leq n^3 + 3n^2 + 3n + 1 = (n+1)^3$, die ihrerseits offensichtlich ist. Also folgt Ungleichung (2) durch Multiplikation beider Ungleichungen (a) und (b), womit der Induktionsschritt vollzogen ist.

5. Für alle $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}^+$ und jedes $n \in \mathbb{N}$, setze $a'_k = \frac{1}{a_k} > 0$. Dann kann die Ungleichung

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} \leq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}$$

geschrieben werden als

$$\frac{n}{\sum_{k=1}^n a'_k} \leq \frac{1}{\sqrt[n]{a'_1 \cdots a'_n}}$$

und durch Übergang zu den Kehrwerten beider (positiver!) Seiten erhalten wir

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a'_k \geq \sqrt[n]{a'_1 \cdots a'_n}.$$

Daher sind beide Ungleichungen (jeweils geltend für alle Daten $a_k > 0$ bzw. $a'_k > 0$) äquivalent zueinander, da wir genauso gut mit den a'_k beginnen und dann mit $a_k = \frac{1}{a'_k}$ fortfahren könnten.

6. Die Ungleichung $n! \leq n^n$ ist trivial für alle $n \in \mathbb{N}$, da wir für $n!$ alle Vorgänger (natürliche Zahlen) von n mit n multiplizieren, während auf der rechten Seite n mit sich selbst n mal multipliziert wird, also sind alle Faktoren links nicht größer als alle Faktoren rechts. Mit der (geometrisch-arithmet.Mittel-)Ungleichung $G \leq A$, angewandt auf

$$a_n = n, a_{n-1} = n-1, \dots, a_1 = 1,$$

erhalten wir nach Erheben zur n -ten Potenz

$$n! \leq \left(\frac{n+1}{2} \right)^n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

7. Die Ungleichung ist eine Anwendung von $G \leq A$, denn diese ergibt für alle $n \in \mathbb{N}$:

$$\sqrt[n]{n} \leq \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n} + 1 + \cdots + 1}{n} = \frac{2\sqrt{n} + (n-2)}{n} = 1 + \frac{2}{\sqrt{n}} - \frac{2}{n} \leq 1 + \frac{2}{\sqrt{n}}.$$

8. Wende $G \leq A$ auf n Kopien von $(1 + \frac{1}{n})$ und eine Eins an: $a_i = 1 + \frac{1}{n}$ für $i = 1, \dots, n$ sowie $a_{n+1} = 1$. Das arithmetische Mittel ist dann

$$\frac{1 + n(1 + \frac{1}{n})}{n+1} = \frac{n+2}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1},$$

während das geometrische Mittel der $(a_i)_{i=1}^{n+1}$ gegeben ist durch $\sqrt[n+1]{(1 + \frac{1}{n})^n}$. Also folgt mittels $G \leq A$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$




Figure 1: Symmetric difference of A, B, C ; all elements in exactly one set form the blue part, and in red is $A \cap B \cap C$ with elements in three sets. Blue and red parts together form $A \Delta B \Delta C$.

9. (a) Siehe Figure 1.

(b) Für $n \in \mathbb{N}$ besteht die Menge $A_1 \Delta \dots \Delta A_n$ aus allen Elementen, die zu einer ungeraden Anzahl der Mengen A_i als $i = 1, \dots, n$ gehören. Dies stimmt für $n = 2$ (Induktionsanfang), wo die Anzahl eins ist; wenn dies nun für n Mengen A_i zutrifft, also auf $A_1 \Delta \dots \Delta A_n$, dann auch für $n + 1$ Mengen $(A_i)_{i=1}^{n+1}$, denn

$$A_1 \Delta \dots \Delta A_{n+1} = [A_1 \Delta \dots \Delta A_n] \Delta A_{n+1} = A \cup B,$$

wobei $A = [A_1 \Delta \dots \Delta A_n] \setminus A_{n+1}$ und $B = A_{n+1} \setminus [A_1 \Delta \dots \Delta A_n]$ sind. Tatsächlich sind die Elemente von A in einer ungeraden Anzahl der A_i enthalten (Induktionsannahme), und B enthält alle Elemente von A_{n+1} , die in einer geraden Anzahl der verbleibenden Mengen A_1, \dots, A_n sind, also zusammen in einer ungeraden Anzahl aller Mengen A_1, \dots, A_{n+1} .