

Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
Departamento de Estatística

Relatório - Parte I

Exercício 2

Guilherme Pazian RA:160323
Henrique Capatto RA:146406
Hugo Calegari RA:155738
Leonardo Uchoa Pedreira RA:156231

Professor: Caio Lucidius Naberezny Azevedo

Campinas-SP, 05 de Junho de 2017

Exercício 2

1. Introdução

Os dados a serem analisados são provenientes de um experimento desenvolvido para avaliar a germinação de um determinado tipo de semente de acordo com três condições experimentais: nível da temperatura: 21°C, 42°C e 62°C; nível de umidade: baixo, médio e alto; e temperatura de germinação: 11°C e 21°C. Por exemplo, a uma temperatura de 11°C, com nível de umidade baixo e temperatura de umidade de 21°C, 100 sementes foram plantadas e observou-se que 98 delas germinaram depois de 5 dias.

A tabela que contém os dados apresenta o número de sementes que germinaram após 5 dias para cada 100 sementes submetidas a cada condição experimental. Cada casela que compõem a tabela assume contagens Y_{ijk} tais que representam variáveis aleatórias binomiais independentes com tamanho fixo de $n = 100$ e probabilidade de sucesso (neste caso, estimada como a proporção de sementes que germinaram depois de 5 dias).

O objetivo é estimar a probabilidade de sementes germinadas depois de 5 dias, baseado em efeitos principais (nível de temperatura, nível de umidade e temperatura de germinação), verificar quais interações são significativas (combinações dos efeitos principais) e fornecer a combinação entre os níveis de fatores que gera a melhor taxa de germinação.

2. Análise Descritiva

Nota-se que para cada casela pode-se obter a proporção de sementes que germinaram depois de 5 dias para cada 100 sementes submetidas a cada condição experimental. Abaixo tem-se as tabelas com os dados e com as proporções estimadas, respectivamente.

	21°C	42°C	62°C
11°C e BAIXO	98	96	62
11°C e MÉDIO	94	79	3
11°C e ALTO	92	41	1
21°C e BAIXO	94	93	65
21°C e MÉDIO	94	71	2
21°C e ALTO	91	30	1

	21°C	42°C	62°C
11°C e BAIXO	0.98	0.96	0.62
11°C e MÉDIO	0.94	0.79	0.03
11°C e ALTO	0.92	0.41	0.01
21°C e BAIXO	0.94	0.93	0.65
21°C e MÉDIO	0.94	0.71	0.02
21°C e ALTO	0.91	0.30	0.01

Pela tabela de proporções estimadas, consegue-se notar que para uma dada temperatura de germinação e temperatura de umidade, à medida em que o nível de umidade aumenta (por exemplo, de baixo para médio ou de médio para alto) a proporção de sementes germinadas após cinco dias diminui. Fixado a temperatura de germinação e o nível de umidade, quando se aumenta a temperatura de umidade (por exemplo, de 21°C para 42°C) a proporção de sementes germinadas também diminui.

Nota-se ainda que fixado um nível de umidade (por exemplo, baixo ou médio), para diferentes temperaturas de germinação, a proporção de sementes germinadas diminui com o aumento da temperatura de umidade. Finalmente, fixado a temperatura de umidade, a proporção de sementes germinadas para as diferentes temperaturas de germinação e diferentes níveis de umidade também é reduzida.

Assim, baseado nessas informações, à princípio pode-se conjecturar de que ao se utilizar uma temperatura de germinação mais baixa, neste caso 11°C, com o menor nível de umidade, no contexto umidade baixa, e com menor temperatura de umidade, neste caso 21°C, fornecerá uma combinação razoável para a maior proporção de sementes germinadas depois de 5 dias.

Além disso, algumas medidas resumo podem ser avaliadas como quantidade de sementes germinadas em diferentes temperaturas de germinação para os diferentes níveis de umidade e temperatura de umidade. Ou seja, é possível obter informações do comportamento da quantidade média de sementes germinadas em diferentes temperaturas de germinação, para cada nível de umidade e observar se as diferenças dos valores médios são muito discrepante.

Temperatura germinação	Nível umidade	Média	Variância	DP	MAX	MIN
11°C	alto	44.67	2080.33	45.61	92	1
11°C	baixo	85.33	409.33	20.23	98	62
11°C	médio	58.67	2380.33	48.79	94	3
21°C	alto	40.67	2110.33	45.94	91	1
21°C	baixo	84.00	271.00	16.46	94	65
21°C	médio	55.67	2292.33	47.88	94	2

Pela tabela anterior observa-se que os valores médios de sementes germinadas após 5 dias, para uma dada temperatura de germinação e nível de umidade, desconsiderando-se a temperatura de umidade, diferem entre si. Por exemplo, a maior diferença nos valores médios está associada a seguinte combinação: temperatura de germinação de 11°C e 21°C, nível de umidade alta, com diferença média de sementes germinadas de 4. Essa diferença deve ser avaliada em conjunto com o pesquisador, pois deve-se levar em conta se essa diferença é significativa na prática, ou seja, se de fato em média essas quatro sementes teriam uma produtividade em média maior.

Foi possível elaborar, também, gráficos de perfis que avalie o comportamento da umidade em uma dada temperatura de germinação, para os diferentes níveis de temperatura da umidade, isto é, as possíveis interações existentes.

Informação relevante é obtida com o gráfico de perfil das proporções de sementes germinadas depois de 5 dias. Nota-se que para cada nível de temperatura de (11°C e 21°C) o comportamento é muito semelhante das proporções estimadas, isto é, para o aumento da temperatura de umidade há diminuição das proporção estimadas de sementes germinadas. Com isso, pode-se cogitar em uma possível interação entre as variáveis nível de umidade e temperatura de umidade.

Mais do que isso, para os diferentes valores de temperatura de germinação e diferentes níveis de temperatura, num mesmo nível de umidade, o comportamento de decaimento das proporções estimadas de sementes germinadas são muito semelhantes. Isto pode ser observado pelos gráficos de perfis representados abaixo.




Figura 1: Gráficos de perfil para temperatura de germinação à 11°C. É perceptível que, para este perfil, com o aumento do nível de temperatura de umidade reduz-se a proporção estimada de sementes germinadas.




Figura 2: Gráfico de perfil para temperatura de germinação à 21°C. É perceptível que, para este perfil, com o aumento do nível de temperatura de umidade reduz-se a proporção estimada de sementes germinadas.




Figura 3: Gráficos de perfil para temperatura de germinação à 11°C e 21°C. É perceptível que, para este perfil, com o aumento do nível de temperatura de umidade reduz-se a proporção de sementes grminadas. Note que o comportamento entre as temperaturas de germinação é semelhante. Com exceção do nível de temperatura de 62°C, à uma temperatura de germinação de 21°C, observa-se que a estimativa pontual da proporção de sementes germinadas é inferior em relação aos demais níveis de temperatura.




Figura 4: Gráfico de perfil para temperatura de germinação à 11°C e 21°C. É perceptível que, para este perfil, com o aumento do nível de temperatura de umidade reduz-se a proporção estimada de sementes grminadas. Note que o comportamento entre as temperaturas de germinação é semelhante. Observa-se que, em geral, a proporção estimada de sementes germinadas à temperatura de germinação de 21°C é inferior em relação à 11°C.




Figura 5: Gráfico de perfil para temperatura de germinação à 11°C e 21°C. É perceptível que, para este perfil, com o aumento do nível de temperatura de umidade reduz-se a proporção estimada de sementes grminadas. Note que o comportamento entre as temperaturas de germinação é semelhante. Observa-se que, em geral, a proporção estimada de sementes germinadas à temperatura de germinação de 21°C é inferior em relação à 11°C.

3. Análise Inferencial

Ao considerar o problema posto e a análise descritiva realizada, foram propostos os seguintes modelos

- Modelo 1

$$Y_{ijk} \stackrel{ind}{\sim} \text{Binomial}(100, p_{ik})$$

$$\ln \left(\frac{p_{ijk}}{1 - p_{ijk}} \right) = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k + (\alpha\beta)_{ij} + (\alpha\gamma)_{ik} + (\beta\gamma)_{jk} + (\alpha\beta\gamma)_{ijk}$$

onde $i = 1, 2, j = 1, 2, 3, k = 1, 2, 3, \alpha_1 = \beta_3 = \gamma_1 = (\beta\gamma)_{j1} = (\beta\gamma)_{3k} = (\alpha\beta)_{1j} = (\alpha\beta)_{23} = (\alpha\gamma)_{1k} = (\alpha\gamma)_{21} = (\alpha\beta\gamma)_{1kj} = (\alpha\beta\gamma)_{23k} = (\alpha\beta\gamma)_{2j1} = 0$

observação: este modelo é saturado (ou seja, a quantidade de parâmetros é igual ao número de observações). Logo, não é possível realizar análise de resíduos e cálculos de desvios.

- Modelo 2

$$Y_{ijk} \stackrel{ind}{\sim} \text{Binomial}(100, p_{ik})$$

$$\ln \left(\frac{p_{ijk}}{1 - p_{ijk}} \right) = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k + (\alpha\beta)_{ij} + (\alpha\gamma)_{ik} + (\beta\gamma)_{jk}$$

onde $i = 1, 2, j = 1, 2, 3, k = 1, 2, 3, \alpha_1 = \beta_3 = \gamma_1 = (\beta\gamma)_{j1} = (\beta\gamma)_{3k} = (\alpha\beta)_{1j} = (\alpha\beta)_{23} = (\alpha\gamma)_{1k} = (\alpha\gamma)_{21} = 0$.

- Modelo 3

$$Y_{ijk} \overset{ind}{\sim} \text{Binomial}(100, p_{ik})$$

$$\ln\left(\frac{p_{ijk}}{1 - p_{ijk}}\right) = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k + (\beta\gamma)_{jk}$$

onde $i = 1, 2, j = 1, 2, 3, k = 1, 2, 3, \alpha_1 = \beta_3 = \gamma_1 = (\beta\gamma)_{j1} = (\beta\gamma)_{3k} = 0$ e

- Y_{ijk} : reflete a quantidade de sementes germinadas, após 5 dias, de um total de 100, para a i-ésima temperatura de germinação, o j-ésimo nível de umidade e k-ésima temperatura de umidade.
- μ :
- β_j

Todos os modelos considerados foram ajustados através da metodologia de máxima verossimilhança (veja Paula (2013)).

A tabela a seguir fornece algumas informações sobre o ajuste do modelo.

Tabela 1: Critérios de Seleção para os Modelos Ajustados

	Desvios	Valor-p	AIC	BIC
modelo 1	0	0	103.10	119.13
modelo 2	1.65	0.80	96.76	109.22
modelo 3	4.43	0.82	91.53	100.44

Tabela 2: Nesta tabela, estão relatados os Desvios, AIC (Critério de Informação de Akaike), BIC (Critério de Informação Bayesiana) e o Valor-p associado à cada modelo (de forma que os graus de liberdade são dados pela diferença entre as quantidade de observações e parâmetros ajustados). Pode-se perceber, ao comparar os critérios de informação, o modelo superior é terceiro. Entretanto, modelo 2 apresenta desvio menor do que o modelo 3 (que se reflete no valor-p). Note, também, que o modelo 1 apresenta desvio nulo, isto deve-se à sua saturação, o que não fornece muita informação. (Para mais detalhes, veja (Paula, 2013))

Dela, podemos depreender que,

4. Conclusões

O que se pode concluir da análise, em termos do problema apresentado, e críticas em relação a análise feita.

Anexos

Tabelas com estimativas pontuais e intervalares, erros padrão e valores-p. As tabelas a seguir são referentes aos modelos 1,2 e 3, respectivamente

Tabela 3: Tabela Resumo para Modelo 1

	Estimativa	Erro Padrão	2.5 %	97.5 %	Estatística Z	Valor-p
μ	2.442	0.369	1.720	3.165	6.626	0.000
β_1	1.450	0.804	-0.126	3.025	1.803	0.071
β_2	0.309	0.560	-0.788	1.406	0.552	0.581
γ_1	-2.806	0.421	-3.631	-1.981	-6.666	0.000
γ_2	-7.037	1.071	-9.136	-4.939	-6.574	0.000
α_2	-0.129	0.508	-1.124	0.867	-0.253	0.800
$(\beta\gamma)_{11}$	2.092	0.974	0.184	4.001	2.149	0.032
$(\beta\gamma)_{21}$	1.380	0.644	0.117	2.642	2.142	0.032
$(\beta\gamma)_{12}$	3.635	1.303	1.081	6.190	2.789	0.005
$(\beta\gamma)_{22}$	0.810	1.291	-1.721	3.340	0.627	0.530
$(\alpha\beta)_{21}$	-1.012	0.972	-2.917	0.894	-1.040	0.298
$(\alpha\beta)_{22}$	0.129	0.783	-1.405	1.663	0.165	0.869
$(\alpha\gamma)_{21}$	-0.355	0.589	-1.509	0.800	-0.602	0.547
$(\alpha\gamma)_{22}$	0.129	1.509	-2.830	3.087	0.085	0.932
$(\alpha\beta\gamma)_{211}$	0.903	1.204	-1.455	3.262	0.751	0.453
$(\alpha\beta\gamma)_{221}$	-0.075	0.900	-1.839	1.690	-0.083	0.934
$(\alpha\beta\gamma)_{212}$	1.141	1.747	-2.283	4.565	0.653	0.514
$(\alpha\beta\gamma)_{222}$	-0.544	1.867	-4.204	3.115	-0.292	0.771

Tabela 4: Tabela Resumo para Modelo 2

	Estimate	Std. Error	2.5 %	97.5 %	z value	Pr(> z)
μ	2.506	0.334	1.852	3.161	7.508	0.000
β_1	0.926	0.526	-0.105	1.957	1.759	0.079
β_2	0.371	0.443	-0.496	1.239	0.839	0.402
γ_1	-2.884	0.365	-3.599	-2.169	-7.907	0.000
γ_2	-7.239	0.811	-8.829	-5.650	-8.929	0.000
α_1	-0.247	0.394	-1.019	0.524	-0.628	0.530
$(\beta\gamma)_{11}$	2.678	0.562	1.576	3.779	4.765	0.000
$(\beta\gamma)_{21}$	1.341	0.450	0.458	2.223	2.978	0.003
$(\beta\gamma)_{12}$	4.338	0.850	2.672	6.003	5.103	0.000
$(\beta\gamma)_{22}$	0.556	0.929	-1.265	2.377	0.599	0.549
$(\alpha\beta)_{21}$	-0.212	0.486	-1.165	0.741	-0.436	0.662
$(\alpha\beta)_{22}$	0.008	0.375	-0.728	0.744	0.021	0.983
$(\alpha\gamma)_{21}$	-0.207	0.406	-1.002	0.589	-0.509	0.611
$(\alpha\gamma)_{22}$	0.507	0.530	-0.531	1.545	0.957	0.339

Tabela 5: Tabela Resumo para Modelo 3

	Estimativa	Erro Padrão	2.5 %	97.5 %	Estatística Z	Valor-p
μ	2.522	0.267	1.999	3.046	9.447	0.000
β_1	0.803	0.441	-0.062	1.667	1.819	0.069
β_2	0.376	0.391	-0.391	1.143	0.960	0.337
γ_1	-2.984	0.294	-3.560	-2.408	-10.149	0.000
γ_2	-6.989	0.755	-8.468	-5.509	-9.258	0.000
α_2	-0.276	0.149	-0.569	0.016	-1.853	0.064
$(\beta\gamma)_{11}$	2.650	0.559	1.553	3.746	4.736	0.000
$(\beta\gamma)_{21}$	1.328	0.449	0.447	2.208	2.955	0.003
$(\beta\gamma)_{12}$	4.358	0.849	2.693	6.023	5.130	0.000
$(\beta\gamma)_{22}$	0.556	0.929	-1.265	2.377	0.598	0.550