



Algèbre Linéaire et Analyse de Données

Fiche de TD Licence 2 MIAHS (2021-2022)

Guillaume Metzler

Université de Lyon, Université Lumière Lyon 2
Laboratoire ERIC EA3083, Lyon, France

guillaume.metzler@univ-lyon2.fr

Résumé

Les exercices proposés dans cette fiche constituent une bonne base d'entraînement pour mettre en application les différentes notions vues en cours.

Les exercices sont essentiellement triés par thème mais il n'est pas impossible qu'il faille avoir recours à des notions vues ultérieurement afin de pouvoir le traiter.

Les exercices proposés sont également séparés en deux catégories, une partie dite "*Applications*" constituée des exercices simples que vous devez savoir faire dans le cadre de ce cours. D'autres exercices sont proposés dans une partie "*Pour aller plus loin*". Ces exercices là présentent des difficultés supplémentaires : parfois plus complexes en terme de calculs, plus théoriques ou nécessitent de faire des démonstrations en revenant aux définitions données dans le cours. Bien que je ne demande pas, dans le cadre de ce cours, à ce que vous sachiez résoudre ce type d'exercices, ils restent très formateurs.

En cas de problème dans la résolution de ces exercices, vous pouvez toujours me solliciter par mail.

Tous les exercices ne pourront pas être traités en TD, il est donc important que vous vous entraîniez chez vous pour maîtriser ces notions et que vous refassiez les exercices traités en cours.

1 Espaces vectoriels et Applications linéaires

1.1 Applications du cours

Exercice 1

Soit E un ensemble, typiquement $E = \mathbb{R}^2$ muni d'une loi interne, notée $+$ et d'une loi externe notée \cdot définies pour tout $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ par

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \quad \text{et} \quad \lambda \cdot \mathbf{x} = \lambda \cdot (x_1, x_2) = (0, \lambda x_2).$$

L'ensemble $(E, +, \cdot)$ a-t-il une structure d'espace vectoriel sur \mathbb{R} ?

Exercice 2

Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$ l'espace des polynômes de degré n , *i.e.* si P est un élément de E , alors il existe des coefficients $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ et $a_n \neq 0$ tels que

$$P(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n = \sum_{k=0}^n a_kX^k.$$

L'ensemble E muni des lois internes et externes, respectivement définies, pour tout $P, Q \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ par

$$P(X) + Q(X) = \sum_{k=0}^n (a_k + b_k)X^k \quad \text{et} \quad \lambda \cdot P(X) = \sum_{k=0}^n \lambda a_k X^k$$

a-t-il une structure d'espace vectoriel sur \mathbb{R} ? Sans chercher à justifier votre réponse, quelle est une base de cet espace vectoriel et quelle est sa dimension ?

Exercice 3

Montrer que la famille de vecteurs $\mathbf{v}_1 = (1, 1)$ et $\mathbf{v}_2 = (2, 0)$ forme une famille génératrice de \mathbb{R}^2 .

Exercice 4

Montrer que la famille de vecteurs $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (0, 0, 1)$ et $\mathbf{v}_3 = (1, -1, 2)$ forme une famille libre de \mathbb{R}^3 .

Exercice 5

Montrer que la famille $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ forme une base de l'espace \mathbb{R}^3 où

$$\mathbf{v}_1 = (1, 3, 2), \quad \mathbf{v}_2 = (2, 5, 2) \quad \text{et} \quad \mathbf{v}_3 = (-2, -2, 1).$$

Exercice 6

On considère une famille de vecteurs de \mathbb{R}^4 définies par

$$\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1, 0), \mathbf{v}_2 = (0, 0, 1, 1) \quad \text{et} \quad \mathbf{v}_3 = (-1, 0, -1, -2).$$

Cette famille est-elle une famille libre de \mathbb{R}^4 ? Compléter cette famille en une base de l'espace \mathbb{R}^4 .

Exercice 7

Montrer que le noyau d'une application linéaire ϕ de E forme un sous-espace de E , *i.e.*

$$\text{Ker}(\phi) = \{\mathbf{x} \in E : \phi(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}$$

muni des lois internes et externes de E (addition et multiplication) est un sous-espace vectoriel de E .

Exercice 8

On considère E l'espace vectoriel des fonctions continues de \mathbb{R} dans \mathbb{R} . On note P l'ensemble des fonctions paires de E et I l'ensemble des fonctions impaires de E .

Montrer que les ensembles P et I , munis des structures induites par celle de E sont des sous-espaces vectoriels de E . Que peut-on dire de l'intersection de ces deux sous-espaces.

Exercice 9

Montrer que l'application $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par

$$\phi(x_1, x_2) = (3x_1 + 6x_2, -2x_1)$$

est une application linéaire de \mathbb{R}^2 dans \mathbb{R}^2 . Est-ce que cette application est injective? Est-elle surjective?

Exercice 10

On considère l'application $\phi : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}[X]$, *i.e.* une application de l'espace des polynômes dans l'espace des polynômes (de degré quelconque), définie par

$$\phi(P(X)) = XP(X).$$

Montrer que cette application définit un endomorphisme injectif mais non surjectif de $\mathbb{K}[X]$.

Exercice 11

On considère l'application $\phi : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}[X]$, *i.e.* une application de l'espace des polynômes dans l'espace des polynômes (de degré quelconque), définie par

$$\phi(P(X)) = P'(X),$$

où $P'(X)$ désigne le polynôme dérivé. Montrer que cette application définit un endomorphisme surjectif mais non injectif de $\mathbb{K}[X]$.

Exercice 12

On considère l'application $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par

$$\phi(\mathbf{x}) = (2x_1 + x_2 - x_3, 2x_1 - x_2 + 2x_3, 8x_1 + 2x_3).$$

Déterminer le noyau de l'application linéaire ϕ . Quelle est sa dimension ?

Exercice 13

Déterminer une base du noyau de l'application linéaire ϕ dont la représentation matricielle est donnée par

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 14

Déterminer une base de l'image de l'application linéaire ϕ dont la représentation matricielle est donnée par

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 15

On considère l'application $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par

$$\phi(x_1, x_2, x_3) = (4x_1 + 2x_2 - x_3, x_1 + x_2 + x_3, -x_1 + x_2 - x_3).$$

Déterminer le noyau de cette application. Peut-on dire que ϕ est un automorphisme de \mathbb{R}^3 ?

Exercice 16

Considérons une application linéaire $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par

$$\phi(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2 + x_3, -x_1 + x_2 - x_3).$$

Supposons que \mathbb{R}^2 est muni de sa base canonique $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ et \mathbb{R}^3 de sa base canonique $(\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3)$.

1. Déterminer la représentation matricielle de l'application ϕ .
2. Déterminer l'image du vecteur $\mathbf{u} = 2\mathbf{e}'_1 - 2\mathbf{e}'_2 - \mathbf{e}'_3$ avec \mathbf{e}_t sans l'aide de la représentation matricielle.

1.2 Pour aller plus loin

Exercice 1 : Images et Noyaux

Soit E un espace vectoriel sur un corps \mathbb{R} . Soit f un endomorphisme de E . Montrer que les équivalences suivantes sont vraies¹ :

1. $\text{Ker}(f^2) = \text{Ker}(f) \iff \text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f) = \{\mathbf{0}\}$.
2. $\text{Im}(f^2) = \text{Im}(f) \iff \text{Ker}(f) + \text{Im}(f) = E$.

Exercice 2 : Images et noyaux en dimension finie

Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension finie n . Soit f un endomorphisme de E . Démontrer les équivalences suivantes

$$\text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f) = E \iff \text{Im}(f^2) = \text{Im}(f) \iff \text{Ker}(f) = \text{Ker}(f^2)$$

Exercice 3 : Homothéties

Soit E un espace vectoriel sur \mathbb{R} de dimension finie n . On appelle homothétie, une application linéaire h_a de la forme

$$\begin{aligned} h_a : E &\rightarrow E, \\ \mathbf{x} &\mapsto a\mathbf{x}, \end{aligned}$$

où a est un nombre réel.

1. Soit f un endomorphisme de E . Supposons que, quelque soit $\mathbf{x} \in E$, il existe $a_{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}$ tel que :

$$f(\mathbf{x}) = a_{\mathbf{x}}\mathbf{x}.$$

- (a) Soient $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$ deux vecteurs linéairements indépendants. Montrer que $a_{\mathbf{x}} = a_{\mathbf{y}}$. On pourra chercher à calculer $f(\mathbf{x} + \mathbf{y})$ de deux façons différentes.
- (b) Montrer que f est une homothétie.

1. Pour montrer que deux ensembles A et B sont égaux, il nous faut montrer que $A \subset B$ et $B \subset A$.

2. On appelle centre de $\mathcal{L}(E)$ (*i.e.* centre de l'ensemble des endomorphismes de E) l'ensemble des éléments $f \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant

$$\forall g \in \mathcal{L}(E), f \circ g = g \circ f,$$

i.e. il s'agit des endomorphismes de E qui commutent avec tous les autres.

- (a) Soit $\mathbf{x} \in E$. Montrer qu'il existe un projecteur $p_{\mathbf{x}}$ de E dont l'image est égale à $Vect(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x} \rangle$.
 (b) Déterminer le centre de $\mathcal{L}(E)$.

2 Matrices, changements de bases, et équations linéaires

2.1 Applications du cours

Exercice 1

Déterminer le rang des matrices suivantes

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & -2 \\ -1 & -3 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 7 \\ -4 & 2 & 10 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 2

Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^3 \\ 1 & b & b^3 \\ 1 & c & c^3 \end{pmatrix}$$

Calculer son déterminant et déterminer à quelle(s) condition(s) la matrice A est inversible.

Exercice 3

Déterminer l'inverse de la matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Exercice 4

Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ et soient $A, B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ définies par :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a+b & c+a & b+c \\ ab & ca & bc \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 2a & 2a & a-b-c \\ 2b & b-c-a & 2b \\ c-a-b & 2c & 2c \end{pmatrix}$$

Calculer leur déterminant et déterminer à quelle(s) condition(s) les matrices A et B sont inversibles.

Exercice 5

On considère la matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ définie par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. La matrice A est-elle inversible ? Déterminer son inverse.
2. Déterminer une matrice N telle que $A = (I_3 + N)$.
3. Calculer N^2 et N^3 . Que remarquez vous ?
4. Exprimer A^{-1} en fonction de I_3, N et N^2 .
5. En déduire l'expression de A^p pour tout entier $p > 0$.

Exercice 6

Soit $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ une base de \mathbb{R}^3 et on considère les vecteurs $\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2$ et \mathbf{e}'_3 définis par

$$\begin{aligned} \mathbf{e}'_1 &= \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3, \\ \mathbf{e}'_2 &= \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3, \\ \mathbf{e}'_3 &= -\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3. \end{aligned}$$

1. Déterminer la matrice de passage de \mathcal{B} vers la base \mathcal{B}' .
2. Montrer que $\mathcal{B}' = (\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3)$ est une base de \mathbb{R}^3 .
3. Déterminer la matrice de passage de \mathcal{B}' vers la base \mathcal{B} .
4. Soit ϕ l'endomorphisme de \mathbb{R}^3 dont la représentation matricielle A dans la base $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ est donnée par

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} a-b & a+c & c-b \\ b-a & c-a & b+c \\ a+b & a-c & b-c \end{pmatrix}$$

Déterminer la matrice de ϕ dans la base $(\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3)$.

Exercice 7

Soit u un endomorphisme de $E = \mathbb{R}^3$ dont la matrice, relativement à la base canonique, est donnée par :

$$A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer le noyau et l'image de u .
2. Montrer que $\text{Ker}(u) + \text{Im}(u) = E$.
3. Déterminer une base \mathcal{B}' de \mathbb{R}^3 adaptée à la somme directe $\text{Ker}(u) + \text{Im}(u) = E$.
4. Déterminer la matrice de l'endomorphisme de u relativement à la base \mathcal{B}' .
5. Quelle la nature de u ?

2. On utilisera le fait que les matrices I_3 et N commutent et la formule du binôme

Exercice 8

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^3$, on note $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ sa base canonique. Soit u un endomorphisme de E dont la représentation matricielle dans la base \mathcal{B} , notée A , est donnée par :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

On pose $\mathbf{f}_1 = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3$, $\mathbf{f}_2 = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ et $\mathbf{f}_3 = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_3$.

1. Montrer que $\mathcal{B}' = (\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_3)$ une base de E .
2. Déterminer $u(\mathbf{f}_1)$, $u(\mathbf{f}_2)$ et $u(\mathbf{f}_3)$ et en déduire une représentation matricielle de A dans cette nouvelle base \mathcal{B}' . Elle sera appelée D dans la suite.
3. Calculer D^n pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$.
4. Calculer A^n pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$ en fonction de la matrice A^n .

Exercice 9 : Projection et symétries

Les deux questions de cet exercice sont indépendantes.

1. Soient les vecteurs de \mathbb{R}^3

$$\mathbf{b}_1 = (1, 1, 2) \quad \mathbf{b}_2 = (-2, -1, 3) \quad \text{et} \quad \mathbf{b}_3 = (0, -3, -1).$$

Notons alors E l'espace engendré par les vecteurs \mathbf{b}_1 et \mathbf{b}_2 et F l'espace engendré par le vecteur \mathbf{b}_3 .

- (a) Montrer que la famille $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$ est une base de \mathbb{R}^3 .
Que peut-on dire des espaces E et F .
- (b) Soit p la projection sur E parallèlement à F . Calculer la matrice M de p dans la base \mathcal{B} .
- (c) Notons $\mathcal{E} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ la base canonique de \mathbb{R}^3 . Calculer la matrice N de p dans la base \mathcal{E} .
- (d) Calculer la matrice P de passage de \mathcal{E} vers \mathcal{B} .
Quelle relation existe-t-il entre les matrices M, N et P .

2. Soient les vecteurs de \mathbb{R}^3

$$\mathbf{c}_1 = (1, -1, -3) \quad \mathbf{c}_2 = (1, 0, 3) \quad \text{et} \quad \mathbf{c}_3 = (2, -1, 1).$$

Notons alors G l'espace engendré par le vecteur \mathbf{c}_1 et F l'espace engendré par les vecteurs \mathbf{c}_2 et \mathbf{c}_3 .

- (a) Montrer que la famille $\mathcal{C} = (\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3)$ est une base de \mathbb{R}^3 .
Que peut-on dire des espaces G et H .
- (b) Soit s la symétrie par rapport à G parallèlement à H . Calculer la matrice S de s dans la base \mathcal{C} .
- (c) Notons $\mathcal{E} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ la base canonique de \mathbb{R}^3 . Calculer la matrice Q de passage de \mathcal{E} vers \mathcal{C} ainsi que son inverse.
- (d) En utilisant la question précédente, calculer la matrice T de s dans la base \mathcal{E} .

2.2 Pour aller plus loin

Exercice 1

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}^n$.

Calculer le déterminant de la matrice suivante :

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_{n-1} & a_{n-1}^2 & \cdots & a_{n-1}^{n-1} \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

On commencera par calculer ce déterminant pour $n = 2$ et $n = 3$ et on procédera par récurrence.

Exercice 2

Résoudre le système (S) suivant en discutant selon les valeurs du réel m

$$(S) : \begin{cases} (1-m)x + (2m+1)y + (2m+2)z &= m \\ mx + my &= 2m+2 \\ 2x + (m+1)y + (m-1)z &= m^2 - 2m + 9 \end{cases},$$

Exercice 3

Soit n un entier supérieur ou égal à 3. Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note $Com(A)$ la comatrice de A , dont les coefficients sont les cofacteurs de A .

Déterminer le rang de $Com(A)$ en fonction du rang de A , qu'on note $rg(A)$.

Exercice 4 : Matrices triangulaires par blocs et inversion

1. Soient A, B, C et D des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et considérons la matrice M triangulaire supérieure par blocs de la forme

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & D \end{pmatrix}.$$

Montrer que $\det(M) = \det(A)\det(D)$.

Indication : on pourra commencer par montrer que $\det(M) = \det(A)\det(D)$ en considérant la décomposition suivante :

$$\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ? & ? \\ 0 & ? \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}.$$

2. On suppose maintenant que les matrices C et D commutent et que D est inversible. Montrer que l'on a

$$\det(N) = \begin{vmatrix} A & C \\ B & D \end{vmatrix} = \det(AD - BC).$$

Indication : on cherchera multiplier N par une certaine matrice de sorte à ce que le produit des deux donne la matrice $\begin{pmatrix} A - BD^{-1}C & B \\ 0 & D \end{pmatrix}$

3 Réduction des endomorphismes

3.1 Applications du cours

Exercice 1

Considérons un endomorphisme u dont la représentation matricielle A est donnée par

$$A = \begin{pmatrix} 8 & -1 & -5 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer le polynôme caractéristique de u .
2. Déterminer ses valeurs propres (sachant que 2 est racine du polynôme caractéristique)
3. La matrice A est-elle diagonalisable ?

Exercice 2

Considérons un endomorphisme u dont la représentation matricielle A est donnée par

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ -10 & -5 & 2 \end{pmatrix}$$

Diagonaliser la matrice A et déterminer la matrice de passage P permettant de passer de la matrice A à sa version diagonale. A nouveau, on remarquera que 2 est une valeur propre de la matrice A .

Exercice 3

Considérons un endomorphisme u dont la représentation matricielle A est donnée par

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 6 & 3 & 1 \\ 4 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Calculer les puissances de la matrice $A - I_3$
2. Pour $k \in \{1, 2, 3\}$, on pose $E_k = \text{Ker}((u - \lambda \text{Id})^k)$.
 - (a) Montrer que $\dim(E_k) = k$. Pour cela on utilisera le fait que si f et g sont deux endomorphismes, alors $\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(g \circ f)$ et on pensera au théorème du rang qui fait le lien entre le rang et la dimension du noyau. Aucun calcul n'est nécessaire.
 - (b) En déduire une base $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ de E_3 telle que (\mathbf{e}_1) est une base de E_1 et $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ est une base de E_2 .
3. En déduire l'expression de la matrice de passage P formée par les trois vecteurs précédents. Peut-on dire que la matrice A est semblable à une matrice diagonale ?
Pour rappel, deux matrices A et B sont semblables s'il existe une matrice P inversible telle que

$$B = P^{-1}AP.$$

Exercice 4

Pour quelles valeurs des scalaires a, b, c et d la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 2 & c \\ 0 & 0 & d \end{pmatrix}$$

est elle diagonalisable ?

Exercice 5

On considère la matrice A suivante

$$A = \begin{pmatrix} \gamma & 1 & 2 \\ 0 & \gamma & 3 \\ 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}$$

où γ est la *Constante d'Euler-Mascheroni*³. Expliquez, sans calculs, pourquoi cette matrice n'est pas diagonalisable.

Exercice 6

On considère la matrice réelle A définie par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

1. La matrice A est-elle inversible ?
2. Montrer que A est diagonalisable et expliciter une matrice D diagonale et une matrice P inversible telle que $A = PDP^{-1}$.
3. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $A^n = PD^nP^{-1}$.
4. En déduire une expression de A^n .

Exercice 7

On considère l'endomorphisme u de rang 1 dont la représentation matricielle est donnée par

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Montrer que le polynôme caractéristique de cette matrice est $(-\lambda)^{n-1}(tr(u) - \lambda)$.

3. C'est une constante qui apparaît naturellement lorsque l'on étudie la *Série Harmonique* et on a $\gamma \simeq 0.577$.

3.2 Pour aller plus loin

Exercice 1

Déterminer le polynôme caractéristique de l'endomorphisme u dont la représentation matricielle⁴ est donnée par :

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{pmatrix}$$

Indication : on transformera la première ligne à l'aide d'une transformation de la forme $L_1 \leftarrow \sum_{i=1}^n P_i(\lambda)L_i$ pour un bon choix de P_i . L'idée est de faire apparaître des 0 sur les $n-1$ premières entrées de la matrice

Exercice 2

Soit E un espace vectoriel sur le corps \mathbb{R} , de dimension finie $n \geq 1$ et soit u un endomorphisme de E qui commute avec tous les projecteurs de E .

1. Montrer que tout vecteur non nul de E est un vecteur propre de u
2. Montrer que u est une homothétie⁵

Exercice 3 : Diagonalisation par blocs

Soient A, C et D trois matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et considérons la matrice M triangulaire supérieure par blocs de la forme

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & D \end{pmatrix}.$$

Montrer que le spectre de M est l'union des spectres des matrices A et D .

Indication : on pourra commencer par montrer que $\det(M) = \det(A)\det(D)$ en considérant la décomposition suivante :

$$\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ? & ? \\ 0 & ? \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$$

4. une telle matrice est appelée *matrice compagnon*

5. Une homothétie est une application linéaire u de la forme $u(\mathbf{x}) = \lambda\mathbf{x}$ pour un réel λ fixé pour tout vecteur \mathbf{x} .

4 Espaces Euclidiens et formes bilinéaires et quadratiques

4.1 Applications du cours

Exercice 1

Soit f l'application de $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ dans \mathbb{R} définie par :

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1y_1 + 2x_2y_2 + 3x_3y_3 + x_1y_2 + x_2y_1.$$

Est-ce que l'application f définit un produit scalaire ?

Exercice 2

Soit A une matrice symétrique réelle de taille n , associée à un endomorphisme f , qui possède n valeurs propres distinctes, notées $\lambda_1 < \dots < \lambda_n$, et notons $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^n$ les vecteurs propres associés, on supposera que ces vecteurs ont une norme égale à 1.

1. Montrer que les sous espaces propres sont deux à deux orthogonaux, *i.e.* montrer que les vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes sont orthogonaux⁶.
2. Montrer que la matrice V dont les colonnes sont formées par les vecteurs propres de A (que vérifie

$$V^{-1} = V^T.$$

3. En déduire, que dans une base adaptée, la forme quadratique associée au produit scalaire défini par la matrice A peut s'écrire comme la somme de monômes au carré (*i.e.* sous la forme $\lambda_1 z_1^2 + \dots + \lambda_n z_n^2$).

Exercice 3

Soit f l'application de $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ dans \mathbb{R} définie par :

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}x_1 - 2x_2 + 5x_3 \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}}y_1 - 2y_2 + 5y_3 \right) + (x_2 - x_3)(y_2 - y_3) + 2x_3y_3.$$

Est-ce que l'application f définit un produit scalaire ?

Exercice 4

Soit f l'application de $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ dans \mathbb{R} définie par

$$f(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 3u_1v_1 + u_2v_2 + 3u_3v_3 - u_2v_1 - u_1v_2 - u_3v_2 - u_2v_3.$$

1. Montrer que f est un produit scalaire.

6. On peut étendre ce résultat et montrer que, sans hypothèses sur le caractère distinct des valeurs propres, une matrice symétrique réelle est orthogonalement semblable à une matrice diagonale, dont les éléments diagonaux sont des nombres réels. Pour construire cette base orthogonale (ou orthonormale), on montrera que les espaces propres associés à deux valeurs propres distinctes sont deux à deux orthogonaux et au sein d'un espace propre, on peut toujours construire une base orthogonale (Gram-Schmidt).

2. Soit P la matrice de passage de la base canonique (\mathbf{e}_i) vers une base (\mathbf{e}'_i) définie par

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (a) Déterminer la matrice du produit scalaire associée à l'application f dans la base canonique (\mathbf{e}_i) . On notera S cette matrice.
- (b) Déterminer la matrice S' de ce même produit scalaire mais dans la base (\mathbf{e}'_i) .
3. On considère les vecteurs $\mathbf{x}' = (0 \ 1 \ 0)^T$ et $\mathbf{y}' = (-1 \ 1 \ 1)^T$ dans la base (\mathbf{e}'_i) . Déterminer le produit scalaire de ces deux vecteurs et conclure.

Exercice 5

Soient $\mathbf{u} = (1 \ -1 \ 1)^T$ et $\mathbf{v} = (2 \ 1 \ -1)^T$ deux vecteurs de \mathbb{R}^3 muni du produit scalaire canonique et considérons l'espace vectoriel F engendré par les vecteurs \mathbf{u} et \mathbf{v} .

- Quelle est la dimension de F ?
- Déterminer la matrice de projection orthogonale P sur F .
- Soit $\mathbf{w} = (0 \ 1 \ 1)^T$.
 - Après avoir calculer les produits scalaires des vecteurs \mathbf{u} et \mathbf{v} avec le vecteur \mathbf{w} , dire à quel espace appartient le vecteur \mathbf{w} .
 - Que peut-on dire du produit $P\mathbf{w}$?

4.2 Pour aller plus loin

Exercice 1 : Cauchy-Schwarz pour les formes bilinéaires

Exercice 1 Soit ϕ une forme bilinéaire sur un espace vectoriel réel E et soit q sa forme quadratique associée.

- Montrer l'identité de Cauchy

$$q(q(\mathbf{u})\mathbf{v} - \phi(\mathbf{u}, \mathbf{v})\mathbf{u}) = q(\mathbf{u})[q(\mathbf{u})q(\mathbf{v}) - \phi(\mathbf{u}, \mathbf{v})\phi(\mathbf{v}, \mathbf{u})].$$

- En déduire, si q est définie positive, l'inégalité de Cauchy-Schwarz

$$\phi(\mathbf{u}, \mathbf{v})\phi(\mathbf{v}, \mathbf{u}) \leq q(\mathbf{u})q(\mathbf{v}).$$

Exercice 2

On considère l'espace $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ des matrices carrées d'ordre 2 sur \mathbb{R} .

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}); a - d = 0 \right\} \text{ et } J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

On définit l'application

$$\phi : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$$

en posant, pour tous $M, N \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$,

$$\phi(M, N) = \text{tr}(MJN).$$

1. Montrer que ϕ est une forme bilinéaire. Est-elle symétrique ?
2. Montrer que $\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$ est une base de E .
3. Déterminer la matrice de la forme quadratique q dans la base \mathcal{B} . La forme quadratique q est définie, pour tout $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ par $q(M) = \phi(M, M)$. Pour cela, on prendra $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et on calculera $q(M)$.
4. Ecrire la forme quadratique q comme une somme de carrés, *i.e.* on ne doit plus voir apparaître de termes rectangles.
5. Est-elle définie ? Positive ? Négative ?
6. En déduire le rang et le noyau de cette forme quadratique.
7. Déterminer la forme polaire associée à q .
8. On considère maintenant un sous-espace de E défini par

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}); a - d = 0 \right\}.$$

Déterminer F^\perp l'espace orthogonal à F .