




RP 347/67  
Libérée en 1978  
PARENTE :  
H 32/8560 x R 445

# R 570

Toutes périodes de récolte



## Description botanique

- Grande canne au tallage abondant et en forme de papier, port érigé, toujours droite même après brûlage. Son aspect général rappelle beaucoup celui de la H 32/8560.
- Feuille large, retombante au 1/3 supérieur de sa longueur, verte ; gaine très adhérente avec de nombreuses tache de Morve Rouge (caractère de R 445), ochréa brun rougeâtre ; auricule triangulaire de taille moyenne, présence de poils à la base ; ligule poilue sur face externe.
- Tige : entre-noeud assez long de diamètre assez gros, cylindrique ; jaune verdâtre, cireuse, présence fréquente de fumagine qui donne un aspect sale à la canne, tavelures ; pas de sillon sur l'oeilleton ; zone radiculaire de largeur constante ; cicatrice foliaire protubérante, oeil sphérique, sans poil.
- Fleurit peu ou pas, fleur longue, frêle, hampe florale très longue.

# Caractères agronomiques

- Très large zone d'adaptation : zone sèche, irriguée, humide, surhumide, sauf en altitude.
- Présente une certaine sensibilité au Pokkah Boeng qui n'affecte pas pour l'instant son rendement. Légère sensibilité à la Maladie de l'Ananas. Sensibilité observée en Australie à la Maladie de Fidji. Résistante aux autres maladies à la Réunion.
- Rendements forts en général.
- Richesse bonne tout le long de la campagne.
- Bonne tenue en repousses.
- Germe bien, à condition de prélever la semence sur des cannes âgées de 7 à 9 mois. Traitement fongicide des boutures indispensable.
- La forte adhérence des gaines rend l'épailage des boutures difficile, c'est une source de propagation des cochenilles à la plantation.
- Cette variété a aujourd'hui la faveur des planteurs de l'île. Elle a supplanté les autres variétés dans les nouvelles plantations.
- Se comporte très bien à la récolte mécanique, à signaler cependant une certaine



*Toutes zones  
sauf altitude :  
< 550 m Ouest/Sud  
< 300 m dans l'Est*