### Universidad Católica de Santa María

Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Bioquímicas y Biotecnológicas

Escuela profesional de Ingeniería Biotecnológica



Interacción de Antraquinonas del Aloe Vera como inhibidores potenciales de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP4)

Tesis presentada por el Bachiller:

Quispe Ppacco, David Jonatán

Para Optar el Titulo Profesional de:

Ingeniero Biotecnólogo

Asesor:

Barazorda Ccahuana, Haruna Luz

Arequipa – Perú 2024

# Contenido

C	onter	nido CATÓLICA D	1				
1	Intr	roducción	3				
2	Pla	nteamiento de la Investigación	4				
	2.1	Problemática de la investigación	4				
	2.2	Pregunta de investigación	4				
	2.3	Justificación	4				
	2.4	Alcance	4				
	2.5	Objetivos	4				
		2.5.1 General	4				
		2.5.2 Específicos	4				
	2.6	Hipótesis	5				
	2.7	Variables e indicadores	5				
	2.8	Tipo y Nivel de Investigación	5				
3	Antecedentes						
	3.1	Estado del Arte	6				
4	Mai	rco Teórico	7				
	4.1	Título de la sección	7				
		4.1.1 Título de la subsección	7				

5	Plai	nteamiento Metodológico	8				
	5.1	Lugar en donde se desarrollará la investigación	8				
	5.2	Ambientes por utilizar	8				
	5.3	Materiales	8				
	5.4	Métodos	8				
		5.4.1 Primer método	8				
		5.4.2 Segundo método	8				
	5.5	Flujograma de actividades	8				
6 Cronograma y Presupuesto de la Investigación							
	6.1	Cronograma	10				
	6.2	Presupuesto	11				
Re	efere	ncias Bibliográficas	12				



## Planteamiento de la Investigación

- 2.1 Problemática de la investigación
- 2.2 Pregunta de investigación
- 2.3 Justificación
- 2.4 Alcance
- 2.5 Objetivos
- 2.5.1 General
- 2.5.2 Específicos

•

•

•

### 2.6 Hipótesis

### 2.7 Variables e indicadores

Tabla 2.1: Cuadro de variables

Variables	Variable	Indicadores	Unidades
Independientes			
Dependientes	10 C	ATÓLIC	ADE

### 2.8 Tipo y Nivel de Investigación

### Antecedentes

#### 3.1 Estado del Arte

En el artículo titulado "Phthalate-induced testosterone/androgen receptor pathway disorder on spermatogenesis and antagonism of lycopene" publicado en el año de 2022, se detalla que la vía de señalización de testosterona (T)/receptor de andrógenos (AR) está involucrada en el mantenimiento de la espermatogénesis y la fertilidad masculina. Los resultados obtenidos en la investigación demostraron que el ftalato de mono-2-etilhexilo (MEHP) causó daño mitocondrial y daño oxidativo, por lo que se determinó que esta sustancia química seria amenaza para el progreso de la espermatogénesis. Sin embargo, en la investigación también realizaron estudios antagonistas del licopeno frente a la alteración que produce los ftalatos en el trastorno de la vía del receptor de andrógenos/ testosterona, teniendo como resultados que este suplemento LYC es una agente antioxidante natural que inhibe los cambios producidos por los ftalatos frente la función espermatogénica de los testículos. En general, este estudio revelo un papel fundamental para la transducción de señales T/AR en la fertilidad masculina y proporciono información prometedora sobre el papel protector de LYC en los trastornos reproductivos masculinos inducidos por ftalatos.<sup>1</sup>

# Marco Teórico

- 4.1 Título de la sección
- 4.1.1 Título de la subsección

## Planteamiento Metodológico

- 5.1 Lugar en donde se desarrollará la investigación
- 5.2 Ambientes por utilizar
- 5.3 Materiales
- 5.4 Métodos
- 5.4.1 Primer método
- 5.4.2 Segundo método
- 5.5 Flujograma de actividades

Cronograma y Presupuesto de la Investigación



## 6.1 Cronograma

Actividades		Meses										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
· T Ó l			Λ									
Chio				0								
						0)	1					
Q /												
										50		
5										5		

### 6.2 Presupuesto

Financiado por el fondo



# Referencias Bibliográficas

[1] Zhao Y, Li XN, Zhang H, Cui JG, Wang JX, Chen MS, et al. Phthalate-induced testosterone/androgen receptor pathway disorder on spermatogenesis and antagonism of lycopene. Journal of Hazardous Materials. 2022 10;439:129689.

