

心理健康筛查综合报告

个人评估报告

姓 名：ceshi 机构信息：校园心理筛查（PsycheFlow） 报告日期：2026-09-01

！ 需要立即寻求帮助

我听到你正在承受很大的痛苦，你的感受很重要，你不是一个人。作为校园心理陪伴助手，我不能替代专业帮助——请立即联系你信任的老师、家长，或拨打青少年心理援助热线 12355，专业人员会陪着你一起面对。

触发信号：第9题 自杀意念/自伤想法 得分 3

青少年心理援助热线：12355（紧急危及生命请拨 120 / 110）

1. 测评工具介绍

PHQ-A 青少年抑郁筛查量表（Patient Health Questionnaire for Adolescents）基于国际通用的 PHQ-9 抑郁筛查九项量表，专为 11-17 岁青少年编制。量表采用李克特 4 级评分（0=完全没有至 3=几乎每天），评估过去两周内的抑郁症状频率与强度，总分 0-27，界值 ≥ 11 提示存在抑郁筛查阳性，建议由学校心理老师或专业人员进一步评估。PHQ-A 在全球校园普测中广泛使用，具有良好的信效度与青少年适配性，被纳入多个国家中小学心理健康筛查推荐工具清单。

SCARED 儿童焦虑相关情绪筛查量表（Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders）由美国匹兹堡大学 Birmaher 教授团队编制、中文版经国内学者修订，适用于 8-18 岁儿童青少年。量表包含 41 个条目，采用 0-2 三级评分，总分 0-82，官方推荐界值 ≥ 25 为阳性筛查，提示可能存在广泛性焦虑、社交恐惧、学校恐惧、分离焦虑或躯体化惊恐等焦虑相关症状。SCARED 是我国学校心理普测常用工具，具备良好的信度、效度及性别/年龄测量等值性。

2. 测评结果解读注意事项

为了更好地理解和使用本测评结果，请相关工作人员认真阅读以下注意事项：心理测验只在一定程度上反映了受测者在所测内容上的现状和特点，不能机械地将结果认定为最终结论，而要结合受测者的日常学习、家庭情况、同伴关系、健康状况、近期突发事件等多重因素、具体情况具体分析，绝不能只根据测验结果给被试贴标签或做定论。如果需要做定论的情况，由具备相关专业资质的人员来慎重裁定。

3. 测评人员信息

姓 名	性 别	年 龄	编 号	测评用时
ceshi	—	—	795a532d	—
学 号	年 级	测评工具编号	部 门	测评工具
—	—	795a532db615467d96ccd4885c9a99fc	校园心理筛查（PsycheFlow）	PHQ-A + SCARED

4. 测评结果

需立即干预

Immediate Intervention

您的心理健康综合水平被评定为：需立即干预（结合量表作答、子维度剖析与危机信号综合判断）

因子剖析 · 雷达剖面图

基于 9 个子维度得分百分位绘制（越向外越需关注）



◆ 尺度总览表（量表级）

量表名称	维度说明	原始得分	剖析结果
PHQ-A 青少年抑郁筛查量表	存在重度抑郁症状，建议立即转介专业评估。	27/27	重度
SCARED 儿童焦虑相关情绪筛查量表	总分 23/82，低于阳性界值 25，暂无明显焦虑倾向。	23/82	无明显症状

◆ 因子剖析表（子维度级）

因子剖析	原始分	满分	等级	程度（可视化）
认知/情感症状 PHQ-A	6	6	重度	
睡眠/精力/食欲 PHQ-A	9	9	重度	
自我价值/注意力 PHQ-A	6	6	重度	
精神运动/风险意念 PHQ-A	6	6	重度	
躯体反应 SCARED	0	16	无明显症状	
分离焦虑 SCARED	6	12	中度	
广泛性担忧 SCARED	8	24	轻度	
社交恐惧 SCARED	9	22	轻度	
学校恐惧/校园焦虑 SCARED	0	8	无明显症状	

5. 测评结果剖析

PHQ-A · 子维度详解

重度

认知/情感症状6 / 6 (100%)

维度说明：核心抑郁体验：做事提不起劲、情绪低落/沮丧

兴趣感显著缺失，情绪持续沮丧，可能影响学习与社交功能，建议专业评估。

重度

睡眠/精力/食欲9 / 9 (100%)

维度说明：躯体与植物神经症状：入睡困难、疲劳无力、食欲变化

睡眠/食欲紊乱明显，精力耗竭感强烈，可能影响日常功能，建议尽快就医评估。

重度

自我价值/注意力6 / 6 (100%)

维度说明：认知功能与自我评价：自我失败感、注意力难集中

强烈的自我否定/挫败感，注意力难以维持，严重影响学习表现，需专业支持。

重度

精神运动/风险意念6 / 6 (100%)

维度说明：运动迟滞/激越与安全风险：语速动作慢或烦躁、自杀/自伤念头

出现明显的精神运动异常或自我伤害/结束生命的想法，请立即联系学校心理老师、家长并拨打 12355 青少年心理援助热线，必要时拨打 120 或 110。

SCARED · 子维度详解

无明显症状

躯体反应0 / 16 (0%)

维度说明：焦虑在身体上的体现：出汗、发抖、心跳、晕倒、呕吐、心脏病感

身体状态稳定，焦虑较少通过躯体化方式表达。

中度

分离焦虑6 / 12 (50%)

维度说明：与依恋对象分离相关的焦虑：父母分开、独处、被独自留下

分离时有一定顾虑或偶尔做相关噩梦，可通过渐进式陪伴与固定仪式感适应。

轻度

广泛性担忧8 / 24 (33%)

维度说明：对健康、家庭、未来、自身表现等多领域的普遍担忧

在多方面偶尔出现过虑，可尝试担忧外化书写与现实检验练习。

轻度

社交恐惧9 / 22 (40%)

维度说明：对公众场合与他人评价的焦虑：被注视、被取笑、当众发言

在陌生或公众场合偶尔紧张，可通过社交暴露练习与角色扮演逐步适应。

无明显症状

学校恐惧/校园焦虑0 / 8 (0%)

维度说明：校园场景特有的焦虑：害怕上学、怕被欺负、怕哭出来失态

对上学持积极或稳定的态度，校园生活无明显回避。

6. 发展建议

看到你的测评结果，我们一方面为你愿意坦诚面对自己的状态而点赞，另一方面也深深牵挂着你。当前你的抑郁量达到重度，并出现了自杀意念或自伤的想法，这绝不是“想太多”或“矫情”，而是大脑在发出需要紧急帮助的信号。请务必重视：尽快由专业精神科医生或心理治疗师进行系统评估与干预，是当前最重要、最负责的一步。

给家庭的建议：先守安全，再谈陪伴

- 立即带孩子到三甲医院精神科或心理卫生中心就诊，遵医嘱进行药物/心理治疗，并严格看护，确保环境无危险物品。
- 每天固定15分钟“不评判、不打断”的亲倾听时间，让孩子感到“爸妈和我站在一起”。
- 与孩子共同制定简单可行的生活节律：固定起床、三餐、入睡时间，哪怕只做到一半也要及时肯定。

给学校的建议：联动支持，降低压力

- 班主任与心理老师尽快建立“一对一”关注机制，每周至少两次主动关怀谈话，并记录情绪动态。
- 暂时调整学业要求，如减免作业量、延后考试，优先保障孩子心理稳定。
- 安排信任的同伴作为“温暖联系人”，避免孩子独处，同时注意保护隐私。

给孩子的自我调节：先从呼吸开始

- 当难受来袭时，试试“4-7-8呼吸法”：吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒，重复5次，让身体先松下来。
- 每天写下三件“哪怕很小但做到了的事”，比如“今天洗了脸”“我多撑了十分钟”——这就是力量的证据。
- 主动向父母或信任的老师表达“我需要帮助”，这不是软弱，而是对自己最大的负责。

请记住：所有黑暗都会过去，专业支持+时间+身边人的爱，会让光重新照进来。你值得被认真帮助。