测量的边界

演化速率耦合场论

杨国梁

目录

前言 **1**

第 1 章 对称双生子实验 **1**

1.1 实验过程 1

1.2 钟慢效应 2

1.3 对称性约束 2

1.4 实验结论 2

第 2 章 伽利略变换与洛伦兹变换的推导 **3**

2.1 公理设定 3

2.2 建立一般线性变换形式 4

2.3 公共约束 5

2.3.1 约束 1：追踪 S' 的原点 5

2.3.2 约束 2：相对速度 5

2.4 伽利略变换 6

2.4.1 约束 3G：不变时间 6

2.4.2 约束 4G：群结构 6

2.4.3 结果 7

2.5 洛伦兹变换 7

2.5.1 约束 3L：不变速度 7

2.5.2 约束 4L：群结构 8

2.5.3 结果 8

2.6 两种变换的关系 10

2.7 推广到四维时空 11

2.7.1 横向坐标不变：对称性论证 11

2.7.2 四维伽利略变换 12

2.7.3 四维洛伦兹变换 12

2.7.4 时空间隔不变性 13

2.8 讨论 14

第 3 章 麦克斯韦方程组 15

3.1 问题的提出 15
3.2 洛伦兹变换 15
3.3 麦克斯韦方程组 17
3.3.1 四维势与电磁场张量 18
3.3.2 计算矩阵形式 19
3.3.3 非齐次麦克斯韦方程组 20
3.3.4 齐次麦克斯韦方程组 22
3.4 协变性与电磁场的变换 25
3.4.1 物理量的洛伦兹变换 25
3.4.2 非齐次方程的协变性 26
3.4.3 齐次方程的协变性 27
3.4.4 电磁场的变换关系 28
3.4.5 小结 32

第 4 章 平直时空上的引力场 33

4.1 平直背景上的引力场 34
4.2 线性理论：无质量自旋 2 的场方程 35
4.3 弱场极限与牛顿势 37
4.4 自耦合：非线性被强制 39
4.5 等效定理 41
4.6 平直性到哪里去了 41
4.7 什么会使等效失效 42
4.8 与本书其它章节的关系 43
4.9 小结 43

第 5 章 伽利略协变的场方程组：一个纯数学构造 45

5.1 设定与目标 45
5.1.1 “形式不变” 的三种含义 46
5.2 运动学：唯一可用的算子 46
5.2.1 两个基本恒等式 46
5.2.2 引理：一阶算子的分类 47
5.2.3 引入补偿速度 **w** 47
5.2.4 一条硬约束：**w** 必须是常向量 48
5.3 构造：修改清单 48

5.3.1 修改后的方程组（无源） . . . 48
5.3.2 有源情形：源项必须同步修改 . . . 49
5.4 验证一：形式不变性 . . . 50
5.4.1 定理与证明 . . . 50
5.4.2 换元定理：这组方程的全部解都是已知的 . . . 50
5.5 验证二：波解与速度叠加 . . . 51
5.5.1 波动方程与色散关系 . . . 51
5.5.2 相速度、群速度：叠加的两种表现 . . . 51
5.6 数学边界：走不通的路与自由参数 . . . 52
5.6.1 注记：为什么路线 走不通（一阶计算） . . . 52
5.6.2 系数层修补为何不够 . . . 52
5.6.3 本构造的三个自由参数 . . . 52
5.7 数学谱系注记 . . . 53
5.8 与现实世界的接口 . . . 54

第 6 章 演化速率耦合框架 55

6.1 基本数据 . . . 55
6.2 背景场的两类标准情形 . . . 56
6.3 一形式层：叶状结构与精确性判据 . . . 57
6.4 规范化层：不变量与协变量的分离 . . . 58
6.5 射流层：泰勒展开即射流投影 . . . 59
6.6 三种退化情形 . . . 60
6.7 变分层：让 Φ 承担动力学 . . . 61
6.8 算子层：与量子力学的相容性 . . . 62
6.8.1 参数化层：相容性成立 . . . 62
6.8.2 算子层：空间依赖与编序 . . . 62
6.8.3 关系性结构：正确的载体 . . . 63
6.8.4 算子层的结论 . . . 64
6.9 工具清单 . . . 64

参考文献 66

表索引

2.1 第三条公理的两种取法 3
2.2 四步消参：两条公共约束，两条分支约束 5
2.3 两种变换的逐项对照 10

3.1 有源项：4 维与 3 维的对应关系 22
3.2 无源项：4 维与 3 维的对应关系 25

4.1 破坏等效的四条途径 42

5.1 “形式不变” 的三种含义 46
5.2 修改清单：只换时间导数，散度方程不动 48
5.3 本构造的三个自由参数（外部输入） 53
5.4 本构造与 Hertz 1890 方程的逐条对照 53

6.1 五个层次的自由度分布 55
6.2 两类标准背景场 57
6.3 类别映射的三种退化 60
6.4 各层的数学工具与结论 64

前言

- 章节 1：设计一个完全镜像对称的双生子实验，以对称性约束检验“钟慢效应”的测量解释与随身时钟物理过程之间的区分；
- 章节 2：不预设“光”这一具体物理对象，仅从线性性、不变对象的存在与群结构三条弱前提出发，严格导出伽利略变换与洛伦兹变换；
- 章节 3：将麦克斯韦方程组改写为四维张量形式，逐分量验证其与三维矢量方程的对应关系，证明其在洛伦兹变换下的协变性，并导出电场与磁场的变换关系；
- 章节 4：只在平直时空上加入一个对称张量场 $h_{\mu\nu}$ 来承载引力，逐层建立它同以度规 $g_{\mu\nu}$ 描述时空弯曲的广义相对论之间的等效，并给出等效成立与失效的判定条件；
- 章节 5：为一个假想的伽利略世界构造一套自洽的场方程组，回答“能否构造一组在伽利略变换下形式不变的偏微分方程、且当补偿速度取零时退化为标准麦克斯韦方程组”这一纯数学问题；
- 章节 6：在给定的背景场下，把“多类演化系统的速率如何由一族响应函数给出”拆成若干彼此独立的层次，逐层给出定义、可判定的命题与该层尚缺的数据，并判定这一框架与量子力学的相容性。

本项研究的逻辑推演、代数验证、格式整理与内容校验，有 DeepSeek 和 WorkBuddy 的深度参与和帮助，特此致谢。

杨国梁

2026 年 10 月

第 1 章　对称双生子实验

本章设计一个完全镜像对称的双生子实验，检验“钟慢效应”这一测量结果与随身时钟物理过程之间的关系。

1.1　实验过程

定义 1.1 (实验对象). 设惯性参考系 S 中存在两个质点 A 和 B。在时空原点 O 处，A 与 B 相遇并完成时钟对表。设此时 S 系的坐标时 $t = 0$，两者的随身时钟时（携带的时钟读数）分别记为 τ_A 和 τ_B，且设 $\tau_A = \tau_B = 0$。

定义 1.2 (路径分段). 从 O 点出发，A 和 B 分别沿两条完全镜像对称的空间路径运动，在时空点 M 再次相遇。其路径分为两个阶段：

1. **弧线段 $O \to P$ 与 $O \to Q$**：A 经过弧线到达点 P，B 经过完全镜像的弧线到达点 Q。这两段过程包含了加速与转向。
2. **直线段 $P \to M$ 与 $Q \to M$**：设 A 到达 P 点后，从点 P 开始以恒定速度 v 沿直线向 M 运动，B 到达 Q 点后，从点 Q 开始以恒定速度 $-v$ 沿直线向 M 运动。




图 1.1: 对称双生子实验

公理 1.1 (对称性公理). 根据实验设定，路径 $O \to P \to M$ 与 $O \to Q \to M$ 关于中心轴 OM 完美镜像对称。即：A 和 B 的物理经历在空间几何与动力学上完全等价。这一对称

性在逻辑上确立了 A 与 B 的身份平等与可互换性。

1.2 钟慢效应

本章只研究路径分段（定义 1.2）中第 2 阶段直线段的惯性运动过程。

在 A 的静止参考系 S_A 中，B 以相对速度 $v_{B/A}$ 运动。按洛伦兹变换[1]（推导见章节 2），A 测量 B 的时间会发生膨胀式 1.1。

$$\Delta t_A = \gamma\left(\Delta t_B + \frac{v_{B/A}\Delta x_B}{c^2}\right) \quad \Longrightarrow \quad \Delta t_B = \frac{1}{\gamma}\Delta t_A \tag{1.1}$$

在式 1.1 中，B 在其自身静止系 S_B 中位置不变，故 $\Delta x_B = 0$；Δt_B 是 A 在 S_A 系中由洛伦兹变换算出的 B 的时间，它表明 A 测得的 B 的时间流逝更慢。同理，在 B 的静止系 S_B 中，B 也会得出 A 的时间流逝更慢的结论。

1.3 对称性约束

根据公理 1.1（对称性公理），A 和 B 经历了完全镜像对称的物理过程。在 M 点相遇时，两者随身时钟的读数相等，即式 1.2。

$$\tau_A = \tau_B \tag{1.2}$$

1.4 实验结论

在满足洛伦兹变换的条件的前提下，洛伦兹变换测量得到的 “时间不一致”，对称性确定的 “随身时钟时相等”。这说明：洛伦兹变换测量出的时间差异，并不等同于物理上时钟实际经历的差异。“钟慢效应” 是特定理论下的测量结果，它不等同于随身时钟读数的物理过程的真实发生。

第 2 章　伽利略变换与洛伦兹变换的推导

2.1　公理设定

本章的全部结果都从三条前提推出：坐标变换的线性性、一个“不变对象”的存在，以及变换集合的群结构。前两条与群结构为两种变换所共有；真正决定结论的，是“不变对象”取什么——它把推导分成两支，一支给出伽利略变换，一支给出洛伦兹变换。这条不预设光速不变、仅由时空均匀性、各向同性与群结构导出变换的路线，在文献中已有系统论述[2,3]。

公共公理

公理 2.1 (均匀性假设（线性变换）). *空间是均匀的，时间是均匀的。因此，两个惯性系 S 和 S' 之间的坐标变换必须是线性变换（齐次线性变换加平移，这里取原点重合的齐次部分）。*

公理 2.2 (协变性（群结构）). *所有的空间方向是对称的（各向同性），且变换构成的集合必须形成“群”：即连续做两次变换等于做一次变换，且存在逆变换回到原坐标系。*

第三条公理：不变对象（二选一）

公理 2.3 (存在不变时间（绝对同时性）). *存在一个在所有惯性系中取值相同的时间刻度，即同时性与参考系无关，等时面在变换下不变。形式地：若 $t = 0$，则在 S' 中必有 $t' = 0$。*

公理 2.4 (存在不变速度). *存在一个恒定的特征速度 c，在任何参考系中，沿任意方向测量该速度都恒为 c。形式地：若 $x = ct$，则在 S' 中必有 $x' = ct'$；若 $x = -ct$，则 $x' = -ct'$。*

两条第三公理互为对偶：一条把**时间轴**定为不变量，另一条把**速度轴**定为不变量。

表 2.1: 第三条公理的两种取法

	公理 2.3（→ 伽利略）	公理 2.4（→ 洛伦兹）
不变对象	等时面 $t = 0$	特征射线 $x = ct$
形式条件	$t = 0 \Rightarrow t' = 0$	$x = ct \Rightarrow x' = ct'$
直观说法	不存在有限的不变速度	存在有限的不变速度 c

公理 2.3（→ 伽利略）　　公理 2.4（→ 洛伦兹）

2.2　建立一般线性变换形式

设 S' 系相对于 S 系以速度 v 沿 x 轴正向运动，两系对应的坐标轴两两平行，且在 $t = t' = 0$ 时原点重合。两系的几何关系如图图 2.1 所示。




图 2.1: 两惯性系的坐标变换示意：惯性系 S 与 S' 坐标轴对应平行，S' 系以速度 v 沿 x 轴正向相对 S 系运动，同一事件 P 在两系中的横坐标分别为 x 与 x'，纵坐标 $y' = y$

本节的坐标列向量**统一按** (t, x) **排列**：时间分量在前、空间分量在后，与小节 2.7 的四维顺序 (t, x, y, z) 完全一致。由公理 2.1，(t, x) 平面内的线性变换必为

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

即

$$t' = At + Bx \tag{2.2}$$

$$x' = Ct + Dx \tag{2.3}$$

其中 A, B, C, D 是只依赖于 v 与 c 的待定常数。

接下来的推导是**四步消参**：线性性留下四个待定常数，下面四条约束各消去一个。前两条约束只用到“S' 以速度 v 相对 S 运动”这一几何设定，与第三条公理无关，因此两种变换共享；分歧只出现在后两条。

表 2.2: 四步消参：两条公共约束，两条分支约束

步骤	依据	伽利略	洛伦兹
约束 1	S' 的原点	$C = -Dv$	$C = -Dv$
约束 2	相对速度	$D = A$	$D = A$
约束 3	不变对象	$B = 0$	$B = -Av/c^2$
约束 4	群结构	$A = 1$	$A = \gamma$

2.3 公共约束

2.3.1 约束 1：追踪 S' 的原点

S' 的原点满足 $x' = 0$，它在 S 系中对应 $x = vt$。代入 $x' = Ct + Dx$：

$$0 = Ct + D(vt) = (C + Dv)\,t \quad \Longrightarrow \quad C = -Dv \tag{2.4}$$

于是式 2.1 收缩为

$$\begin{aligned} t' &= At + Bx \\ x' &= D(x - vt) \end{aligned} \tag{2.5}$$

2.3.2 约束 2：相对速度

由相对性原理（公理 2.2），S 系在自己看来静止，而在 S' 系中必须以速度 $-v$ 退行，即其原点 $x = 0$ 满足 $x' = -vt'$。

在式 2.5 中令 $x = 0$，得 $t' = At$、$x' = -Dv\,t$，于是 $x'/t' = -Dv/A$。要求它等于 $-v$（$v \neq 0$；$v = 0$ 时变换退化为恒等，$A = D = 1$ 自动成立）：

$$-\frac{Dv}{A} = -v \quad \Longrightarrow \quad D = A \tag{2.6}$$

至此两种变换共有一个形式，只剩 A、B 两个参数：

$$\Lambda = \begin{pmatrix} A & B \\ -Av & A \end{pmatrix} \tag{2.7}$$

分岔点就在 B 与 A 上：B 由第三条公理定，A 由群结构配合它定。

2.4 伽利略变换

2.4.1 约束 3G：不变时间

由公理 2.3，$t = 0 \Rightarrow t' = 0$。在式 2.2 中令 $t = 0$，得 $t' = Bx$；要求它对一切 x 为零，故

$$B = 0 \tag{2.8}$$

于是变换进一步收缩为 $t' = At$、$x' = A(x - vt)$——这是一个**保时**的变换。

2.4.2 约束 4G：群结构

由公理 2.2，变换集合构成群，故速度为 v 的变换与速度为 $-v$ 的变换互逆：$\Lambda(v)\,\Lambda(-v) = I$。

把 $v \to -v$ 代入式 2.7（此时 $B = 0$）；由各向同性，A 只依赖速率大小而与此方向无关，故 $A(-v) = A(v) \equiv A$：

$$\Lambda(-v) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ Av & A \end{pmatrix}$$

两者相乘，非对角元两两相消，对角元给出 A^2：

$$\Lambda(v)\,\Lambda(-v) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ -Av & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ Av & A \end{pmatrix} = A^2 I \tag{2.9}$$

要求乘积为单位阵，得 $A^2 = 1$。再由 $v \to 0$ 时变换必须连续地退化为恒等变换（$A \to 1$），取正根：

$$A = 1 \tag{2.10}$$

2.4.3 结果

将 $A=1$、$B=0$ 代回式 2.1：

$$t' = t \tag{2.11}$$

$$x' = x - vt \tag{2.12}$$

写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -v & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix} \tag{2.13}$$

这就是伽利略变换：时间绝对（$t'=t$），空间坐标按 $x'=x-vt$ 随参考系平移。

一致性检验。两次同向伽利略变换应当等于一次合成变换，$\Lambda(v_1)\,\Lambda(v_2)=\Lambda(v_1+v_2)$。直接相乘：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -v_1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -v_2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -(v_1+v_2) & 1 \end{pmatrix}$$

速度按算术相加，群结构闭合。

2.5 洛伦兹变换

爱因斯坦以“光速不变原理”为前提[1]；本节的推导不引入任何具体物理对象，只用公理 2.4 这一条关于变换形式的约束。

2.5.1 约束 3L：不变速度

由公理 2.4，要求 $x=ct \Rightarrow x'=ct'$。取满足 $x=ct$ 的事件；由式 2.6 有 $D=A$，故式 2.5 给出 $x'=A(x-vt)$。用它和式 2.2 构造组合 $x'-ct'$：

$$x' - ct' = A(ct-vt) - c\,(At+Bct) = -\left(Av+Bc^2\right)t$$

要求该组合恒为零，即得

$$Av + Bc^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad B = -\frac{Av}{c^2} \tag{2.14}$$

对满足 $x = -ct$ 的事件，同样构造 $x' + ct'$，得到的是同一个约束 $Av + Bc^2 = 0$，不产生新的限制。

2.5.2 约束 4L：群结构

与伽利略一支同样的理由（公理 2.2）：$\Lambda(v)\,\Lambda(-v) = I$。由各向同性，$A(-v) = A(v) \equiv A$，故

$$\Lambda(v) = \begin{pmatrix} A & -Av/c^2 \\ -Av & A \end{pmatrix}, \qquad \Lambda(-v) = \begin{pmatrix} A & Av/c^2 \\ Av & A \end{pmatrix}$$

两者相乘，非对角元两两相消，对角元给出 $A^2\left(1 - v^2/c^2\right)$：

$$\begin{aligned} \Lambda(v)\Lambda(-v) &= \begin{pmatrix} A & -Av/c^2 \\ -Av & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & Av/c^2 \\ Av & A \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) & 0 \\ 0 & A^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \end{pmatrix} \\ &= A^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) I \end{aligned} \tag{2.15}$$

要求乘积为单位阵，得

$$A^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = 1 \quad \Longrightarrow \quad A = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \equiv \gamma \tag{2.16}$$

根号取正号：$v \to 0$ 时变换必须连续地退化为恒等变换，$A \to 1$。

2.5.3 结果

$$t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \tag{2.17}$$

$$x' = \gamma(x - vt) \tag{2.18}$$

写成矩阵形式式 2.19：

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v/c^2 \\ -\gamma v & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix} \tag{2.19}$$

一致性检验。两次同向洛伦兹变换同样应当等于一次合成变换。直接相乘得

$$\begin{aligned} \Lambda(v_1)\Lambda(v_2) &= \begin{pmatrix} \gamma_1 & -\gamma_1 v_1/c^2 \\ -\gamma_1 v_1 & \gamma_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_2 & -\gamma_2 v_2/c^2 \\ -\gamma_2 v_2 & \gamma_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \gamma_1\gamma_2\left(1+\frac{v_1 v_2}{c^2}\right) & -\frac{\gamma_1\gamma_2}{c^2}(v_1+v_2) \\ -\gamma_1\gamma_2(v_1+v_2) & \gamma_1\gamma_2\left(1+\frac{v_1 v_2}{c^2}\right) \end{pmatrix} \\ &= \gamma_1\gamma_2\left(1+\frac{v_1 v_2}{c^2}\right) \begin{pmatrix} 1 & -\frac{v_1+v_2}{c^2(1+v_1 v_2/c^2)} \\ -\frac{v_1+v_2}{1+v_1 v_2/c^2} & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

根据速度合成定理，令 V 为：

$$V = \frac{v_1+v_2}{1+v_1 v_2/c^2}$$

最终将 V 代入上式，得到结果：

$$\Lambda(v_1)\Lambda(v_2) = \gamma_1\gamma_2\left(1+\frac{v_1 v_2}{c^2}\right) \begin{pmatrix} 1 & -V/c^2 \\ -V & 1 \end{pmatrix}$$

而 $\gamma_1\gamma_2\left(1+v_1 v_2/c^2\right) = \gamma(V)$：

$$\begin{aligned} \gamma(V) &= \frac{1}{\sqrt{1-V^2/c^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{c^2}\left(\frac{v_1+v_2}{1+v_1 v_2/c^2}\right)^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\frac{c^2(1+v_1 v_2/c^2)^2-(v_1+v_2)^2}{c^2(1+v_1 v_2/c^2)^2}}} \end{aligned}$$

将分子部分展开，进行代数化简：

$$
\begin{aligned}
&c^2(1+v_1v_2/c^2)^2-(v_1+v_2)^2\\
&=c^2\left(1+2\frac{v_1v_2}{c^2}+\frac{v_1^2v_2^2}{c^4}\right)-(v_1^2+2v_1v_2+v_2^2)\\
&=\left(c^2+2v_1v_2+\frac{v_1^2v_2^2}{c^2}\right)-v_1^2-2v_1v_2-v_2^2\\
&=c^2-v_1^2-v_2^2+\frac{v_1^2v_2^2}{c^2}\\
&=c^2\left(1-\frac{v_1^2}{c^2}-\frac{v_2^2}{c^2}+\frac{v_1^2v_2^2}{c^4}\right)\\
&=c^2\left(1-\frac{v_1^2}{c^2}\right)\left(1-\frac{v_2^2}{c^2}\right)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\gamma(V)&=\frac{1}{\sqrt{\frac{c^2\left(1-\frac{v_1^2}{c^2}\right)\left(1-\frac{v_2^2}{c^2}\right)}{c^2(1+v_1v_2/c^2)^2}}}\\
&=\frac{1+v_1v_2/c^2}{\sqrt{1-v_1^2/c^2}\cdot\sqrt{1-v_2^2/c^2}}\\
&=\gamma_1\gamma_2\left(1+\frac{v_1v_2}{c^2}\right)
\end{aligned}
$$

故乘积恰为 $\Lambda(V)$：速度按相对论加法合成，群结构同样闭合，只是合成律不再是算术相加。

2.6 两种变换的关系

1. 逐项对照

表 2.3: 两种变换的逐项对照

	伽利略（式 2.11、式 2.12）	洛伦兹（式 2.17、式 2.18）
时间	$t'=t$	$t'=\gamma\left(t-vx/c^2\right)$
空间	$x'=x-vt$	$x'=\gamma(x-vt)$
矩阵	$\begin{pmatrix}1 & 0\\ -v & 1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}\gamma & -\gamma v/c^2\\ -\gamma v & \gamma\end{pmatrix}$
不变量	Δt（绝对时间）	$c^2\Delta t^2-\Delta x^2$（时空间隔）
速度合成	算术相加 v_1+v_2	相对论加法

2. $c\to\infty$ 的极限

把洛伦兹变换中的 c 取无穷：$\gamma \to 1$，$\gamma v/c^2 \to 0$，式 2.17 与式 2.18 逐项退化为式 2.11 与式 2.12。也就是说，

伽利略变换是洛伦兹变换在 $c \to \infty$ 下的极限。

这与两条第三公理的对偶性一致：c 取有限值对应“存在不变速度”，c 取无穷则意味着不存在有限的不变速度——那正是公理 2.3 所陈述的内容。所以两条公理并非两个互不相干的前提，而是同一条陈述在有限与无限两处的取值。

3. 群结构

两支各自闭合（合成律见各自的一致性检验）。在群论上，伽利略群是洛伦兹群在 $c \to \infty$ 下的 Inönü–Wigner 收缩；单就群本身而言，洛伦兹群是“更大”的那一个，伽利略群是它在收缩极限下的退化结果。

2.7 推广到四维时空

前面的推导在 (t, x) 平面内完成，对两种变换同样适用。本节补齐四维图景：先由对称性证明横向坐标 y、z 在变换下不变，再分别给出四维形式的伽利略变换与洛伦兹变换。

2.7.1 横向坐标不变：对称性论证

设两系坐标轴对应平行。y、z 坐标的一般线性变换可写为式 2.20（系数只依赖于 v 与 c）：

$$\begin{aligned} y' &= p\,y + q\,z + \alpha x + \eta t \\ z' &= r\,y + s\,z + \mu x + \nu t \end{aligned} \tag{2.20}$$

第一步（x 轴映到 x' 轴）。由各向同性，x 轴在变换下必须映到 x' 轴：位于 x 轴上的点（$y = z = 0$）在 S' 系中的横向坐标必须为零。于是对任意 x、t 有 $\alpha x + \eta t = 0$ 与 $\mu x + \nu t = 0$，故

$$\alpha = \eta = \mu = \nu = 0$$

第二步（反射对称性）。将两系的 y 轴同时反向（$y \to -y$，$y' \to -y'$），物理情境不变，变换形式应保持不变。在反射后的坐标下 $-y' = -py + qz$，即 $y' = py - qz$，与原式 $y' = py + qz$ 比较得 $q = 0$；同理，由 $z \to -z$ 的反射对称性得 $r = 0$。于是

$$y' = p\,y, \qquad z' = s\,z$$

第三步（确定横向比例因子）。由 y、z 两个横向方向的等价性，$p = s$，记为 $a(v)$。

- 一方面，对上式求逆（即把 v 换成 $-v$ 的变换）得 $y = a(-v)\,y'$，故

$$a(v)\,a(-v) = 1$$

- 另一方面，考虑两个由相对性原理（公理 2.2）联系起来的实验：S' 系测量静止于 S 系的横向标尺，由于 y' 只依赖于 y（与同时性无关），测得长度为原来的 $a(v)$ 倍；S 系测量静止于 S' 系的同一根标尺，测得长度为原来的 $a(-v)$ 倍。两个实验的物理地位完全对等（交换两系即可互换），比例因子必须相同，故 $a(v) = a(-v)$。

于是 $a(v)^2 = 1$；再由 $v \to 0$ 时变换连续地退化为恒等变换（$a \to 1$），得

$$y' = y, \qquad z' = z \tag{2.21}$$

即**横向坐标在变换下不变**——这一论证既不涉及 B 也不涉及 A，因此对伽利略与洛伦兹两种变换同时成立。于是四维变换在 (t, x) 与 (y, z) 子空间上是分块对角的，前几节在 (t, x) 平面内的推导对四维变换完全充分。

2.7.2 四维伽利略变换

综合式 2.11、式 2.12 与式 2.21，得到四维伽利略变换（变量按 (t, x, y, z) 的顺序排列）：

$$\begin{cases} t' = t \\ x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \tag{2.22}$$

其矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -v & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{2.23}$$

2.7.3 四维洛伦兹变换

综合式 2.17、式 2.18 与式 2.21，得到四维洛伦兹变换：

$$\begin{cases} t' = \gamma\left(t - \dfrac{v}{c^2}x\right) \\ x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \tag{2.24}$$

其矩阵形式为式 2.25。

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v/c^2 & 0 & 0 \\ -\gamma v & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{2.25}$$

取 $x^0 = ct$ 并记 $\beta = v/c$，四个分量具有相同的长度量纲，式 2.19 的 2×2 块化为对称形式式 2.26。

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{2.26}$$

2.7.4 时空间隔不变性

定义两事件之间的时空间隔（以下取原点重合的事件，即 $\Delta t = t$、$\Delta x = x$ 等）

$$s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 \tag{2.27}$$

由式 2.26 读出 $ct' = \gamma(ct - \beta x)$、$x' = \gamma(x - \beta ct)$，以及 $y' = y$、$z' = z$。直接计算

$$\begin{aligned} c^2t'^2 - x'^2 &= \gamma^2\left[(ct - \beta x)^2 - (x - \beta ct)^2\right] \\ &= \gamma^2(c^2t^2 + \beta^2x^2 - x^2 - \beta^2c^2t^2) \\ &= \gamma^2\left((1-\beta^2)c^2t^2 - (1-\beta^2)x^2\right) \\ &= \gamma^2\left(1-\beta^2\right)\left(c^2t^2 - x^2\right) \\ &= c^2t^2 - x^2 \end{aligned} \tag{2.28}$$

末步用了 $\gamma^2\left(1-\beta^2\right) = 1$（式 2.16）。横向分量不参与运算（$y' = y$、$z' = z$），故式 2.27

整体不变：

$$c^2t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 = c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2 \tag{2.29}$$

2.8 讨论

本章的两种变换出自**同一套推导**。线性性给出 A, B, C, D 四个待定常数；S' 的原点与相对速度各消去一个（公共约束）；第三条公理消去 B；群结构定下 A。两支的差别全部集中在第三条公理：

- 取 “存在不变时间”：$B = 0$、$A = 1$，得**伽利略变换**；
- 取 “存在不变速度 c”：$B = -Av/c^2$、$A = \gamma$，得**洛伦兹变换**。

而前者恰是后者在 $c \to \infty$ 下的极限。因此这两种变换不是两个彼此独立的结论，而是同一族变换在不同公理取值下的两个端点。

整个推导只使用了三条公理——线性性、不变对象的存在与群结构——而未借助电磁学或光的任何具体性质；“不变速度” 在此只是一条关于变换形式的约束，与任何具体物理对象无关。

第 3 章　麦克斯韦方程组

3.1　问题的提出

在经典力学中，惯性系 S 和 S'（其中 S' 以恒定速度 v 沿 x 轴相对 S 运动）之间的坐标变换由伽利略变换描述为式 3.1。

$$\begin{cases} t' = t \\ x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \tag{3.1}$$

然而，麦克斯韦方程组预言了真空中光速 c 为一个普适常数，见式 3.2。

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \tag{3.2}$$

这与伽利略变换下的速度合成法则相矛盾。

3.2　洛伦兹变换

爱因斯坦基于以下两条原理构建了狭义相对论：

相对性原理：所有物理定律在所有惯性参考系中具有相同的形式。

光速不变原理：在任何惯性参考系中，真空中的光速 c 都相同。

满足这两条原理的坐标变换是洛伦兹变换。采用四维闵可夫斯基时空坐标 $x^\nu = (ct, x, y, z)$，将时间分量乘以 c，即取 $x^0 = ct$，是为了让四个分量具有相同的长度量纲，从而变换矩阵的各个元素均为无量纲量。

洛伦兹变换为式 3.3。

$$\begin{cases} t' = \gamma\left(t - \dfrac{v}{c^2}x\right) \\ x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \tag{3.3}$$

$$\beta = \frac{v}{c} \tag{3.4}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \tag{3.5}$$

其中 β 为无量纲速度参数，γ 为洛伦兹因子。

设初始时刻 S 系和 S' 系的原点重合，S' 系沿 x 轴以速度 v 运动。从 S 系到 S' 系的洛伦兹变换的矩阵形式为式 3.6。

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu} \tag{3.6}$$

其中式 3.6 中的 Λ^{μ}_{ν} 为洛伦兹变换矩阵式 3.7。

$$\Lambda^{\mu}_{\nu} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{3.7}$$

$$x'^{\mu} = \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \tag{3.8}$$

$$x^{\nu} = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{3.9}$$

将式 3.6 的矩阵乘法展开，并代入式 3.4，得到式 3.10、式 3.11、式 3.12、式 3.13，合起来就是非矩阵形式的洛伦兹变换式 3.3。

$$
\begin{aligned}
t' &= \frac{1}{c}\left(\gamma(ct) + (-\gamma\beta)x + 0\cdot y + 0\cdot z\right) \\
&= \gamma t - \gamma\frac{\beta}{c}x = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right)
\end{aligned}
\tag{3.10}
$$

$$
\begin{aligned}
x' &= (-\gamma\beta)(ct) + \gamma x + 0\cdot y + 0\cdot z \\
&= \gamma x - \gamma\beta ct = \gamma(x - vt)
\end{aligned}
\tag{3.11}
$$

$$
y' = 0\cdot ct + 0\cdot x + 1\cdot y + 0\cdot z = y \tag{3.12}
$$

$$
z' = 0\cdot ct + 0\cdot x + 0\cdot y + 1\cdot z = z \tag{3.13}
$$

从 S' 系到 S 系的逆变换，其矩阵形式为式 3.14，其中式 3.15 中的 Λ^{ν}_{μ} 是式 3.7 中 Λ^{μ}_{ν} 的逆矩阵。

$$
x^{\nu} = \Lambda^{\nu}_{\mu} x'^{\mu} \tag{3.14}
$$

$$
\Lambda^{\nu}_{\mu} = \begin{pmatrix}
\gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\
\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{pmatrix} \tag{3.15}
$$

逆变换的非矩阵形式为式 3.16。

$$
\begin{cases}
t = \gamma\left(t' + \dfrac{v}{c^2}x'\right) \\
x = \gamma\left(x' + vt'\right) \\
y = y' \\
z = z'
\end{cases} \tag{3.16}
$$

3.3 麦克斯韦方程组

本节将麦克斯韦方程组改写为四维时空中的张量形式[4]。采用闵可夫斯基度规 $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(+1,-1,-1,-1)$；时空指标取 $\mu,\nu = 0,1,2,3$，空间指标取 $i,j = 1,2,3$，重复的上下指标按爱因斯坦求和约定求和。

3.3.1 四维势与电磁场张量

电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 由四维势定义为式 3.17，它统一了电场和磁场[5]。

$$F^{\mu\nu} = \partial^{\mu} A^{\nu} - \partial^{\nu} A^{\mu} \tag{3.17}$$

四维势 A^{μ} 为式 3.18，其中 ϕ 是标量势，$\mathbf{A}$ 是矢量势。

$$A^{\mu} = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A}\right) = \left(\frac{\phi}{c}, A_x, A_y, A_z\right) \tag{3.18}$$

∂^{μ} 是逆变四维梯度算符，为式 3.19。

$$\partial^{\mu} = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, -\nabla\right) = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, -\frac{\partial}{\partial x}, -\frac{\partial}{\partial y}, -\frac{\partial}{\partial z}\right) \tag{3.19}$$

电场和磁场[6]（第 240 页）由势定义为式 3.20 和式 3.21。

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \tag{3.20}$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} \tag{3.21}$$

其中 $\mathbf{e}_x$、$\mathbf{e}_y$、$\mathbf{e}_z$ 为直角坐标系的单位矢量。式 3.20 的分量形式为式 3.22，式 3.21 的分量形式[6]（第 173 页）为式 3.23、式 3.24、式 3.25。

$$E_i = -\frac{\partial \phi}{\partial x^i} - \frac{\partial A^i}{\partial t} \tag{3.22}$$

$$B_x = (\nabla \times \mathbf{A})_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \tag{3.23}$$

$$B_y = (\nabla \times \mathbf{A})_y = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \tag{3.24}$$

$$B_z = (\nabla \times \mathbf{A})_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \tag{3.25}$$

3.3.2 计算矩阵形式

根据式 3.17 计算 $F^{\mu\nu}$ 中的上三角元素。

3.3.2.1 对角元

$\mu = \nu = i$ 代入式 3.17 得到式 3.26。

$$F^{ii} = \partial^i A^i - \partial^i A^i = 0 \tag{3.26}$$

3.3.2.2 时间-空间分量

$\mu = 0$，$\nu = i$ 代入式 3.17，化简后代入式 3.22 得到式 3.27。

$$\begin{aligned} F^{0i} &= \partial^0 A^i - \partial^i A^0 \\ &= \frac{1}{c}\frac{\partial A^i}{\partial t} - \left(-\frac{\partial}{\partial x^i}\right)\left(\frac{\phi}{c}\right) \\ &= \frac{1}{c}\left(\frac{\partial A^i}{\partial t} + \frac{\partial \phi}{\partial x^i}\right) \\ &= -\frac{E_i}{c} \end{aligned} \tag{3.27}$$

3.3.2.3 空间-空间分量

$\mu = i, \nu = j$ 代入式 3.17 得到式 3.28，其中 $i, j = 1, 2, 3$。

$$F^{ij} = \partial^i A^j - \partial^j A^i = -\frac{\partial A^j}{\partial x^i} + \frac{\partial A^i}{\partial x^j} \tag{3.28}$$

计算 F^{12}，代入式 3.28，得到式 3.29。

$$F^{12} = -\frac{\partial A^2}{\partial x^1} + \frac{\partial A^1}{\partial x^2} = -\frac{\partial A_y}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial y} = -B_z \tag{3.29}$$

计算 F^{13}，代入式 3.28，得到式 3.30。

$$F^{13} = -\frac{\partial A^3}{\partial x^1} + \frac{\partial A^1}{\partial x^3} = -\frac{\partial A_z}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial z} = B_y \tag{3.30}$$

计算 F^{23}，代入式 3.28，得到式 3.31。

$$F^{23} = -\frac{\partial A^3}{\partial x^2} + \frac{\partial A^2}{\partial x^3} = -\frac{\partial A_z}{\partial y} + \frac{\partial A_y}{\partial z} = -B_x \tag{3.31}$$

3.3.2.4 矩阵形式

根据式 3.17 的定义可知 $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$，电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 是一个反对称二阶张量，下三角各元素可由上三角元素的对称位置加负号得到，其矩阵形式为式 3.32。

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} \tag{3.32}$$

利用电磁场张量，麦克斯韦方程组可以简洁地表示为两个协变方程：非齐次方程式 3.33 与齐次方程式 3.51。

3.3.3 非齐次麦克斯韦方程组

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu \tag{3.33}$$

其中 ∂_μ 是协变四维导数式 3.34，J^ν 是四维电流密度式 3.35。

$$\partial_\mu = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \nabla\right) = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \tag{3.34}$$

$$J^\nu = (c\rho, \mathbf{J}) = (c\rho, J_x, J_y, J_z) \tag{3.35}$$

3.3.3.1 高斯电场定律

取时间分量 $\nu = 0$ 时，$\partial_\mu F^{\mu 0}$ 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 0 列的点乘，得到式 3.36，其中 $J^0 = c\rho$。

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{E_x}{c}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{E_y}{c}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{E_z}{c}\right) = \mu_0 c\rho \tag{3.36}$$

式 3.36 两边乘以 c，得到式 3.37。

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \mu_0 c^2 \rho \tag{3.37}$$

利用式 3.2 得 $\mu_0 c^2 = 1/\epsilon_0$，代入式 3.37 整理后得到高斯电场定律式 3.38。

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{3.38}$$

3.3.3.2 安培-麦克斯韦定律

磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的旋度 $\nabla \times \mathbf{B}$ 为式 3.39。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \tag{3.39}$$

式 3.39 可以展开为三个分量方程式 3.40、式 3.41、式 3.42。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_x = \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \tag{3.40}$$

$$(\nabla \times \mathbf{B})_y = \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} \tag{3.41}$$

$$(\nabla \times \mathbf{B})_z = \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \tag{3.42}$$

由式 3.2 得到式 3.43。

$$\frac{1}{c^2} = \mu_0 \epsilon_0 \tag{3.43}$$

取空间分量 $\nu = 1$ 时，$\partial_\mu F^{\mu 1}$ 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 1 列的点乘，得到式 3.44，其中 $J^1 = J_x$。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{-E_x}{c}\right) + \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} = \mu_0 J_x \tag{3.44}$$

将式 3.43 和式 3.40 代入式 3.44 后整理得到式 3.45。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_x - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_x}{\partial t} = \mu_0 J_x \tag{3.45}$$

当 $\nu = 2$ 时，$\partial_\mu F^{\mu 2}$ 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 2 列的点乘，为式 3.46，其中 $J^2 = J_y$。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{-E_y}{c}\right) - \frac{\partial B_z}{\partial x} + \frac{\partial B_x}{\partial z} = \mu_0 J_y \tag{3.46}$$

将式 3.43 和式 3.41 代入式 3.46 后整理得到式 3.47。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_y - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_y}{\partial t} = \mu_0 J_y \tag{3.47}$$

当 $\nu = 3$ 时，$\partial_\mu F^{\mu 3}$ 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 3 列的点乘，为式 3.48，其中 $J^3 = J_z$。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{-E_z}{c}\right) + \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} = \mu_0 J_z \tag{3.48}$$

将式 3.43 和式 3.42 代入式 3.48 后整理得到式 3.49。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_z - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_z}{\partial t} = \mu_0 J_z \tag{3.49}$$

合并三个分量方程式 3.45、式 3.47、式 3.49 为矢量形式式 3.50，此方程给出安培-麦克斯韦定律。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{3.50}$$

3.3.3.3 对应关系

表 3.1 中对 4 维与 3 维的对应关系做了总结：1 个 4 维张量方程包含了 2 个 3 维矢量方程。

表 3.1: 有源项：4 维与 3 维的对应关系

4 维形式	3 维形式	物理定律
$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu$，$\nu = 0$	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$	高斯电场定律
$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu$，$\nu = 1,2,3$	$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial_t \mathbf{E}$	安培-麦克斯韦定律

时间分量（$\nu = 0$）对应高斯电场定律，空间分量（$\nu = 1,2,3$）对应安培-麦克斯韦定律。

3.3.4 齐次麦克斯韦方程组

循环（指标三重交替）形式为式 3.51，该式对指标 λ, μ, ν 的任意取值均成立。

$$\partial^\lambda F^{\mu\nu} + \partial^\mu F^{\nu\lambda} + \partial^\nu F^{\lambda\mu} = 0 \tag{3.51}$$

3.3.4.1 高斯磁场定律

式 3.51 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (1, 2, 3)$ 得到式 3.52。

$$\partial^1 F^{23} + \partial^2 F^{31} + \partial^3 F^{12} = 0 \tag{3.52}$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.52，得到式 3.53。

$$-\frac{\partial}{\partial x}(-B_x) - \frac{\partial}{\partial y}(-B_y) - \frac{\partial}{\partial z}(-B_z) = 0 \tag{3.53}$$

将式 3.53 整理后得高斯磁场定律式 3.54。

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{3.54}$$

3.3.4.2 法拉第电磁感应定律

电场 $\mathbf{E}$ 的旋度 $\nabla \times \mathbf{E}$ 为式 3.55。

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} \tag{3.55}$$

式 3.55 可以展开为三个分量方程式 3.56、式 3.57、式 3.58。

$$(\nabla \times \mathbf{E})_x = \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \tag{3.56}$$

$$(\nabla \times \mathbf{E})_y = \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \tag{3.57}$$

$$(\nabla \times \mathbf{E})_z = \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \tag{3.58}$$

x-分量：式 3.51 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (0, 2, 3)$，得到式 3.59。

$$\partial^0 F^{23} + \partial^2 F^{30} + \partial^3 F^{02} = 0 \tag{3.59}$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.59 得到式 3.60。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(-B_x\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{E_z}{c}\right)-\frac{\partial}{\partial z}\left(-\frac{E_y}{c}\right)=0 \tag{3.60}$$

将式 3.60 乘 c 整理后得到式 3.61。

$$-\frac{\partial B_x}{\partial t}-\frac{\partial E_z}{\partial y}+\frac{\partial E_y}{\partial z}=0 \tag{3.61}$$

将式 3.56 代入式 3.61 得到式 3.62。

$$\left(\nabla\times\mathbf{E}\right)_x=-\frac{\partial B_x}{\partial t} \tag{3.62}$$

y-分量：式 3.51 选择 $(\lambda,\mu,\nu)=(0,3,1)$，得到式 3.63。

$$\partial^0F^{31}+\partial^3F^{10}+\partial^1F^{03}=0 \tag{3.63}$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.63 得到式 3.64。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(-B_y\right)-\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{E_x}{c}\right)-\frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{E_z}{c}\right)=0 \tag{3.64}$$

将式 3.64 乘 c 整理后得到式 3.65。

$$-\frac{\partial B_y}{\partial t}-\frac{\partial E_x}{\partial z}+\frac{\partial E_z}{\partial x}=0 \tag{3.65}$$

将式 3.57 代入式 3.65 得到式 3.66。

$$\left(\nabla\times\mathbf{E}\right)_y=-\frac{\partial B_y}{\partial t} \tag{3.66}$$

z-分量：式 3.51 选择 $(\lambda,\mu,\nu)=(0,1,2)$，得到式 3.67。

$$\partial^0F^{12}+\partial^1F^{20}+\partial^2F^{01}=0 \tag{3.67}$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.67 得到式 3.68。

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(-B_z\right)-\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{E_y}{c}\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{E_x}{c}\right)=0 \tag{3.68}$$

将式 3.68 乘 c 整理后得到式 3.69。

$$-\frac{\partial B_z}{\partial t}-\frac{\partial E_y}{\partial x}+\frac{\partial E_x}{\partial y}=0 \tag{3.69}$$

将式 3.58 代入式 3.69 得到式 3.70。

$$(\nabla\times\mathbf{E})_z=-\frac{\partial B_z}{\partial t} \tag{3.70}$$

合并三个分量方程式 3.62、式 3.66、式 3.70 得到法拉第电磁感应定律式 3.71。

$$\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} \tag{3.71}$$

3.3.4.3 对应关系

表 3.2 中对 4 维与 3 维的对应关系做了总结：1 个 4 维张量方程包含了 2 个 3 维矢量方程。

表 3.2: 无源项：4 维与 3 维的对应关系

4 维形式	3 维形式	物理定律
$\partial^\lambda F^{\mu\nu}+\partial^\mu F^{\nu\lambda}+\partial^\nu F^{\lambda\mu}=0,$ $(\lambda,\mu,\nu)=(1,2,3)$	$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$	高斯磁场定律
$\partial^\lambda F^{\mu\nu}+\partial^\mu F^{\nu\lambda}+\partial^\nu F^{\lambda\mu}=0,$ $(\lambda,\mu,\nu)\in\{(0,2,3),(0,3,1),(0,1,2)\}$	$\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}$	法拉第电磁感应定律

3.4 协变性与电磁场的变换

本节证明麦克斯韦方程组在洛伦兹变换下是协变的：若方程组在惯性系 S 中成立，则在洛伦兹变换后的惯性系 S' 中具有相同的形式。其中非齐次方程协变性的证明，核心是证明式 3.83；齐次方程的形式不变性由式 3.51 的循环结构保证；最后由张量变换法则导出电场与磁场分量的显式变换关系。

3.4.1 物理量的洛伦兹变换

在洛伦兹变换下，各物理量按其张量阶数以确定的规则变换。四维矢量按式 3.72 变换，其中 Λ^μ_ν 为式 3.7。

$$A'^{\nu} = \Lambda^{\nu}_{\sigma} A^{\sigma} \tag{3.72}$$

偏导数算符的变换由链式法则导出。对式 3.6 求逆得式 3.14，于是 $\partial'_{\mu} = \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\mu}} \partial_{\nu} = \Lambda^{\nu}_{\mu} \partial_{\nu}$，即协变四维导数的变换式 3.73；用度规升指标后，逆变四维导数的变换为式 3.74。

$$\partial'_{\mu} = \Lambda^{\nu}_{\mu} \partial_{\nu} \tag{3.73}$$

$$\partial'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\rho} \partial^{\rho} \tag{3.74}$$

在 S' 系中，电磁场张量定义为式 3.75。

$$F'^{\mu\nu} = \partial'^{\mu} A'^{\nu} - \partial'^{\nu} A'^{\mu} \tag{3.75}$$

将式 3.72 和式 3.74 代入式 3.75。由于洛伦兹变换矩阵的元素是常数，可以提到偏导算符之前；又因矩阵元素是普通实数，乘法可交换，$\Lambda^{\mu}_{\rho} \Lambda^{\nu}_{\sigma} = \Lambda^{\nu}_{\sigma} \Lambda^{\mu}_{\rho}$，于是得到式 3.76。

$$\begin{aligned} F'^{\mu\nu} &= \left(\Lambda^{\mu}_{\rho} \partial^{\rho}\right) \left(\Lambda^{\nu}_{\sigma} A^{\sigma}\right) - \left(\Lambda^{\nu}_{\sigma} \partial^{\sigma}\right) \left(\Lambda^{\mu}_{\rho} A^{\rho}\right) \\ &= \Lambda^{\mu}_{\rho} \Lambda^{\nu}_{\sigma} \partial^{\rho} A^{\sigma} - \Lambda^{\mu}_{\rho} \Lambda^{\nu}_{\sigma} \partial^{\sigma} A^{\rho} \\ &= \left(\Lambda^{\mu}_{\rho} \Lambda^{\nu}_{\sigma}\right) \left(\partial^{\rho} A^{\sigma} - \partial^{\sigma} A^{\rho}\right) \\ &= \Lambda^{\mu}_{\rho} \Lambda^{\nu}_{\sigma} F^{\rho\sigma} \end{aligned} \tag{3.76}$$

最后，根据式 3.17 的定义，得到电磁场张量的变换法则式 3.77。

$$F'^{\mu\nu} = \Lambda^{\mu}_{\rho} \Lambda^{\nu}_{\sigma} F^{\rho\sigma} \tag{3.77}$$

同理，四维电流密度与协变四维导数分别按式 3.78 和式 3.73 变换。

$$J'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} J^{\nu} \tag{3.78}$$

3.4.2 非齐次方程的协变性

将式 3.77 和式 3.73 代入 $\partial'_{\mu} F'^{\mu\nu}$。为避免哑指标与自由指标重复，将求和指标改记为 α；由于 Λ 的元素是常数，可提到偏导算符之前，得到式 3.79。

$$\begin{aligned}\partial'_\mu F'^{\mu\nu} &= \left(\Lambda^\alpha_\mu \partial_\alpha\right)\left(\Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma F^{\rho\sigma}\right) \\ &= \Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma \partial_\alpha F^{\rho\sigma}\end{aligned} \tag{3.79}$$

洛伦兹变换矩阵满足正交关系式 3.80（即 $\Lambda^{-1}\Lambda = I$）。

$$\Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\mu_\rho = \delta^\alpha_\rho \tag{3.80}$$

其中 Kronecker 符号 δ^α_ρ 在 $\rho = \alpha$ 时为 1，否则为 0。利用式 3.80 化简式 3.79，得到式 3.81。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \Lambda^\nu_\sigma \partial_\rho F^{\rho\sigma} \tag{3.81}$$

在 S 系中式 3.33 成立，即 $\partial_\rho F^{\rho\sigma} = \mu_0 J^\sigma$，代入式 3.81 得到式 3.82。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \Lambda^\nu_\sigma \mu_0 J^\sigma = \mu_0 \Lambda^\nu_\sigma J^\sigma \tag{3.82}$$

根据四维电流密度的变换式 3.78，$\Lambda^\nu_\sigma J^\sigma = J'^\nu$，于是得到式 3.83。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \mu_0 J'^\nu \tag{3.83}$$

式 3.83 与式 3.33 具有相同的形式，这证明了非齐次麦克斯韦方程组在洛伦兹变换下是协变的。

3.4.3 齐次方程的协变性

证明循环形式的齐次方程式 3.51 在洛伦兹变换下形式不变，即：如果在参考系 S 中式 3.51 成立，则在参考系 S' 中，相应的式 3.84 也成立。

$$\partial'^\lambda F'^{\mu\nu} + \partial'^\mu F'^{\nu\lambda} + \partial'^\nu F'^{\lambda\mu} = 0 \tag{3.84}$$

将变换规则式 3.74 和式 3.77 代入式 3.84 的第一项，得到式 3.85。

$$\partial'^\lambda F'^{\mu\nu} = \left(\Lambda^\lambda_\rho \partial^\rho\right)\left(\Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta F^{\alpha\beta}\right) = \Lambda^\lambda_\rho \Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta \partial^\rho F^{\alpha\beta} \tag{3.85}$$

同理，式 3.84 的第二项得到式 3.86，第三项得到式 3.87。

$$\partial'^{\mu}F'^{\nu\lambda} = \Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}\Lambda^{\lambda}_{\rho}\partial^{\alpha}F^{\beta\rho} \tag{3.86}$$

$$\partial'^{\nu}F'^{\lambda\mu} = \Lambda^{\nu}_{\beta}\Lambda^{\lambda}_{\rho}\Lambda^{\mu}_{\alpha}\partial^{\beta}F^{\rho\alpha} \tag{3.87}$$

式 3.84 变换后的方程左端变为式 3.88。

$$\begin{aligned}&\Lambda^{\lambda}_{\rho}\Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}\,\partial^{\rho}F^{\alpha\beta} + \Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}\Lambda^{\lambda}_{\rho}\,\partial^{\alpha}F^{\beta\rho} + \Lambda^{\nu}_{\beta}\Lambda^{\lambda}_{\rho}\Lambda^{\mu}_{\alpha}\,\partial^{\beta}F^{\rho\alpha}\\ =&\Lambda^{\lambda}_{\rho}\Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}\Big(\partial^{\rho}F^{\alpha\beta} + \partial^{\alpha}F^{\beta\rho} + \partial^{\beta}F^{\rho\alpha}\Big) = 0\end{aligned} \tag{3.88}$$

由于 Λ^{μ}_{ν} 是数字（矩阵元素），数的乘法可交换，因此可以将每个乘积中的因子重新排序：三个乘积实际上包含相同的因子 $\Lambda^{\lambda}_{\rho}\Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}$，只是顺序不同。而括号内正是 S 系中的齐次方程式 3.51（将指标 (λ,μ,ν) 换为 (ρ,α,β)），故其值为 0。这就证明了式 3.84 成立。

3.4.4 电磁场的变换关系

在 S' 系中，$F'^{\mu\nu}$ 同样由该系的四维势 A'^{μ} 按式 3.75 的方式定义，因而也是反对称张量，其矩阵元素与 $\mathbf{E}'$、$\mathbf{B}'$ 的对应关系和 S 系中一致，即式 3.89 中的 $F'^{\mu\nu}$ 与式 3.32 中的 $F^{\mu\nu}$ 具有相同的形式。

$$F'^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E'_x/c & -E'_y/c & -E'_z/c \\ E'_x/c & 0 & -B'_z & B'_y \\ E'_y/c & B'_z & 0 & -B'_x \\ E'_z/c & -B'_y & B'_x & 0 \end{pmatrix} \tag{3.89}$$

根据电磁场张量的变换法则式 3.77，可以推导出三维空间中电场和磁场分量的显式变换关系[7]。

3.4.4.1 E'_x 与 F'^{01} 分量

式 3.77 中取 $\mu=0$，$\nu=1$，得到式 3.90。

$$F'^{01} = \Lambda^{0}_{\rho}\Lambda^{1}_{\sigma}F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^{3}\sum_{\sigma=0}^{3}\Lambda^{0}_{\rho}\Lambda^{1}_{\sigma}F^{\rho\sigma} \tag{3.90}$$

根据式 3.5 得到式 3.91。

$$\gamma^2\left(1-\beta^2\right)=1 \tag{3.91}$$

将式 3.7、式 3.32 和式 3.91 代入式 3.90，只保留非零元素，得到式 3.92。

$$\begin{aligned}-\frac{E'_x}{c}&=\Lambda^0_0\Lambda^1_1\,F^{01}+\Lambda^0_1\Lambda^1_0\,F^{10}\\&=\gamma\gamma\left(-\frac{E_x}{c}\right)+(-\gamma\beta)(-\gamma\beta)\left(\frac{E_x}{c}\right)\\&=\gamma^2(1-\beta^2)\left(-\frac{E_x}{c}\right)\\&=-\frac{E_x}{c}\end{aligned} \tag{3.92}$$

式 3.92 两边同乘以 $-c$，得到式 3.102。

3.4.4.2 E'_y 与 F'^{02} 分量

式 3.77 中取 $\mu=0$，$\nu=2$。由于 Λ^2_σ 只有在 $\sigma=2$ 时为 1，其它为 0，得到式 3.93。

$$F'^{02}=\Lambda^0_\rho\Lambda^2_\sigma F^{\rho\sigma}=\sum_{\rho=0}^{3}\Lambda^0_\rho F^{\rho 2} \tag{3.93}$$

将式 3.7 和式 3.32 代入式 3.93，只保留非零元素，得到式 3.94。

$$\begin{aligned}-\frac{E'_y}{c}&=\Lambda^0_0F^{02}+\Lambda^0_1F^{12}\\&=\gamma\cdot\left(-\frac{E_y}{c}\right)+(-\gamma\beta)\cdot(-B_z)\\&=\gamma\left(-\frac{E_y}{c}+\beta B_z\right)\end{aligned} \tag{3.94}$$

式 3.94 两边同乘以 $-c$，并代入式 3.4，得到式 3.103。

3.4.4.3 E'_z 与 F'^{03} 分量

式 3.77 中取 $\mu=0$，$\nu=3$。由于 Λ^3_σ 只有在 $\sigma=3$ 时为 1，其它为 0，得到式 3.95。

$$F'^{03}=\Lambda^0_\rho\Lambda^3_\sigma F^{\rho\sigma}=\sum_{\rho=0}^{3}\Lambda^0_\rho F^{\rho 3} \tag{3.95}$$

将式 3.7 和式 3.32 代入式 3.95，只保留非零元素，得到式 3.96。

$$
\begin{aligned}
-\frac{E'_z}{c} &= \Lambda^0_0\, F^{03} + \Lambda^0_1\, F^{13} \\
&= \gamma\left(-\frac{E_z}{c}\right) + (-\gamma\beta)B_y \\
&= \gamma\left(-\frac{E_z}{c} - \beta B_y\right)
\end{aligned}
\tag{3.96}
$$

式 3.96 两边同乘以 $-c$，并代入式 3.4，得到式 3.104。

3.4.4.4 B'_x 与 F'^{23} 分量

式 3.77 中取 $\mu = 2$，$\nu = 3$。由于 Λ^2_ρ 只有在 $\rho = 2$ 时为 1，Λ^3_σ 只有在 $\sigma = 3$ 时为 1，其它为 0，得到式 3.97。

$$
\begin{aligned}
-B'_x &= \Lambda^2_\rho \Lambda^3_\sigma F^{\rho\sigma} \\
&= F^{23} \\
&= -B_x
\end{aligned}
\tag{3.97}
$$

整理式 3.97 得到式 3.105。

3.4.4.5 B'_y 与 F'^{13} 分量

式 3.77 中取 $\mu = 1$，$\nu = 3$。由于 Λ^3_σ 只有在 $\sigma = 3$ 时为 1，其它为 0，得到式 3.98。

$$
F'^{13} = \Lambda^1_\rho \Lambda^3_\sigma F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^{3} \Lambda^1_\rho F^{\rho 3}
\tag{3.98}
$$

将式 3.7 和式 3.32 代入式 3.98，只保留非零元素，得到式 3.99。

$$
\begin{aligned}
B'_y &= \Lambda^1_0\, F^{03} + \Lambda^1_1\, F^{13} \\
&= (-\gamma\beta)\left(-\frac{E_z}{c}\right) + \gamma\, B_y \\
&= \gamma\left(\frac{\beta E_z}{c} + B_y\right)
\end{aligned}
\tag{3.99}
$$

将式 3.4 代入式 3.99，得到式 3.106。

3.4.4.6 B'_z 与 F'^{12} 分量

式 3.77 中取 $\mu = 1$，$\nu = 2$。由于 Λ^2_σ 只有在 $\sigma = 2$ 时为 1，其它为 0，得到式 3.100。

$$F'^{12} = \Lambda^1_\rho \Lambda^2_\sigma F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^{3} \Lambda^1_\rho F^{\rho 2} \tag{3.100}$$

将式 3.7 和式 3.32 代入式 3.100，只保留非零元素，得到式 3.101。

$$\begin{aligned} -B'_z &= \Lambda^1_0 \, F^{02} + \Lambda^1_1 \, F^{12} \\ &= (-\gamma\beta) \left(-\frac{E_y}{c} \right) + \gamma \, (-B_z) \\ &= \gamma \left(\frac{\beta E_y}{c} - B_z \right) \end{aligned} \tag{3.101}$$

式 3.101 两边同乘以 -1，并将式 3.4 代入式 3.101，得到式 3.107。

对于沿 x 轴方向的 boost 变换（S' 系相对于 S 系以速度 v 运动），电场分量的变换为式 3.102、式 3.103、式 3.104，磁场分量的变换为式 3.105、式 3.106、式 3.107。

$$E'_x = E_x \tag{3.102}$$

$$E'_y = \gamma \left(E_y - v B_z \right) \tag{3.103}$$

$$E'_z = \gamma \left(E_z + v B_y \right) \tag{3.104}$$

$$B'_x = B_x \tag{3.105}$$

$$B'_y = \gamma \left(B_y + \frac{v}{c^2} E_z \right) \tag{3.106}$$

$$B'_z = \gamma \left(B_z - \frac{v}{c^2} E_y \right) \tag{3.107}$$

3.4.4.7 矢量形式

将电场、磁场分解为平行于相对运动方向（x 方向）的分量与垂直分量。

平行分量不变，见式 3.108。

$$\mathbf{E}'_\parallel = \mathbf{E}_\parallel, \qquad \mathbf{B}'_\parallel = \mathbf{B}_\parallel \tag{3.108}$$

垂直分量发生电与磁的混合。由分量变换式式 3.103 和式 3.104，可写出垂直分量的矢量形式式 3.109。

$$\begin{aligned}\mathbf{E}'_{\perp} &= E'_y\mathbf{e}_y + E'_z\mathbf{e}_z \\ &= \gamma(E_y - vB_z)\mathbf{e}_y + \gamma(E_z + vB_y)\mathbf{e}_z \\ &= \gamma[E_y\mathbf{e}_y + E_z\mathbf{e}_z + v(B_y\mathbf{e}_z - B_z\mathbf{e}_y)] \\ &= \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v}\times\mathbf{B})\end{aligned} \tag{3.109}$$

其中 $\mathbf{v} = v\mathbf{e}_x$，且利用了式 3.110。

$$\mathbf{v}\times\mathbf{B} = v\mathbf{e}_x \times (B_x\mathbf{e}_x + B_y\mathbf{e}_y + B_z\mathbf{e}_z) = v(B_y\mathbf{e}_z - B_z\mathbf{e}_y) \tag{3.110}$$

同理，由分量变换式式 3.106 和式 3.107 可写出式 3.111。

$$\begin{aligned}\mathbf{B}'_{\perp} &= B'_y\mathbf{e}_y + B'_z\mathbf{e}_z \\ &= \gamma\left(B_y + \frac{v}{c^2}E_z\right)\mathbf{e}_y + \gamma\left(B_z - \frac{v}{c^2}E_y\right)\mathbf{e}_z \\ &= \gamma\left[B_y\mathbf{e}_y + B_z\mathbf{e}_z + \frac{v}{c^2}(E_z\mathbf{e}_y - E_y\mathbf{e}_z)\right] \\ &= \gamma\left(\mathbf{B}_{\perp} - \frac{1}{c^2}\mathbf{v}\times\mathbf{E}\right)\end{aligned} \tag{3.111}$$

其中利用了式 3.112。

$$\mathbf{v}\times\mathbf{E} = v\mathbf{e}_x \times (E_x\mathbf{e}_x + E_y\mathbf{e}_y + E_z\mathbf{e}_z) = v(E_y\mathbf{e}_z - E_z\mathbf{e}_y) \tag{3.112}$$

于是得到垂直分量的变换关系式 3.113。

$$\mathbf{E}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}), \qquad \mathbf{B}'_{\perp} = \gamma\left(\mathbf{B}_{\perp} - \frac{1}{c^2}\mathbf{v}\times\mathbf{E}\right) \tag{3.113}$$

由此可见，电场与磁场并不是相互独立的对象，而是同一个电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 在不同惯性系中的不同分量表现。

3.4.5 小结

如果麦克斯韦方程组在参考系 S 中成立，则在经过洛伦兹变换后的参考系 S' 中也成立。因此，麦克斯韦方程组具有洛伦兹协变性。

第 4 章　平直时空上的引力场

章节 3 把麦克斯韦方程组写在平直闵可夫斯基时空的坐标上，并把场强组织为规范不变的张量 $F^{\mu\nu}$。章节 5 把变换群换成伽利略群，证明那套手法在那里失效。两章都以**平直时空**为底空间，也都没有引入引力的几何化。

本章问一个不同的问题。如果始终不引入“时空弯曲”这一几何设定，只在平直时空 $(\mathbb{R}^4, \eta)$ 上增加一个对称张量场 $h_{\mu\nu}$，把引力全部放进这个场里，那么由此得到的场论，与以度规 $g_{\mu\nu}$ 描述时空弯曲的广义相对论，是不是同一套理论？

答案分三层，本章逐层建立。

1. **线性层可以做到。**规范不变性、洛伦兹协变、至多二阶导这三条几乎唯一地决定线性理论（命题 4.2），其牛顿极限自动给出泊松方程（命题 4.5）。
2. **线性层不自洽。**线性方程的左端恒等地守恒，而耦合使源不再守恒，于是必须把场自身的能量动量也算作源；这个级数封闭于完整的爱因斯坦方程（命题 4.6）。
3. **两套语言逐字对应。**由 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$，两套表述的场方程、解集与坐标不变量相同（定理 4.1）。

但“等效”必须先界定清楚。定理 4.1 说的是**动力学与可观测量**层面的等同，它既不蕴含“时空实际上是平直的”，也不蕴含其否定。恰恰相反：小节 4.6 会说明，在等效成立的范围内，背景 η 是**不可观测**的。要让它变成可观测的，必须破坏使等效成立的条件之一（小节 4.7）。

本章取 $c = 1$（即 $x^0 = t$），号差沿用章节 3 的 $(+,-,-,-)$：$\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(+1,-1,-1,-1)$。指标 $\mu,\nu,\rho,\sigma = 0,1,2,3$，空间指标 $i,j = 1,2,3$，重复的上下指标按爱因斯坦约定求和。另约定四个简写：$\partial_{(\mu}A_{\nu)} := \partial_\mu A_\nu + \partial_\nu A_\mu$（**不带** $1/2$，以省去下文反复出现的系数 2）；$\partial^2 := \eta^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu$（达朗贝尔算子，静态时 $\partial^2 = -\nabla^2$）；$\partial\cdot\xi := \partial_\mu\xi^\mu$；对称张量场的迹 $h := \eta^{\alpha\beta}h_{\alpha\beta}$。

4.1 平直背景上的引力场

定义 4.1 (平直背景与引力场). 底空间固定为 $M=\mathbb{R}^4$，其上固定一个平直度规 η，$\eta_{\mu\nu}=\mathrm{diag}(+1,-1,-1,-1)$。**引力场**是 M 上一个光滑对称二阶张量场

$$h_{\mu\nu}=h_{\nu\mu} \tag{4.1}$$

其指标由 η 升降。由 h 定义一个度规

$$g_{\mu\nu}:=\eta_{\mu\nu}+h_{\mu\nu} \tag{4.2}$$

式 4.2 只是一个定义，不含任何假设：任一对称二阶张量场都可以这样写成 “背景 + 场”。

按定义 4.1，一切几何量都可以**两种方式**计算：一种只看 h 与 η，另一种只看 g。本章要比较的，就是这两种算法给出的是不是同一套物理。

定义 4.2 (线性化规范变换). 对任一向量场 ξ^μ，定义 h 的变分

$$\delta_\xi h_{\mu\nu}:=\partial_\mu\xi_\nu+\partial_\nu\xi_\mu,\qquad \xi_\nu:=\eta_{\nu\rho}\xi^\rho \tag{4.3}$$

它对应坐标变换 $x^\mu\mapsto x^\mu-\xi^\mu$ 在 h、ξ 线性阶的作用。称 δ_ξ 为**规范变换**，ξ 为规范参数。

与章节 3 的 $U(1)$ 情形相比，式 4.3 的规范参数是一个**向量场**而不是一个函数：这里的规范群是微分同胚群，而不是内部的相因子群。这个差别是本章全部内容的来源。

命题 4.1 (线性化曲率是规范不变量). 按 η 定义线性化黎曼张量

$$R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}[h]=\frac{1}{2}\left(\partial_\nu\partial_\rho h_{\mu\sigma}+\partial_\mu\partial_\sigma h_{\nu\rho}-\partial_\mu\partial_\rho h_{\nu\sigma}-\partial_\nu\partial_\sigma h_{\mu\rho}\right) \tag{4.4}$$

并令

$$R^{(1)}_{\mu\nu}=\eta^{\rho\sigma}R^{(1)}_{\mu\rho\nu\sigma},\qquad R^{(1)}=\eta^{\mu\nu}R^{(1)}_{\mu\nu},\qquad G^{(1)}_{\mu\nu}[h]=R^{(1)}_{\mu\nu}-\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}R^{(1)} \tag{4.5}$$

则对式 *4.3* 的任意 ξ，

$$R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}[\delta_\xi h]=0 \tag{4.6}$$

即 $R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}$、$R^{(1)}_{\mu\nu}$、$G^{(1)}_{\mu\nu}$ 都是规范不变量。

证明. 记 $u_{\mu\nu} := \delta_\xi h_{\mu\nu}$。把 u 代入式 4.4 并展开，利用混合偏导可交换把每项的三个求导指标排成同一顺序：

$$\begin{aligned} 2R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}[u] &= \partial_\mu\partial_\nu\partial_\rho\xi_\sigma + \partial_\nu\partial_\rho\partial_\sigma\xi_\mu + \partial_\mu\partial_\nu\partial_\sigma\xi_\rho + \partial_\mu\partial_\rho\partial_\sigma\xi_\nu \\ &\quad - \partial_\mu\partial_\nu\partial_\rho\xi_\sigma - \partial_\nu\partial_\rho\partial_\sigma\xi_\mu - \partial_\mu\partial_\nu\partial_\sigma\xi_\rho - \partial_\mu\partial_\rho\partial_\sigma\xi_\nu \\ &= 0 \end{aligned}$$

八项按 ξ 的下标分成四对，逐对相消，得式 4.6。由 $R^{(1)}_{\mu\nu}$ 与 $G^{(1)}_{\mu\nu}$ 是 $R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}$ 的 η-缩并，规范不变性随之成立。■

于是 $R^{(1)}_{\mu\nu\rho\sigma}$ 是 h 的“场强”，地位等同于章节 3 中的 $F_{\mu\nu}$：它只依赖 h，且对规范变换不敏感，因此是 h 所携带的**可测量内容**。h 本身不是。

4.2 线性理论：无质量自旋 2 的场方程

线性理论要求场方程对 h 是线性的。下面把“线性、规范不变”这一要求推到尽头。

命题 4.2 (无质量线性规范不变方程的完整分类). *设 $h \mapsto E_{\mu\nu}[h]$ 是一个线性映射，满足*

1. **常系数、至多二阶导**：*$E_{\mu\nu}$ 是 h 及其一、二阶导数的线性组合，系数为常数；*
2. **张量性**：*$E_{\mu\nu}$ 洛伦兹协变，且 $E_{\mu\nu} = E_{\nu\mu}$；*
3. **规范不变**：*$E_{\mu\nu}[\delta_\xi h] = 0$ 对一切 ξ 成立。*

则存在常数 α, β 使

$$E_{\mu\nu}[h] = \alpha\, G^{(1)}_{\mu\nu}[h] + \beta\left(R^{(1)}_{\mu\nu} - \frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}\right) \tag{4.7}$$

其中 $G^{(1)}$、$R^{(1)}$ 见式 4.5。于是 $E = 0$ 只有三种可能：

- *$\alpha \neq 0$ 且 $\alpha + \beta \neq 0$：$E = 0 \iff G^{(1)}_{\mu\nu} = 0$，即**线性化爱因斯坦方程**；*
- *$\alpha = 0$：$E = 0 \iff R^{(1)}_{\mu\nu} - \frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)} = 0$，即线性化的**无迹方程**，其解集真包含上一情形；*
- *$\alpha + \beta = 0$ 且 $\alpha \neq 0$：$E = 0 \iff R^{(1)} = 0$，只是一个标量方程，不足以充当 h 的场方程。*

特别地，规范不变性强制无质量：一切零阶项（如 $m^2 h_{\mu\nu}$）都被式 4.3 排除。

证明. 满足条件 1、2 的最一般表达式是

$$E_{\mu\nu} = a\,h_{\mu\nu} + g\,\eta_{\mu\nu}h + b\,\partial^2 h_{\mu\nu} + c\,\partial_{(\mu}\partial^{\alpha}h_{\nu)\alpha} + d\,\partial_\mu\partial_\nu h + e\,\eta_{\mu\nu}\partial^2 h + f\,\eta_{\mu\nu}\partial^\alpha\partial^\beta h_{\alpha\beta} \tag{4.8}$$

七个待定系数，且这是全部：零阶导的对称协变结构只有 $h_{\mu\nu}$ 与 $\eta_{\mu\nu}h$ 两项；一阶导的结构不存在（单独一个导数指标无处缩并）；二阶导恰为上列五项。

对 $u_{\mu\nu} = \delta_\xi h_{\mu\nu}$ 逐项计算（用到 $\partial^2 u_{\mu\nu} = \partial_\mu\partial^2\xi_\nu + \partial_\nu\partial^2\xi_\mu$、$\partial^\alpha u_{\nu\alpha} = \partial_\nu(\partial\cdot\xi) + \partial^2\xi_\nu$、$\partial^\alpha\partial^\beta u_{\alpha\beta} = 2\partial^2(\partial\cdot\xi)$）：

$$\begin{aligned} E_{\mu\nu}[u] = {} & a\left(\partial_\mu\xi_\nu + \partial_\nu\xi_\mu\right) + 2g\,\eta_{\mu\nu}\,\partial\cdot\xi + (b+c)\left(\partial_\mu\partial^2\xi_\nu + \partial_\nu\partial^2\xi_\mu\right) \\ & + 2(c+d)\,\partial_\mu\partial_\nu(\partial\cdot\xi) + 2(e+f)\,\eta_{\mu\nu}\,\partial^2(\partial\cdot\xi) \end{aligned} \tag{4.9}$$

这五个结构对 (ξ, μ, ν) 线性无关（取 $\xi \propto e^{\mathrm{i}kx}$，分 $k^2 = 0$ 与 $k^2 \neq 0$ 两步即可判定），故条件 3 等价于

$$a = 0, \qquad g = 0, \qquad b = -c, \qquad d = -c, \qquad e = -f$$

代回式 4.8，并记 $A_{\mu\nu} := \partial_{(\mu}\partial^{\alpha}h_{\nu)\alpha} - \partial^2 h_{\mu\nu} - \partial_\mu\partial_\nu h$、$B := \partial^\alpha\partial^\beta h_{\alpha\beta} - \partial^2 h$，得

$$E_{\mu\nu} = c\,A_{\mu\nu} + f\,\eta_{\mu\nu}B \tag{4.10}$$

由式 4.4 与式 4.5 直接缩并得 $A_{\mu\nu} = 2G^{(1)}_{\mu\nu} + \eta_{\mu\nu}B$ 与 $B = R^{(1)}$，代入式 4.10：

$$E_{\mu\nu} = 2c\,G^{(1)}_{\mu\nu} + (c+f)\eta_{\mu\nu}R^{(1)} \tag{4.11}$$

再用 $R^{(1)}_{\mu\nu} - \frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)} - G^{(1)}_{\mu\nu} = \frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}$，即 $\eta_{\mu\nu}R^{(1)} = 4S_{\mu\nu} - 4G^{(1)}_{\mu\nu}$，其中 $S_{\mu\nu} := R^{(1)}_{\mu\nu} - \frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}$。代入式 4.11：

$$E_{\mu\nu} = 2c\,G^{(1)}_{\mu\nu} + 4(c+f)\left(S_{\mu\nu} - G^{(1)}_{\mu\nu}\right) = (2c - 4(c+f))\,G^{(1)}_{\mu\nu} + 4(c+f)\,S_{\mu\nu} \tag{4.12}$$

即式 4.7，其中 $\alpha = -2c - 4f$，$\beta = 4(c+f)$。

最后是三种情形。第一种：$\eta^{\mu\nu}G^{(1)}_{\mu\nu} = -R^{(1)}$，故对 $E = 0$ 取迹得 $-\alpha R^{(1)} = 0$，于是 $R^{(1)} = 0$，从而 $S_{\mu\nu} = R^{(1)}_{\mu\nu}$、$G^{(1)}_{\mu\nu} = R^{(1)}_{\mu\nu}$，方程化为 $(\alpha+\beta)R^{(1)}_{\mu\nu} = 0$，与 $G^{(1)}_{\mu\nu} = 0$ 同解。第二种：$\alpha = 0$ 时 $E = \beta\left(R^{(1)}_{\mu\nu} - \frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}\right)$，迹恒为零，是 9 个独立方程，不约束 $R^{(1)}$。第

三种：$\alpha+\beta=0$ 时 $E=\alpha\left(G^{(1)}_{\mu\nu}-S_{\mu\nu}\right)=-\frac{\alpha}{4}\eta_{\mu\nu}R^{(1)}$，退化为单个标量方程 $R^{(1)}=0$。■

注记（关于“唯一性”）。上述命题的经典形式只保留第一种情形，并把结论表述为“无质量自旋 2 场的线性方程唯一地是线性化爱因斯坦方程”（见[8–11]）。上面的计算说明这一表述需要两处限定：其一，需要附加一个**非退化**要求以排除第三种情形；其二，$\alpha=0$ 的第二种情形（线性化单模引力）与第一种有相同的规范不变性，只是不约束迹部分。自耦合分析会保留同一分支结构：逐阶自耦合给出广义相对论**或**单模引力二者之一[12]。本章以下只走第一种情形，因为只有它在有源时给出完整的十个场方程。

注记（历史与方法）。把引力建成平直时空上的无质量自旋 2 场，这条路线由 Rosen[13]、Gupta[9]、Kraichnan[14] 与 Feynman[15] 分别发展。Weinberg 后来给出一个不同的入口：从引力子的散射振幅出发，由洛伦兹不变性直接推出普适耦合与引力质量、惯性质量的相等[10]。据命题 4.2，二次作用量在差一个全散度下就是 $\sqrt{-g}R$ 在 $g=\eta+h$ 处展开的二次项；换言之，**线性理论的唯一性不是偶然的，它是被截断的完整理论留下的痕迹**。

4.3 弱场极限与牛顿势

取第一种情形，把耦合常数写出来：h 的场方程为

$$G^{(1)}_{\mu\nu}[h]=8\pi G\,T_{\mu\nu} \tag{4.13}$$

G 是牛顿常数（$c=1$ 下量纲已固定）。在求解之前，先把 $G^{(1)}$ 写成一个更方便的形式。

命题 4.3 (谐和规范与达朗贝尔方程)**.** *由迹 h 构造**迹反转场***

$$\bar{h}_{\mu\nu}:=h_{\mu\nu}-\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}h \tag{4.14}$$

*称条件 $\partial^{\mu}\bar{h}_{\mu\nu}=0$ 为**谐和规范**。任一 h 都可以通过式 4.3 的规范变换落入谐和规范（因为 $\partial^2\xi_{\nu}=-\partial^{\mu}\bar{h}_{\mu\nu}$ 总有解）。在谐和规范下*

$$G^{(1)}_{\mu\nu}[h]=-\frac{1}{2}\partial^2\bar{h}_{\mu\nu} \tag{4.15}$$

于是式 4.13 成为

$$\partial^2\bar{h}_{\mu\nu}=-16\pi G\,T_{\mu\nu} \tag{4.16}$$

特别地，源外 $T_{\mu\nu}=0$ 时，$\bar{h}$ 的每个分量都满足达朗贝尔方程。

证明. 由式 4.4 缩并得

$$R^{(1)}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\left(\partial_\rho\partial_\mu h^\rho{}_\nu + \partial_\rho\partial_\nu h^\rho{}_\mu - \partial^2 h_{\mu\nu} - \partial_\mu\partial_\nu h\right) \tag{4.17}$$

谐和条件等价于 $\partial_\rho h^\rho{}_\nu = \frac{1}{2}\partial_\nu h$，代入式 4.17 得 $R^{(1)}_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\partial^2 h_{\mu\nu}$，取迹得 $R^{(1)} = -\frac{1}{2}\partial^2 h$。代入式 4.5：

$$G^{(1)}_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\partial^2 h_{\mu\nu} + \frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}\partial^2 h = -\frac{1}{2}\partial^2\left(h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}h\right) = -\frac{1}{2}\partial^2\bar{h}_{\mu\nu}$$

即式 4.15。

可达性：由式 4.3，迹反转量的变分为

$$\delta_\xi\bar{h}_{\mu\nu} = \partial_\mu\xi_\nu + \partial_\nu\xi_\mu - \eta_{\mu\nu}\,\partial^\alpha\xi_\alpha \tag{4.18}$$

于是 $\partial^\mu\bar{h}'_{\mu\nu} = \partial^\mu\bar{h}_{\mu\nu} + \partial^2\xi_\nu$，其中 $\bar{h}' = \bar{h} + \delta_\xi\bar{h}$。要求它为零即得 $\partial^2\xi_\nu = -\partial^\mu\bar{h}_{\mu\nu}$。这是 ξ 的线性双曲型方程，给定初值总有解，故谐和规范总可达到（可达性只在无穷远处受边界条件限制）。■

命题 4.4 (源外的平面波只有两个偏振态). 源外 $T_{\mu\nu} = 0$，式 *4.16* 给出 $\partial^2\bar{h}_{\mu\nu} = 0$，其平面波解为

$$\bar{h}_{\mu\nu} = \varepsilon_{\mu\nu}\,e^{\mathrm{i}k_\lambda x^\lambda}, \qquad k_\lambda k^\lambda = 0 \tag{4.19}$$

谐和规范条件给出横向性

$$k^\mu\varepsilon_{\mu\nu} = 0 \tag{4.20}$$

残余规范（$\partial^2\xi_\nu = 0$，仍非平凡）可再用于把迹消为零：由式 *4.18*，迹的变分为 $\delta\bar{h} = -2\,\partial^\alpha\xi_\alpha$，故取满足 $\partial^\alpha\xi_\alpha = \frac{1}{2}\bar{h}$ 的 ξ 即可（与 $\partial^2\xi_\nu = 0$ 相容，因为两边都满足波动方程）。此后 $\varepsilon^\mu{}_\mu = 0$ 且 $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu}$。这就是**横向无迹规范**。取波沿 z 轴传播，$k^\lambda \propto (1,0,0,1)$，则独立的偏振张量只有两个：

$$\varepsilon^{(+)}_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \varepsilon^{(\times)}_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{4.21}$$

相速度为 $|k^0|/|\mathbf{k}| = 1$。计数与此一致：对称张量 $\bar{h}_{\mu\nu}$ 有 10 个分量，谐和规范式 *4.20* 消去 4 个；真空中的残余规范（$\partial^2 \xi_\nu = 0$）仍有 4 个自由度，恰好足以把迹也消为零。剩 2 个，与无质量自旋 *2* 的表示论计数相同：只有螺旋度 $+2$ 与 -2 两个态。

与章节 5 对照：那里证明了二阶双曲型波解在伽利略群下不可能存在（推论 5.1）。因此“存在以不变量速度传播的场扰动”这件事本身，是洛伦兹群而非伽利略群的性质，与场是矢量还是张量无关。

命题 4.5 (牛顿极限). 取 h 静态（$\partial_0 h_{\mu\nu} = 0$）、弱（$|h_{\mu\nu}| \ll 1$），源为静质量密度 ρ（$T_{00} = \rho$，其余分量为零），并取谐和规范。则式 *4.16* 的 00 分量给出

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G\, \rho \tag{4.22}$$

其中 Φ 由 $g_{00} = 1 + 2\Phi$ 定义。沿 g 的测地线运动在非相对论极限下给出

$$\ddot{\mathbf{x}} = -\nabla \Phi, \qquad \ddot{\mathbf{x}} := \frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2} \tag{4.23}$$

即牛顿引力。

证明. 静态时 $\partial^2 = -\nabla^2$，式 4.16 的 00 分量给出 $\nabla^2 \bar{h}_{00} = 16\pi G\rho$。静态无压源的其余分量为零给出 $\partial^2 \bar{h}_{ij} = 0$，配合无穷远衰减条件得 $\bar{h}_{ij} = 0$。记 $\bar{h} := \eta^{\mu\nu}\bar{h}_{\mu\nu}$（由式 4.14 得 $\bar{h} = -h$），则 $\bar{h} = \bar{h}_{00}$，且由 $h_{\mu\nu} = \bar{h}_{\mu\nu} + \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu} h$ 得

$$\bar{h} = \eta^{\mu\nu}\bar{h}_{\mu\nu} = \bar{h}_{00}, \qquad h_{00} = \bar{h}_{00} - \frac{1}{2}\eta_{00}\bar{h} = \frac{1}{2}\bar{h}_{00}, \qquad h_{ij} = -\frac{1}{2}\eta_{ij}\bar{h} = \frac{1}{2}\bar{h}_{00}\,\delta_{ij}$$

令 $\bar{h}_{00} = 4\Phi$，则 $h_{00} = 2\Phi$、$h_{ij} = 2\Phi\,\delta_{ij}$，即 $h_{\mu\nu} = 2\Phi\,\delta_{\mu\nu}$，于是 $g_{00} = 1 + 2\Phi$ 且 $\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$，这就是式 4.22。

测地线方程 $\ddot{x}^i + \Gamma^i_{00} = 0$（非相对论极限下只保留 00 项），而 $\Gamma^i_{00} = \frac{1}{2}\eta^{ij}(-\partial_j g_{00}) = \partial_i \Phi$，故 $\ddot{x}^i = -\Gamma^i_{00} = -\partial_i \Phi$，即式 4.23。■

注意命题 4.5 同时用到 h_{00} 与 h_{ij}：静态无压源的谐和规范解不是“只有 h_{00}”，而是 $h_{\mu\nu} = 2\Phi\,\delta_{\mu\nu}$。迹 $h = -4\Phi$ 不为零，这一点在后文（小节 4.8）还要用到。

4.4 自耦合：非线性被强制

式 4.13 有一个立即可见的困难。线性化比安基恒等式

$$\partial^\mu G^{(1)}_{\mu\nu}[h] \equiv 0 \tag{4.24}$$

对式 4.17 取散度即得式 4.24：第一项与第三项在 ∂^μ 下相消，剩下 $\partial^\mu R^{(1)}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\partial_\nu R^{(1)}$，与 $G^{(1)}$ 的定义合并即恒为零。因此式 4.13 的左端恒等守恒，它**要求**源满足

$$\partial^\mu T_{\mu\nu} = 0 \tag{4.25}$$

而式 4.25 是**平直度规意义上的**守恒：它等价于源的自由运动。但按命题 4.5，源在 h 中并不做自由运动（式 4.23）。于是线性理论与自己的源方程冲突：**源的运动由它产生的场决定，而线性方程要求源做自由运动。**

出路只有一条。物质在 h 中的运动说明，物质自身的能动张量（用 η 度量）不再守恒；逐阶展开后，其不守恒量在最低阶恰好被场的能动张量的负散度抵消，$\partial^\mu T_{\mu\nu} = -\partial^\mu t^{(1)}_{\mu\nu}[h]$。因此源必须换成**总**能动张量，即把场的能量动量也计入。

命题 4.6 (自耦合的封闭性). *设自由理论由式 4.13 的齐次形式给出，耦合常数为 $\kappa := 8\pi G$。要求场方程与源的守恒律自洽，唯一做法是把源替换为总能动张量（物质 + 场本身）：*

$$G^{(1)}_{\mu\nu}[h] = \kappa\left(T_{\mu\nu} + t^{(1)}_{\mu\nu}[h] + t^{(2)}_{\mu\nu}[h] + \cdots\right) \tag{4.26}$$

其中 $t^{(n)}_{\mu\nu}$ 取自作用量的 $n+2$ 次项。则

1. **逐阶唯一**：*第 n 阶的非线性项由低阶项与规范不变性唯一确定；*
2. **级数封闭**：*级数的和恰好是完整爱因斯坦方程*

$$G_{\mu\nu}[g] = \kappa T_{\mu\nu}, \qquad g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} \tag{4.27}$$

其中 $G_{\mu\nu}[g]$ 是 g 的爱因斯坦张量（精确、非微扰）；等价地，作用量的和恰是 $\frac{1}{2\kappa}\int d^4x\sqrt{-g}\,R$ 在 $g = \eta + h$ 处的展开。

这里不给完整证明（第 1 条是一个逐阶的有限计算，第 2 条需要把无穷级数求和）。要点在于**为什么非线性是不可避免的**、以及**为什么它恰好停在爱因斯坦方程上**。

- 一阶形式（Palatini 形式）把这件事化简为一个闭式的三步计算：自由作用量写成 $\sqrt{-\eta}\,\eta^{\mu\nu}\mathrm{Ric}^{(2)}_{\mu\nu}(\Gamma) + h^{\mu\nu}\mathrm{Ric}^{(1)}_{\mu\nu}(\Gamma)$，其能动张量恰为 $\mathrm{Ric}^{(2)}(\Gamma)$，因此三次自耦合项把作用量补成 $(g_0 + h)\mathrm{Ric}^{(2)}(\Gamma) + \mathrm{Ric}^{(1)}(\Gamma) = g\,\mathrm{Ric}(\Gamma)$，即完整的 Palatini 爱因斯坦作用量，求和至此停止[16,17]。
- “不得不自耦合” 与 “恰好停在爱因斯坦方程” 是同一件事的两面。普适耦合——场以

同一个常数与一切能动张量（物质的 $T_{\mu\nu}$ 与自身的 $t_{\mu\nu}$）耦合——在逐阶自洽中被强制出来，而普适耦合就是等效原理的场论表述。

注记（该论证的地位）。“自耦合唯一地给出广义相对论”这一结论被反复讨论。[18] 给出批评性审查，[17] 与[19] 作出回应并给出逐步核对的版本，[12] 显式解出迭代格式并指出解族中还存在单模引力分支（与命题 4.2 的第二种情形对应）。本章不予裁断，只使用该论证的**方向性**内容：一个无质量自旋 2 场若要与守恒源自洽耦合，就不可能停留在线性。

4.5 等效定理

定理 4.1 (两套语言给出同一套可观测量). *固定平直度规 η，令 $g_{\mu\nu}=\eta_{\mu\nu}+h_{\mu\nu}$（$h$ 不要求小）。则“平直背景 + 场 h”的表述（命题 4.6 的级数求和）与“以 g 为基本变量的弯曲时空”表述满足*

1. **场方程相同**：*两者的场方程都是式 4.27，逐字相同；*
2. **解集相同**：*给定相同的物质源与相同的初末条件，两者解集相同；*
3. **不变量相同**：*任一仅依赖 g 的坐标标量——例如固有时 $\int\sqrt{|g_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu|}$、光锥结构、由 g 构造的曲率标量——在两种表述中取相同的值；换言之，两种表述给出相同的事件重合关系。*

证明. (1) 由命题 4.6 的第 2 条直接得到。(2) h 与 g 只差一个固定的 η，故 $h\mapsto g$ 是一一对应；方程相同则解集相同。(3) η 固定，g 由 h 唯一决定，反之亦然；所有只依赖 g 的构造在两种表述下是同一个对象。■

注记（等效不包含什么）。定理 4.1 说的是**动力学**的等同，不是几何的等同。它不蕴含“宇宙实际上是平直的”，也不蕴含其否定。下面一节说明为什么这个区分在等效成立的范围内**无法被观测检验**。

4.6 平直性到哪里去了

命题 4.7 (分解不唯一，只有 g 是可观测的). *设 η' 是 M 上任一与 η 同号的平直度规，并令 $h':=g-\eta'$。则 (η',h') 与 (η,h) 给出同一个 g，因而在定理 4.1 的意义下给出完全相同的一切可观测量。*

特别地，“h 是平直背景上的一个小量”这一陈述依赖分解的选取：一般地 η' 可以选得使 $|h'|$ 在给定点任意大。

证明. g 固定，故 $h'-h=\eta-\eta'$。两种分解下的所有坐标不变量都只是 g 的函数，而 g 相同，故可观测量相同。取 $\eta'=\varphi_*\eta$（φ 为微分同胚）即可使 $|h'|$ 任意大，第二个陈述

成立。■

注记（Kretschmann 式论证）。命题 4.7 是 Kretschmann 1917 年那个著名论证[20] 在场论语言里的版本。Kretschmann 的原始论点是：广义协变这个要求本身不筛选理论，因为任何理论都可以改成广义协变的形式。翻译到这里：**“时空是弯曲的”与“时空是平直的、只是存在一个张量场”不是两个可被实验区分的陈述**——因为一切观测最终都是事件之间的重合，而重合关系在两种语言中相同（定理 4.1 的第 3 条）。把无质量自旋 2 场论与广义相对论作为同一理论的两个表述来处理的系统论述见[21]。

注记（一个必要的澄清）。不应由此得出“平直背景是多余的”。η 在构造中是一个**固定的**结构：它定义了指标升降、定义了命题 4.2 中“线性”这一概念、也定义了式 4.16 的动能项。只是因为最终理论恰好一般协变（微分同胚不变），这个固定结构才被规范掉了。一旦理论失去微分同胚不变性，η 立刻成为物理的（小节 4.7）。因此准确的说法是：**在等效理论内部，平直背景不可观测；在等效被破坏的地方，它可观测。**

4.7 什么会使等效失效

命题 4.6 与定理 4.1 依赖三条要求。改动任一条，η 就获得可观测内容，“平直时空 + 引力场”与广义相对论不再是同一套理论。

表 4.1: 破坏等效的四条途径

改动	得到的理论	背景 η 的地位
给 h 加质量项 $m^2 h_{\mu\nu}$	有质量引力；规范不变性失效，$m \to 0$ 极限不连续[22]	质量项把它变成物理的：传播中多出标量与矢量模式
允许 η 优选一个类时方向	各向异性标度（Lifshitz 型引力）[23]	优选坐标系成为物理的
允许四阶导数（高阶曲率）	二次曲率引力；不能由通常意义的线性化 bootstrap 得到[24]	展开的起点不再是该理论
让 η 也动力学化（两个度规都动力学）	双度规引力[25]	两个度规都是物理的

这四类改动有一个共同特征：它们的可观测量**不能**由 g 单独表达。这正是它们成为“平直时空 + 场”这一表述的**真内容**所在之处——也是唯一能把“平直”与“弯曲”变成一个可检验问题的所在。

注记（与本书主题的接口）。本章的结论可以压成一句：**只要等效成立，“时空是否弯曲”就不是一个可观测量问题。**要在两种语言之间做出区分，必须指出一个破坏等效的具体机制——一个只能写在平直时空语言里、不能改写为 g 的泛函的项。这不是哲学分歧，而是一个可以被写下来的数学要求。

4.8 与本书其它章节的关系

与章节 3 的关系：同一种方法，不同的结局。两章都把场论写在平直时空上，都用规范不变的“场强”刻画可测内容。差别在于**是否自耦合**：$F_{\mu\nu}$ 不带电荷，光子不携带自身的守恒荷，所以麦克斯韦理论在线性层就是终点；而 h 携带能量动量，命题 4.6 表明线性层不是终点。这正是 Deser 所说的“最线性”与“最非线性”的两端[16]。

与章节 5 的关系：波要求洛伦兹群。那里证明伽利略群下不存在二阶双曲型波解（推论 5.1）；这里的线性理论自动给出波（命题 4.4），且只有两个偏振。因此“以不变量速度传播的场扰动”不是场的性质，而是变换群的性质。

与章节 6 的关系：一个判定点。那一章把每一类系统的读数定义为一族给定响应函数 f_i 沿路径的累积，$\omega_i = f_i(\Phi)\,dt$（式 6.2），并定义类间比较量 $X_{ij} = f_i/f_j$ 与 $Q_{ij} = X_{ij}(\Phi_1)/X_{ij}(\Phi_2)$（式 6.12）。若把那个背景场具体化为弱引力场，则按命题 4.5 有 $\Phi = h_{00}/2$，即 $h_{\mu\nu} = 2\Phi\,\delta_{\mu\nu}$。两者的交点落在一个可判定的问题上：

- 若 f_i 对一切 i **相同**，即 $f_i \equiv f$，则 $X_{ij} \equiv 1$、$Q_{ij} \equiv 1$：所有类别以同一速率演化。这正是本章的**普适耦合**，也就是等效原理的内容。
- 若存在 i, j 使 $f_i \neq f_j$，则演化速率依赖系统的物质结构。按小节 4.7，这样的耦合项**不能**改写为 g 的泛函，因此它落在本章等效理论之外。

于是章节 6 的问题在本章有一个明确的分界点：不是“是否多加了一项”，而是“这一项能否写成 g 的泛函”。

4.9 小结

1. **线性层可行。**常系数、至多二阶导、洛伦兹协变、规范不变，这四条把线性场方程限制到一个两项族式 4.7；去掉退化情形后，与线性化爱因斯坦方程同解的只有一条路（命题 4.2）。牛顿极限自动成立（命题 4.5）。

2. **线性层不自洽。**方程左端恒等守恒（式 4.24）而耦合使源不再守恒，因此必须加入场自身的能量动量；级数封闭于完整爱因斯坦方程（命题 4.6）。
3. **两套语言逐字对应。**由 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$，两套表述的场方程、解集与坐标不变量相同（定理 4.1）。
4. **因此“平直时空 + 引力场”不是广义相对论的替代方案，而是同一理论的另一种写法。**背景 η 在等效成立的范围内不可观测（命题 4.7）。
5. **要让它成为不同的理论，必须破坏等效成立的条件之一**（小节 4.7）。这是本章给出的判别标准。

第 5 章　伽利略协变的场方程组：一个纯数学构造

本章为一个假想的“伽利略世界”构造一套自洽的场方程组。这个世界的规则只有两条：**绝对时间**与**速度按伽利略方式叠加**。要回答的问题是纯数学的：能否构造一组偏微分方程，使其在伽利略变换下形式不变，并在速度补偿对象为零时退化为标准麦克斯韦方程组？

本章不讨论物理：方程组中的 c 只是一个参数，不预设它对应现实世界中的任何测量对象。

5.1　设定与目标

定义 5.1 (底空间与群). 底空间为 $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}$，坐标记 $(\mathbf{x}, t)$。变换群取**伽利略群** G：对每个常向量 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$，

$$t' = t, \qquad \mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{u}t \tag{5.1}$$

定义 5.2 (场). 研究对象是两个 $\mathbb{R}^3$ 值光滑场 $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t)$、$\mathbf{B}(\mathbf{x}, t)$。**本节不赋予它们任何物理含义。**

定义 5.3 (标准系统). 称以下四条方程为**标准系统**（即通常所说的真空麦克斯韦方程组，此处仅作为数学对象引用）：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \qquad \nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\, \partial_t \mathbf{E} \tag{5.2}$$

目标（G）构造一组方程，满足：

- **(G1) 形式不变**：在式 5.1 的变换下，方程写成完全相同的形式；
- **(G2) 叠加色散**：其平面波解满足 $\omega = c|\mathbf{k}| + \mathbf{w}\cdot\mathbf{k}$（速度叠加自动成立，$\mathbf{w}$ 见小节 5.2）；

- **(G3) 退化条件**：当补偿速度 $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ 时，严格退化为式 5.2。

5.1.1 “形式不变”的三种含义

这个短语必须先精确化，因为三种含义给出三个不同的问题：

表 5.1: “形式不变”的三种含义

编号	含义	在伽利略群下的可行性
逐字不变	存在一个补偿对象 $\mathbf{w}$，使方程在新坐标系下写成**逐字相同**的式子	可行（本章的做法）
共变	场按群的一个非平凡表示变换，方程形式不变	对所有 $\mathbf{u}$ 被证明不可能（见小节 5.6 的注记）
完全不变	场与方程均不变	与波解的存在性矛盾

对照：洛伦兹协变属于 ，且在那里是免费的——洛伦兹群自带不变量（光锥、达朗贝尔算符 $\partial_\mu\partial^\mu$），场按现成的张量表示变换即可。伽利略群没有这样的不变量， 走不通，于是只剩 ：**引入一个补偿对象，让它替场去变换**。这就是小节 5.2 的引理将要严格证明的事。

记号约定（全章统一）：$\mathbf{u}$ 只出现在坐标变换中，表示**两套坐标之间的相对速度**；$\mathbf{w}$ 只出现在方程中，是**补偿速度**（一个给定的常向量）。c 是方程的参数，不参与任何变换。

5.2 运动学：唯一可用的算子

5.2.1 两个基本恒等式

对式 5.1 直接求导（注意 $t = t'$，$\mathbf{x} = \mathbf{x}' + \mathbf{u}t'$）：

$$\nabla' = \nabla, \qquad \partial_{t'} = \partial_t + \mathbf{u}\cdot\nabla \tag{5.3}$$

梯度不变，时间偏导数不是。这一行是全部构造的起点。

5.2.2 引理：一阶算子的分类

引理 5.1 (算子分类). 设 $L = a\,\partial_t + \mathbf{b}\cdot\nabla$（$a$ 为常数，$\mathbf{b}$ 为某个待定的三维对象）。在式 *5.1* 下，

$$L = a\,\partial_{t'} + (\mathbf{b} - a\,\mathbf{u})\cdot\nabla' \tag{5.4}$$

于是 L 保持形式只有两条出路：

1. $a = 0$：L 退化为纯空间算子 $\mathbf{b}\cdot\nabla$；
2. $\mathbf{b}$ 是一个按 $\mathbf{b}' = \mathbf{b} - a\mathbf{u}$ 变换的对象。

证明将式 5.3 代入 L 展开、合并 $\partial_{t'}$ 与 ∇' 的系数即得式 5.4。

推论 5.1 (无波定理). 若走出路 *1*，则方程组中不含任何时间导数，四条方程退化为 $\mathbb{R}^3$ 上的纯空间约束，其解空间对 t 是常值的——没有波解。要满足 *(G2)*，必须走出路 *2*。

5.2.3 引入补偿速度 $\mathbf{w}$

定义 5.4 (补偿速度与对流导数). 引入一个新对象 $\mathbf{w}$，规定其变换规则为

$$\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u} \tag{5.5}$$

并定义**对流导数**

$$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \;\equiv\; \partial_t + \mathbf{w}\cdot\nabla \tag{5.6}$$

引理 5.2 (对流导数的形式不变性).

$$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} = \mathcal{D}_{t'}^{(\mathbf{w}-\mathbf{u})} \tag{5.7}$$

即：$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}$ 作用在场上，与“在带撇坐标系中用 $\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u}$ 写出的对流导数”是同一个算子。这正是引理 5.1 的出路 2：∂_t **不变不了，就让 $\mathbf{w}$ 替它变。**

证明将式 5.3 与式 5.5 代入式 5.6 的右端：

$$\partial_{t'} + \mathbf{w}'\cdot\nabla' = (\partial_t + \mathbf{u}\cdot\nabla) + (\mathbf{w} - \mathbf{u})\cdot\nabla = \partial_t + \mathbf{w}\cdot\nabla$$

5.2.4 一条硬约束：w 必须是常向量

引理 5.3 (交换性). *对一切光滑场* $\mathbf{F}$，

$$\nabla \times \left(\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\mathbf{F}\right) - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\left(\nabla \times \mathbf{F}\right) = \sum_{i,j,k,l} \varepsilon_{ijk}\left(\partial_j w_l\right)\left(\partial_l F_k\right)\mathbf{e}_i \tag{5.8}$$

上式对一切 $\mathbf{F}$ *为零，当且仅当* $\partial_j w_l = 0$ *对一切* j,l *成立，即* $\mathbf{w}$ **是常向量。**

证明要点展开两端，$w_l\partial_j\partial_l F_k$ 一类的项因偏导数可交换而相消，只剩含 $\partial_j w_l$ 的项。若 $\mathbf{w}$ 非常值，取 $\partial_l F_k$ 为任意矩阵即可使式 5.8 非零。

这条约束的后果：**本构造中 $\mathbf{w}$ 只能取常向量**。若允许 $\mathbf{w} = \mathbf{w}(\mathbf{x}, t)$，则旋度方程与散度方程不再自洽地配对（齐次结构断裂），需要另行引入修正项——那是另一个模型，见小节 5.6 的讨论。

5.3 构造：修改清单

构造只做**一个动作**：凡标准系统中出现 ∂_t 的地方，全部换成 $\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}$。

5.3.1 修改后的方程组（无源）

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{5.9}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\,\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\mathbf{B}, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\,\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\mathbf{E} \tag{5.10}$$

与式 5.2 逐条对照（完整清单见表 5.2）：

表 5.2: 修改清单：只换时间导数，散度方程不动

方程	标准系统	修改后	改动
高斯型 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$	∂_t 不出现	同左	**不动**（∇ 是不变量）
磁高斯 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	∂_t 不出现	同左	**不动**
法拉第型	$\partial_t\mathbf{B}$	$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\mathbf{B}$	换导数

方程	标准系统	修改后	改动
安培型	$\partial_t \mathbf{E}$	$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\mathbf{E}$	换导数
势的定义	$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial_t \mathbf{A}$	$-\nabla\phi - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\mathbf{A}$	同步换
规范变换	$\phi \to \phi - \partial_t \chi$	$\phi \to \phi - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\chi$	同步换

势与规范。定义

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \qquad \mathbf{E} = -\nabla\phi - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\mathbf{A} \tag{5.11}$$

则式 5.9 的两条齐次方程自动成立；规范变换取

$$\mathbf{A} \to \mathbf{A} + \nabla\chi, \qquad \phi \to \phi - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\chi \tag{5.12}$$

它保持式 5.11 不变，从而给出修改后系统自带的规范自由度。这里必须同步替换的原因是：$\nabla\times$ 与 $\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}$ 的可交换性（引理 5.3）正是“齐次方程 $\Leftrightarrow$ 存在势”这条等价性的支柱——$\mathbf{w}$ 取常向量时该等价性完整保留。

5.3.2 有源情形：源项必须同步修改

引入标量源 ρ 与矢量源 $\mathbf{J}$，把高斯型与安培型改为

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\,(\mathbf{J} - \rho\,\mathbf{w}) + \frac{1}{c^2}\,\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\mathbf{E} \tag{5.13}$$

其中 $c^2 = 1/(\mu_0\varepsilon_0)$，$\mu_0, \varepsilon_0$ 仅是记号上的便利。

命题 5.1 (相容性). *式 5.13 自洽的充要条件是源满足*标准连续性方程

$$\partial_t\rho + \nabla\cdot\mathbf{J} = 0 \tag{5.14}$$

即式 5.14 一个字不用改；代价是安培型的源必须是 $\mathbf{J} - \rho\mathbf{w}$。

证明对式 5.13 第二式取散度。左端恒为零；右端给出

$$0 = \mu_0\,\nabla\cdot(\mathbf{J} - \rho\mathbf{w}) + \frac{1}{c^2}\,\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\,\frac{\rho}{\varepsilon_0} = \mu_0\left[\nabla\cdot\mathbf{J} - \nabla\cdot(\rho\mathbf{w}) + \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\rho\right]$$

由引理 5.3（$\mathbf{w}$ 为常向量），$\nabla\cdot(\rho\mathbf{w}) = \mathbf{w}\cdot\nabla\rho$，故方括号内为

$$\nabla\cdot\mathbf{J}-\mathbf{w}\cdot\nabla\rho+\partial_t\rho+\mathbf{w}\cdot\nabla\rho=\partial_t\rho+\nabla\cdot\mathbf{J}$$

两项对流贡献**恰好相消**。

这个“恰好相消”不是巧合：$\mathbf{J}-\rho\mathbf{w}$ 正是“$\mathbf{J}$ 在以 $\mathbf{w}$ 运动的坐标网中的表现”，连续性方程的不变性由此自动成立。

5.4 验证一：形式不变性

5.4.1 定理与证明

定理 5.1 (形式不变性). *在变换式 5.1 与式 5.5 之下，方程组式 5.9–式 5.13 保持形式：新系中的方程是把原方程中的 $\mathbf{w}$ 换成 $\mathbf{w}'=\mathbf{w}-\mathbf{u}$ 后的**逐字相同**的式子。*

证明以法拉第型为例（其余同理）。在带撇坐标系中，

$$\nabla'\times\mathbf{E}=-\,\mathcal{D}_{t'}^{(\mathbf{w}')}\,\mathbf{B}=-\,\mathcal{D}_{t}^{(\mathbf{w})}\,\mathbf{B}$$

其中第二个等号用了引理 5.2。即：带撇系中的方程与原方程逐字相同。散度方程不含 ∂_t，而 $\nabla'=\nabla$，自动不变。

5.4.2 换元定理：这组方程的全部解都是已知的

定理 5.2 (换元定理). *作变量替换*

$$\xi=\mathbf{x}-\mathbf{w}t,\qquad \tau=t \tag{5.15}$$

则 $\partial_\tau=\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}$、$\nabla_\xi=\nabla$。于是 $(\mathbf{E},\mathbf{B})$ 是修改后方程组的解，当且仅当 $(\mathbf{E},\mathbf{B})$ 作为 (ξ,τ) 的函数是标准系统式 5.2 的解。

证明直接对式 5.15 求链式法则：$\partial_t|_{\mathbf{x}}=\partial_\tau|_\xi-\mathbf{w}\cdot\nabla_\xi$，移项即 $\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}=\partial_\tau$。

定理 5.2 的含义：修改后方程组的解空间与标准系统的解空间之间只隔着一个**伽利略换元**——每一个解都是“标准解的剪切像”（把标准解沿速度 $\mathbf{w}$ 平移）。因此本构造**没有制造新的数学内容**，它做的是：把标准系统与伽利略群**打包成一个整体**，使形式不变性成为构造的自动性质而非事后检验。这正是 （逐字不变 + 补偿结构）的本质：**把 所需要的表示变换外包给一个新对象 $\mathbf{w}$ 去承担。**

5.5 验证二：波解与速度叠加

5.5.1 波动方程与色散关系

对式 5.10 的安培型取旋度、用法拉第型消去 $\mathbf{E}$（$\mathbf{w}$ 为常向量，引理 5.3 保证算子可自由交换）：

$$\nabla^2\mathbf{B} - \frac{1}{c^2}\left(\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}\right)^2\mathbf{B} = \mathbf{0} \tag{5.16}$$

对 $\mathbf{E}$ 同理。代入平面波 $e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}$：$\nabla \to i\mathbf{k}$，$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \to -i\,(\omega - \mathbf{w}\cdot\mathbf{k})$，得

$$(\omega - \mathbf{w}\cdot\mathbf{k})^2 = c^2|\mathbf{k}|^2 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\omega = c|\mathbf{k}| + \mathbf{w}\cdot\mathbf{k}} \tag{5.17}$$

（取正向分支；负向分支对应反向传播。）这就是目标 (G2)：**速度叠加不是假设，是从方程里掉出来的。**

5.5.2 相速度、群速度：叠加的两种表现

由式 5.17 直接求导：

$$v_{\mathrm{ph}} = \frac{\omega}{|\mathbf{k}|} = c + \mathbf{w}\cdot\hat{\mathbf{k}}, \qquad \mathbf{v}_{\mathrm{g}} = \nabla_{\mathbf{k}}\,\omega = c\,\hat{\mathbf{k}} + \mathbf{w} \tag{5.18}$$

相速度与群速度都等于“c 加上 $\mathbf{w}$ 在传播方向上的分量”——正是伽利略叠加公式。三个直接推论：

- **各向异性、非色散**：v_{ph} 依赖方向 $\hat{\mathbf{k}}$，但不依赖 $|\mathbf{k}|$；
- **双程速度**：记 $w_{\parallel} = \mathbf{w}\cdot\hat{\mathbf{v}}$。沿 $\hat{\mathbf{v}}$ 往返一趟（单程长 L）的平均速度为

$$v_{\mathrm{rt}} = \frac{2L}{\dfrac{L}{c+w_{\parallel}} + \dfrac{L}{c-w_{\parallel}}} = \frac{c^2 - w_{\parallel}^2}{c} = c\left(1 - \frac{w_{\parallel}^2}{c^2}\right) \tag{5.19}$$

即往返测得的等效速度与 c 的偏差是**二阶小量**——单向测量与双向测量给出不同的答案，这是本模型可内部检验的特征；- **平面波的变换**：由 $\nabla' = \nabla$ 与 $\partial_{t'} = \partial_t + \mathbf{u}\cdot\nabla$，

$$\mathbf{k}' = \mathbf{k}, \qquad \omega' = \omega - \mathbf{u}\cdot\mathbf{k} \tag{5.20}$$

把式 5.17 代入式 5.20 立得 $\omega' = c|\mathbf{k}'| + (\mathbf{w}-\mathbf{u})\cdot\mathbf{k}'$——色散关系在变换下形式不变，

与 $\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u}$ 自洽。

5.6 数学边界：走不通的路与自由参数

5.6.1 注记：为什么路线 走不通（一阶计算）

设仍要求场做非平凡变换 $\mathbf{E}' = \mathbf{E} + a\,\mathbf{u}\times\mathbf{B}$、$\mathbf{B}' = \mathbf{B}$（$a$ 待定），并要求标准系统式 5.2 在伽利略变换下共变。用式 5.3 逐条检验：

法拉第型要求 $a = 1$：

$$\underbrace{\nabla\times(\mathbf{E} + a\,\mathbf{u}\times\mathbf{B})}_{\nabla\times\mathbf{E} - a(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{B}} = -\,(\partial_t + \mathbf{u}\cdot\nabla)\,\mathbf{B} \implies a = 1 \tag{5.21}$$

高斯型要求 $a = 0$：

$$\nabla\cdot\mathbf{E}' = \nabla\cdot\mathbf{E} - a\,\mathbf{u}\cdot(\nabla\times\mathbf{B}) = -a\,\frac{1}{c^2}\,\mathbf{u}\cdot\partial_t\mathbf{E} \overset{!}{=} 0 \implies a = 0 \tag{5.22}$$

a 不能同时等于 0 和 1，矛盾。这就是表 5.1 中 被标为“不可能”的完整一阶论证（系统性的分类与不可能性定理见 Le Bellac–Lévy-Leblond 1973[26]，另见小节 5.7）。**因此引入补偿对象 $\mathbf{w}$（路线 ）不是诸多选项之一，而是保留波解的前提下最省的出路。**

5.6.2 系数层修补为何不够

一个自然的替代设想：不动算子，改系数——令 c 依赖 $\mathbf{w}$（即 $c = c(\mathbf{w})$，相当于把 $\mu\varepsilon$ 当成速度的函数）。这在数学上被封死，三条独立理由：

1. **奇偶性**：系数层给出的色散必为 $\omega = c(\mathbf{w})|\mathbf{k}|$，它是 $\mathbf{k}$ 的**偶函数**且各向同性；而要求式 5.17 含奇部 $\mathbf{w}\cdot\mathbf{k}$——奇偶性对不上。
2. **方向依赖**：$\mathbf{w}\cdot\hat{\mathbf{k}}$ 依赖传播方向，任何标量系数 $c(\mathbf{w})$ 只能给出各向同性的 $|\mathbf{k}|$。
3. **本构层面**：要在本构关系中造出 $\mathbf{w}\cdot\mathbf{k}$，关系式必须显含 $\mathbf{k}$ 的一次幂，即**空间色散（非局域）**。

一句话：**叠加是“算子层”的现象，不是“系数层”的现象。**这也解释了为什么构造只能动 ∂_t。

5.6.3 本构造的三个自由参数

数学给出的是**一族**模型，以下三项是外部输入，数学本身不决定它们：

表 5.3: 本构造的三个自由参数（外部输入）

#	待定项	选项	影响
1	$\mathbf{w}$ 的取值	每个解给定一个常向量	决定该解的 “剪切方向”
2	整体场 vs 可分介质	$\mathbf{w}$ 全局一个，或分区各自给定	多源时速度贡献是**叠加**还是**各自独立**
3	本构是否含剪切分量	弹性张量含/不含剪切项	决定方程是否支持横波解

第 2 项多说一句：若选 “整体场”，多个源对 $\mathbf{w}$ 的贡献按某个权重**叠加**（相向对称的两源在正中恰好抵消）；若选 “可分介质”，各区各自独立。两种都是自洽的数学模型，但**是不同的模型**——选定之前，“两列相向运动的载体之间 $\mathbf{w}$ 取什么” 没有答案。

模型与理论的区别（本构造的定位）：输入 $\mathbf{w}$ 后，式 5.9–式 5.13 的每一条性质都是定理；但 “$\mathbf{w}$ 本身服从什么方程” 数学不回答。给它写一条演化方程、把 “给定” 变成 “解出”，是把本模型升级为理论的下一步——那等于给 $\mathbf{w}$ 自己一个动力学。

5.7 数学谱系注记

本构造的每个组成部分都有前人做过，其中一条与式 5.9–式 5.13 **逐字相同**。按时间顺序：

Hertz（1890）[27]。Hertz 发表过一组运动介质的场方程：∂_t 换成 $\partial_t + \mathbf{v}\cdot\nabla$，源项取 $\mathbf{J} - \rho\mathbf{v}$，散度方程不动——与本构造完全一致（$\mathbf{v}$ 即此处的 $\mathbf{w}$）：

表 5.4: 本构造与 Hertz 1890 方程的逐条对照

本构造	Hertz 1890
$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} = \partial_t + \mathbf{w}\cdot\nabla$	同
源项 $\mu_0(\mathbf{J} - \rho\mathbf{w})$	同
散度方程不动	同
$\mathbf{w}$：带变换规则的补偿对象	$\mathbf{v}$：被拖曳介质的速度（物理解释）

差别只在解释：Hertz 给 $\mathbf{v}$ 一个物理身份（被物质完全拖曳的介质），该解释后来被实验否定；本构造不给 $\mathbf{w}$ 任何身份，只规定变换规则——数学内容相同，承诺更少。

对流波动方程。声学中“风里的波”的标准写法

$$\nabla^2\varphi - \frac{1}{c^2}\left(\partial_t + \mathbf{w}\cdot\nabla\right)^2\varphi = 0$$

正是　型补偿结构在另一学科中的日常形态（气动声学的标准工程方程），风的变换规则同样是 $\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u}$。这说明　的数学结构本身完全体面。

Le Bellac–Lévy-Leblond（1973）[26]。该文对“伽利略群下的电磁型方程”做了系统分类，结论：标准系统在伽利略群下只有 $c \to \infty$ 极限的两个退化版本（电极限、磁极限）能自洽；保留有限 c 时路线　不可能。小节 5.6 的一阶计算是其最简版本。

Newton–Cartan 几何与 Hořava 引力（现代）[23,28]。在当代非相对论场论中，“要让理论伽利略协变，就必须往背景里引入额外结构”已是标准操作：Newton–Cartan 几何需要一个“钟形式”（或等价地一个类时矢量场，文献通称 **ether vector**，即以太矢量）；Hořava 引力（2009）即为恢复伽利略式对称而显式引入该矢量场的当代实例。$\mathbf{w}$ 在这个框架里有精确的几何身份。

5.8　与现实世界的接口

本章自始至终没有做任何物理承诺：

- c 是参数。是否把它认同为现实世界中某个测量值，不是本章的前提；
- $\mathbf{w}$ 是带变换规则的补偿对象。它是否对应任何可观察量，同样推迟；
- 式 5.19 的二阶偏差、式 5.17 的各向异性，在纯数学立场上只是模型内部的可检验特征，用于区分本模型与其他模型，不用于宣判对错。

若日后需要与现实比对：比对的结果只会决定“是否为 $\mathbf{w}$ 另写一个版本（例如给它动力学、或改其变换规则）”，不影响本章任何定理的成立——定理的前提全部在数学内部。

第 6 章　演化速率耦合框架

本章只做数学。它研究一个对象：**在给定的背景场 Φ 下，多类演化系统各自的速率如何由一族响应函数 f_i 给出**。本章不含与运动速度相关的项（那属于另一章的题材），也不涉及任何测量结果。

内容分两部分。**几何部分**（小节 6.1 至小节 6.6）在 Φ 给定的前提下刻画 $\omega_i = f_i(\Phi)\,dt$ 的结构，并给出类别映射 $i \mapsto f_i$ 的三种退化；**动力学部分**（小节 6.7、小节 6.8）让 Φ 自身承担方程，并把它接入量子力学。先给出全章的分层总览：

表 6.1: 五个层次的自由度分布

层	数学对象	该层已确定的	该层仍自由的
一形式层	$\omega_i = f_i(\Phi)\,dt$	叶状结构、精确性判据	无
规范化层	$\mathbb{R}_{>0}$ 的作用与模空间	不变量与协变量的分离	无
射流层	$j_0^n f_i \in \mathcal{J}^n$	一阶数据的线性性	高阶系数
变分层	作用量 $S[\Phi, \psi_i]$	耦合在两侧同时出现	势 V 与初值
算子层	协变 POVM E_i	下半有界障碍、联合可测性	编序约定、时钟子系统

6.1　基本数据

取流形 $M = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$，坐标记为 (x, t)，$x \in \mathbb{R}^n$。t 是 M 上一个固定的、处处非奇的时间函数，其水平集 $\{t = \text{const}\}$ 给出一个余维 1 的叶状结构。

基本数据由四件东西组成：

1. 一个给定函数 $\Phi \in C^\infty(M)$，称为**背景场**；
2. 一个指标集 I，其元素 i 标记 “演化系统的类别”；

3. 对每个 $i \in I$，一个**响应函数** $f_i \in C^\infty(\mathbb{R})$，满足

$$f_i > 0, \qquad f_i(0) = 1 \tag{6.1}$$

4. 对每个 i，定义 1-形式

$$\omega_i := f_i(\Phi)\, dt \in \Omega^1(M) \tag{6.2}$$

及其沿路径 $\gamma : [0,1] \to M$ 的**累积泛函**

$$\tau_i(\gamma) := \int_\gamma \omega_i \tag{6.3}$$

命题 6.1 (基本命题). *τ_i 是路径的加性泛函：对路径的拼接有 $\tau_i(\gamma_1 * \gamma_2) = \tau_i(\gamma_1) + \tau_i(\gamma_2)$。若 γ 满足 $dt > 0$（即处处沿 t 增加方向），则由式 6.1 的 $f_i > 0$ 得 $\tau_i(\gamma) > 0$，故 τ_i 是一个沿 γ 单调递增的标度。*

这里必须先说明一件容易被跳过的事：**在小节 6.1 至小节 6.5 的全部内容中，Φ 只是一个给定的自变量**。它出现在式 6.2 的右边，但没有任何方程决定它，也没有任何对象依赖它的导数或它的源。此处得到的全部结论（叶状结构、模空间、射流塔、余循环）**不依赖 Φ 的具体形式**，只依赖 f_i 与 dt 的乘积结构。

让 Φ 承担真正的数学内容，需要给它一个变分原理——那是小节 6.7 的内容。在此之前，说“框架描述了背景场怎样改变演化速率”是把参数化误当成理论。

6.2 背景场的两类标准情形

小节 6.1 允许 Φ 是任意 C^∞ 函数。本框架关心的背景场有两类，它们给出互相独立的例子，也界定了全章结论的射程。

静态场。取 $\Phi = \Phi(x)$，与 t 无关，即 $\partial_t \Phi = 0$。由式 6.6，只要 $\nabla\Phi \neq 0$ 且 $f_i' \neq 0$，就有 $d\omega_i = f_i'(\Phi)\, d\Phi \wedge dt \neq 0$，于是 τ_i 是真正的路径泛函，不能写成 M 上的单个函数。

线性场。取

$$\Phi(x) = \mathbf{a} \cdot x = \sum_{a=1}^{n} a_a x^a, \qquad \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n \tag{6.4}$$

$\mathbf{a}$ 为常向量。此时 $\partial_a \partial_b \Phi = 0$：场的一阶导数为常数、二阶以上全为零，“梯度处处相同”这一性质正是均匀背景的数学刻画。代入式 6.2 得

$$\omega_i = f_i(\mathbf{a}\cdot x)\,dt \tag{6.5}$$

由于 $d\Phi = \mathbf{a}\cdot dx$ 是常系数 1-形式，精确性判据在此化为更硬的结论：由式 6.6，ω_i 闭 $\iff f_i'(\Phi)\,\mathbf{a} = 0 \iff f_i' \equiv 0$ 或 $\mathbf{a} = 0 \iff f_i \equiv 1$。**除退化情形 $f_i \equiv 1$ 外，线性场下的累积量一律路径依赖。**

两类场的差别只落在 $d\omega_i$ 的取值与精确性结论上，叶本身不受影响：命题 6.4 的 $\ker\omega_i = \ker dt$ 只用到 $f_i > 0$，与 Φ 的具体形式无关。

表 6.2: 两类标准背景场

背景场	Φ	ω_i	ω_i 闭的条件
静态场	$\Phi(x)$	$f_i(\Phi(x))\,dt$	$f_i \equiv 1$ 或 $\nabla\Phi = 0$
线性场	$\mathbf{a}\cdot x$	$f_i(\mathbf{a}\cdot x)\,dt$	$f_i \equiv 1$

两类场的来源：静态场即静引力场下的背景势，线性场即恒加速下的势（势对坐标为线性）。二者在本框架中只是 Φ 的两种选取，不改变任何一层的一般结论。除此两类之外，本章不指定 Φ 的其它形式。

6.3 一形式层：叶状结构与精确性判据

ω_i 是本章唯一的核心对象。它的两个基本微分性质给出全部几何结论。

命题 6.2 (精确性判据). *由式 6.2,*

$$d\omega_i = f_i'(\Phi)\,d\Phi\wedge dt \tag{6.6}$$

因此 ω_i 闭（$d\omega_i = 0$）当且仅当下面两条件之一成立：f_i 为常数（即 $f_i \equiv 1$），或 Φ 不依赖 x（即 $\Phi = \Phi(t)$）。

推论 6.1 (非闭性与路径依赖). *只要 Φ 含有横向依赖且 f_i 非常数，ω_i 就不闭，于是不存在 M 上的单值函数 τ_i 使 $d\tau_i = \omega_i$：累积量只能是式 6.3 那样的路径泛函。此时 τ_i 的值依赖于终点之间的路径，这正是命题 6.1 的加性泛函区别于函数的全部内容。*

命题 6.3 (Frobenius 判据自动成立). *对任意 f_i 与任意 Φ,*

$$\omega_i\wedge d\omega_i = f_i f_i'\,dt\wedge d\Phi\wedge dt = 0 \tag{6.7}$$

故分布 $\ker\omega_i$ 恒可积，叶总是局部存在的。

命题 6.2 与命题 6.3 刻画的是两件**互相独立**的事：Frobenius 管叶是否存在（恒存在），精确性管叶上的标度标签是否单值（一般不单值）。混同这两者会导致错误的结论。

命题 6.4 (叶状结构唯一). 由式 *6.1* 的 $f_i > 0$ 得 ω_i 与 dt 处处成比例，故

$$\ker\omega_i = \ker dt \qquad \text{对一切} i \in I \tag{6.8}$$

即所有类别给出**同一个**叶状结构；其叶空间为一维，可由 t 标识。类别之间的差异不体现在叶上，只体现在横截方向上乘的那个函数 f_i。

关于命题 6.4 有一个值得注意的地位：它说明“所有类别共享同一套等时叶”在本框架中**不是一条额外假设**，而是 $f_i > 0$ 与 $\omega_i \propto dt$ 的自动推论。若要摆脱它，必须放弃 ω_i 只含 dt 的写法，改为一般的 1-形式

$$\omega_i = f_i(\Phi)\,dt + \sum_{a=1}^{n} g_{ia}(\Phi)\,dx^a \tag{6.9}$$

此时命题 6.3 不再自动成立，$\omega_i \wedge d\omega_i = 0$ 成为对 (f_i, g_{ia}) 的**真正约束**，Frobenius 定理开始起作用。这是本框架最自然的推广方向：把“共享等时叶”从推论变成可选项。

6.4 规范化层：不变量与协变量的分离

τ_i 只有作为“读数的标度”才有意义，而标度的整体选择不是数据的一部分。这给出一个一参数规范作用。

命题 6.5 (规范作用). 设 $\kappa > 0$。变换

$$f_i \longmapsto \kappa f_i \qquad (\text{对一切} i \in I \text{ 同时施加}) \tag{6.10}$$

与 $\tau_i \mapsto \kappa\tau_i$ 相应，它不改变任何类别之间的比较。故数据应视为

$$\mathcal{M} := \mathrm{Map}\big(I \times \mathbb{R},\ \mathbb{R}_{>0}\big)\big/\mathbb{R}_{>0}^{\mathrm{diag}} \tag{6.11}$$

式 *6.1* 中的 $f_i(0) = 1$ 正是固定这个一参数自由的规范条件。

命题 6.6 (可比较量的分类). 定义**比值函数**与**两点比较**：

$$X_{ij} := \frac{f_i}{f_j}, \qquad Q_{ij}(\Phi_1, \Phi_2) := \frac{X_{ij}(\Phi_1)}{X_{ij}(\Phi_2)} \tag{6.12}$$

$$P_i(\Phi_1,\Phi_2) := \frac{f_i(\Phi_1)}{f_i(\Phi_2)} \tag{6.13}$$

则 Q_{ij} 在式 6.10 下不变（它定义在 $\mathcal{M}$ 上、不落在 $\mathrm{Map}(I\times\mathbb{R},\mathbb{R}_{>0})$ 上），而 P_i 依赖规范。二者是**不同类型**的对象：前者是类别之间的相对量，后者是单一类别在两个场值之间的比值，只有先固定标度约定才有意义。

把 f_i 在 $\Phi=0$ 附近作一阶展开（细节见小节 6.5），代入式 6.12，得 Q_{ij} 的一阶形式

$$Q_{ij}(\Phi_1,\Phi_2) = 1 + \left(\alpha_i-\alpha_j\right)(\Phi_1-\Phi_2) + O\left((\Phi_1-\Phi_2)^2\right) \tag{6.14}$$

即：**一阶的类别依赖完全由 $\alpha_i-\alpha_j$ 承担。**

6.5 射流层：泰勒展开即射流投影

f_i 的泰勒展开在数学上不是“近似技巧”，而是**到 n 阶射流的投影**。

$$f_i(\Phi) = 1 + \alpha_i\Phi + \beta_i\Phi^2 + O\left(\Phi^3\right), \qquad \alpha_i = f_i'(0),\quad \beta_i = \tfrac{1}{2}f_i''(0) \tag{6.15}$$

命题 6.7 (截断即射流). 记 $j_0^n f_i \in \mathcal{J}^n$ 为 f_i 在 0 处的 n-射流。n 阶截断下的全部数据是映射

$$\mathbf{j}^n:\ I \longrightarrow \mathcal{J}^n, \qquad i \longmapsto j_0^n f_i \tag{6.16}$$

“只保留一阶项”就是把式 6.16 复合上投影 $\mathcal{J}^n\to\mathcal{J}^1$。

命题 6.8 (对数一阶线性化). 由式 6.15，

$$\log f_i(\Phi) = \alpha_i\Phi + \left(\beta_i - \tfrac{1}{2}\alpha_i^2\right)\Phi^2 + O\left(\Phi^3\right) \tag{6.17}$$

因此 $\log X_{ij} = \left(\alpha_i-\alpha_j\right)\Phi + O(\Phi^2)$：一阶层次的类别依赖是**线性**的，且其“斜率”正是 $\alpha_i-\alpha_j$。

命题 6.9 (余循环结构). X_{ij} 满足

$$X_{ii}=1, \qquad X_{ij}X_{jk}=X_{ik}, \qquad X_{ij}=X_{ji}^{-1} \tag{6.18}$$

即 $\{X_{ij}\}$ 是指标集 I 上取值于乘法群 $C^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R}_{>0})$ 的 1-余循环（把 I 视为离散群胚）。于是有精确的对应：

$$\text{“普适”} \iff \{X_{ij}\} \text{ 为平凡余循环} \iff f \text{ 经} \mathbb{R} \to \mathrm{Map}(I \times \mathbb{R}, \mathbb{R}_{>0}) \text{ 分解} \tag{6.19}$$

一阶层次上，式 *6.19* 化为最简形式：**普适 $\iff$ 映射 $i \mapsto \alpha_i$ 为常值映射**。于是“类别依赖”的全部一阶内容，就是实值映射 $\alpha : I \to \mathbb{R}$ 偏离常值映射的程度。

6.6 三种退化情形

式 6.16 的像由映射 $i \mapsto f_i$ 完全决定。按“类别依赖”的强弱，这个映射只有三种定性可能。

（一）无改变：绝对时间。若 $f_i \equiv 1$ 对一切 i 成立，则式 6.2 给出 $\omega_i = dt$：所有类别的读数都等于 t 本身，Φ 不出现在任何 ω_i 中。此时 $X_{ij} \equiv 1$（式 6.12）、$\alpha_i - \alpha_j \equiv 0$（式 6.14），类别之间的比较没有任何内容。这是“背景场不改变任何类别速率”的数学形式，即绝对时间。

（二）共同改变：单一读数。若 $f_i = f$ 与 i 无关，则所有类别的 ω_i 相同，$\{X_{ij}\}$ 平凡（式 6.19），一阶上 $\alpha_i \equiv \alpha$ 为同一常数。此时式 6.2 的整体形状 $\omega = f(\Phi)\,dt$ 对一切类别一致，可用**单个**几何对象（共同的刻度场 $f(\Phi)$）编码，类别之间不存在可比较的差异。这正是相对论性引力理论所处的位置：所有物质结构以同一函数响应背景场，于是背景场的作用可被整体吸收进一个共同的几何描述。

（三）分类别改变：类别依赖。若 $i \mapsto f_i$ 非常值，则 $X_{ij} \neq 1$、$\alpha_i - \alpha_j$ 不全为零，式 6.14 给出非平凡的类别比较。此时不存在能同时编码全部 ω_i 的单个几何对象：式 6.2 中乘的 f_i 依赖 i，任何“共同几何”的写法都必须额外指定 I 上的一族函数。**（二）是本情形的特例，**而（一）又是（二）的特例，三者链式嵌套：

$$\text{（一）} \subseteq \text{（二）} \subseteq \text{（三）} \tag{6.20}$$

表 6.3: 类别映射的三种退化

情形	条件	f_i	类别依赖	位置
（一）绝对时间	$f_i \equiv 1$，$\forall i$	常值 1	无	Φ 不改变速率

情形	条件	f_i	类别依赖	位置
（二）普适	$f_i = f$，与 i 无关	单个函数	无（余循环平凡）	相对论性引力理论
（三）类别依赖	$i \mapsto f_i$ 非常值	多个函数	$\alpha_i - \alpha_j \neq 0$	一般框架，含（二）为特例

判据只有一条：**看映射** $i \mapsto \alpha_i$。它与式 6.19 的余循环判据一致——精确层面看 $\{X_{ij}\}$ 是否平凡，一阶层面看 α_i 是否恒为同一常数；$\alpha_i \equiv 0$ 则是（一）。

6.7 变分层：让 Φ 承担动力学

小节 6.1 至小节 6.5 里 Φ 是给定的。本节补上决定它的那一层，这也是整个框架此前唯一缺失的部分。

设 M 上另有一个固定背景度规 g。取总作用量

$$S[\Phi, \{\psi_i\}] = \int_M \left[\frac{1}{2}\, g^{ab} \partial_a \Phi\, \partial_b \Phi - V(\Phi) + \sum_{i \in I} \Big(\mathcal{L}_{i,0}(\psi_i) + \lambda_i\, \Phi\, \mathcal{O}_i(\psi_i) \Big) \right] d\mu_g \tag{6.21}$$

命题 6.10 (耦合二重出现). 对 Φ 变分并分部积分（$\nabla^a \nabla_a$ 是 (M, g) 上的 *Laplace–Beltrami* 算子）得

$$\nabla^a \nabla_a \Phi + V'(\Phi) - \sum_{i \in I} \lambda_i\, \mathcal{O}_i = 0 \tag{6.22}$$

对 ψ_i 变分所得的方程中含 $\lambda_i \Phi$ 项。因此**同一组 λ_i 同时出现在场方程与物质方程中**：α_i 由 $\partial \ln \nu_i / \partial \Phi$ 确定，而 ν_i 的场依赖由 $\lambda_i \Phi \mathcal{O}_i$ 项给出；给定一侧即约束另一侧。这是“α_i 不是自由参数”的变分形式——它是一条数学结论，不是假设。

命题 6.11 (射流塔就是耦合的射流塔). 把 $\mathcal{O}_i$ 在背景 Φ 附近展开并按 Φ 幂次整理，$\mathcal{O}_i$ 的 n 阶背景项给出 f_i 的 n 阶系数。故式 *6.16* 不是任意的射流映射，而是耦合项射流塔的像。

命题 6.12 (隐式方程与可解性). 若物质的拉氏量自身含 Φ（例如通过式 *6.2* 进入时间标度），则 $\mathcal{O}_i = \mathcal{O}_i(\Phi, \psi_i)$ 依赖 Φ，式 *6.22* 变为**隐式**：Φ 同时以自变量与未知函数的身份出现。此时可解性要求 $\nabla^a \nabla_a + V''(\Phi) - \sum_i \lambda_i\, \partial_\Phi \mathcal{O}_i$ 在相应函数空间上满足 *Fredholm* 型条件；不满足则式 *6.22* 无解。这是从“参数化”升级为“理论”必须付出的代价。

6.8 算子层：与量子力学的相容性

本节回答一个可判定的是非题：**本框架与量子力学是否相容**。答案是**相容**。前提是 Φ 为经典背景场，这正是小节 6.1 的设定；唯一会破坏相容性的操作是把 Φ 本身量子化，那超出本章范围。相容的构造是初等的——因为 $f_i>0$，把时间参数 t 换成读数 $\tau_i=\int f_i(\Phi)\,dt$ 是一一的重参数化，而重参数化后的生成元仍自伴，酉性保持。本节真正的技术内容不在于“是否相容”，而在于说明 τ_i 只能是**读数**，不能是单一子系统上的可观测量。

6.8.1 参数化层：相容性成立

命题 6.13 (Stone 定理). *强连续单参数酉群 $U:\mathbb{R}\to\mathcal{U}(\mathcal{H})$ 与其自伴生成元 A（即 $U(t)=e^{-itA}$）一一对应*[29]。

命题 6.14 (重参数化给出自伴生成元). *设 $f_i\in C^1$、$f_i>0$，读数 $\tau_i(t)=\int_0^t f_i(\Phi(\cdot,t'))\,dt'$。若某系统在参数 t 下的演化由自伴生成元 A 给出（$\mathrm{i}\partial_t\psi=A\psi$），则同一演化以 τ_i 为参数满足*

$$\mathrm{i}\,\partial_{\tau_i}\psi=\frac{1}{f_i(\Phi)}\,A\,\psi \tag{6.23}$$

*右端的 $A/f_i(\Phi)$ 在两种情形下都给出良定义的自伴生成元，故演化对 τ_i 始终酉：（a）$\Phi=\Phi(t)$ 时 $f_i(\Phi)$ 是 c-数，A/f_i 只是 A 的 c-数标度；（b）Φ 含空间依赖时见下一小节。注意此处**不能**把 τ 代回收缩成 $U\circ\tau^{-1}$ 并断言它仍是酉群——τ^{-1} 一般不可加，$U\circ\tau^{-1}$ 只是酉算子族而非群同态。正确的对象是式 6.23 中的生成元 $A/f_i(\Phi)$。*

推论 6.2 (参数化层不产生障碍). *用式 6.2 的 $f_i(\Phi)\,dt$ 替换 dt，在参数化层**不产生障碍，也不产生新内容**：不同类别恰好对应同一 A 的不同的 c-数标度 $1/f_i$。相容性在此层成立，且是初等的。*

6.8.2 算子层：空间依赖与编序

Φ 本身可以是经典 c-数函数，但只要它含空间依赖，进入算子的就是复合 $\Phi(\hat{x})$。由 Borel 函数演算，$f_i(\Phi(\hat{x}))=\int f_i(\Phi(\lambda))\,dE_{\hat{x}}(\lambda)$ 在 $f_i\circ\Phi$ 有界时给出有界正算子。

命题 6.15 (编序不可回避). *$f_i(\Phi(\hat{x}))$ 与 A 一般不可交换，故乘积 $f_i(\Phi(\hat{x}))\,A$ 与 $A\,f_i(\Phi(\hat{x}))$ 相差 $[f_i(\Phi(\hat{x})),A]$，不为零。因此“$\mathrm{i}\partial_{\tau_i}\psi=(A/f_i)$”在空间依赖情形下**不是一个定义良好的算子方程**：必须另给一条编序约定（例如 Weyl 编序 $\frac{1}{2}\{f_i(\Phi(\hat{x})),A\}_+^{-1}$）。不同约定给出不同的自伴生成元，其差不能被式 6.10 的重参数化吸收。这是式 6.23 从情形（a）推广到*

情形（b）必须补的**第一项数据**。补上后演化仍酉——编序只影响生成元的具体形式，不影响酉性。

命题 6.16 (下半有界障碍). 设 A 自伴且下半有界（$\exists c:\ A \geq cI$）。则不存在自伴算子 T 使 $[T, A] = i$[30]。

证明. 由 $[T, A] = i$ 得 $e^{-isT} A e^{isT} = A + s$ 对一切 $s \in \mathbb{R}$。酉共轭保持谱，故 $\mathrm{spec}(A) + s = \mathrm{spec}(A)$，即谱集对一切平移不变；自伴算子的谱非空，故 $\mathrm{spec}(A) = \mathbb{R}$，与下半有界矛盾。

推论 6.3 (时间算子不存在，时钟必须是关系的). 若生成元是下半有界的（这是最常见的情形），则不存在自伴 T 满足对易关系。同一论证可推广到**协变 *POVM***：不存在满足

$$E(X + s) = e^{-isA} E(X)\, e^{isA} \qquad (X \in \mathcal{B}(\mathbb{R}),\ s \in \mathbb{R}) \tag{6.24}$$

的 *POVM* E。因此“时钟”不能是实现于单一子系统上的算子，只能是两个子系统之间的**相对量**。这是升级到算子层必须补的**第二项数据**。

6.8.3 关系性结构：正确的载体

取 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_R \otimes \mathcal{H}_C$，约束算子

$$K := A_R \otimes 1 - 1 \otimes A_C, \qquad \mathcal{H}_{\text{phys}} := \ker K \tag{6.25}$$

对 $\Psi \in \ker K$ 与时钟子系统的协变 POVM E_C，以读数 τ 为条件给出的 $\mathcal{H}_R$ 上的条件态随 τ 演化。这正是关系性时钟的构造方式[31]。框架中的族 $\{f_i\}_{i \in I}$ 在这一层对应为：**同一群作用的不同协变 POVM**，等价地对应不同的时钟生成元 $A_C^{(i)}$。

命题 6.17 (联合可测性). 两个协变 *POVM* E_1, E_2 **相容**，指存在联合 *POVM* E 以 E_1, E_2 为边缘。成立：

- E_1, E_2 处处可交换 $\Longrightarrow$ 相容（取 $E(X \times Y) := E_1(X) E_2(Y)$）；
- 相容 $\not\Longrightarrow$ 可交换（非锐化可以挽救不相容，故相容性严格弱于可交换性）；
- E_1, E_2 均为**投影值**测度时：相容 $\iff$ 可交换。

推论 6.4 (比较量需要加噪预算). Q_{ij} 的定义（式 6.12）需要**同时**取两类系统的读数，因此 Q_{ij} 的可实现性要求 E_i, E_j 相容。由命题 6.17，当 E_i, E_j 由不可交换的生成元给出时，Q_{ij} 只能以加噪（*unsharp*）版本实现，所需的最小噪度由 $\left[A_C^{(i)}, A_C^{(j)}\right]$ 控制。这是升级到算子层必须补的**第三项数据**：一个加噪预算。

命题 6.18 (读数精度与生成元展宽). 由 *Mandelstam–Tamm* 不等式[32]（取 $\hbar = 1$）：对任

意自伴 X 与状态 ϱ，令 $\Delta t := \Delta X \,/\, \left|\frac{d}{dt}\langle X\rangle_\varrho\right|$，则

$$\Delta t \cdot \Delta A \;\geq\; \frac{1}{2} \tag{6.26}$$

推论 6.5 (量级形式). 若两类系统的读数分辨率分别受 $\Delta t_i \gtrsim 1/(2\Delta A_i)$ 限制，则比较量 Q_{ij} 的分辨率不低于 $\Delta t_i + \Delta t_j$ 量级，于是 $\alpha_i - \alpha_j$ 的可分辨下界由两类系统生成元的展宽之**倒数和**控制。这是本框架与量子力学之间能写成不等式的联系。

6.8.4 算子层的结论

判定的答案是：

本框架与量子力学相容。参数化层：相容，构造初等（式 6.23）。算子层：Φ 的空间依赖引入编序（命题 6.15），不构成障碍；τ_i 只能是读数而非单一子系统上的可观测量（命题 6.16、推论 6.3、命题 6.17、命题 6.18），这与框架把 τ_i 当作读数的设定一致。唯一会使相容性失效的操作是把 Φ 本身量子化——背景场不再经典，式 6.2 的形式需重建，这超出本章范围。

6.9 工具清单

把各层用到的数学工具与所得结论并列：

表 6.4: 各层的数学工具与结论

层	工具	出处	结论
背景场	两类标准场与精确性判据	微分几何	静态场 / 线性场下的路径依赖（小节 6.2）
一形式层	外微分、Frobenius 定理	微分几何	叶状结构唯一（命题 6.2、命题 6.3、命题 6.4）
规范化层	群作用与模空间	范畴/群论	不变量与协变量的分离（命题 6.5、命题 6.6）

层	工具	出处	结论
射流层	射流丛、余循环	微分代数、同调代数	截断即投影、普适性判据（命题 6.7、命题 6.8、命题 6.9）
退化情形	余循环平凡性判据	群论	绝对时间 / 普适 / 类别依赖三分（小节 6.6）
变分层	变分法、隐函数定理	分析	耦合二重出现、隐式可解性（命题 6.10、命题 6.11、命题 6.12）
算子层	函数演算、Stone 定理、POVM	泛函分析	相容性成立、重参数化生成元、关系性读数（命题 6.14、命题 6.15、命题 6.16、命题 6.17、命题 6.18）

三点总结：

1. Φ **是否承担内容，是可以判定的。**在小节 6.3 与小节 6.5 中它不承担：那里的结论只用到 f_i 与 dt 的乘积结构（式 6.2）。只有在小节 6.7 给它作用量之后，它才开始出现在方程中；也从此开始，式 6.22 的隐式性成为一个必须处理的技术问题。
2. **框架的“类别依赖”被精确地定位在一个余循环上。**式 6.18 与式 6.19 把它归结为映射 $i \mapsto \alpha_i$ 偏离常值的程度；式 6.14 给出它在两点比较中的可比较形式。小节 6.6 把这条判据展开成三个层次：绝对时间（$f_i \equiv 1$）、普适（f_i 与 i 无关）、类别依赖（一般情形），后两者由式 6.20 链式包含。
3. **与量子力学相容。**判定的答案是肯定的：重参数化给出自伴生成元 $A/f_i(\Phi)$（式 6.23），酉性保持。Φ 的空间依赖需要编序约定（命题 6.15），τ_i 需要关系性实现（推论 6.3、推论 6.4、推论 6.5）——两者都不构成障碍。只有把 Φ 量子化才会破坏相容性。

本章的一般情形是小节 6.6 的（三）。它与公理 2.3 所设公理（即情形（一），一条与变换无关的刻度）的关系是包含关系（式 6.20）：把“单一刻度”放宽为“一族与背景场取值有关的刻度”，本章给出这一放宽在每一层应付出的数学代价。

参考文献

[1] EINSTEIN A. Zur Elektrodynamik bewegter Körper[J/OL]. Annalen der Physik, 1905, 322(10): 891-921. DOI:10.1002/andp.19053221004.

[2] LÉVY-LEBLOND J M. One more derivation of the Lorentz transformation[J/OL]. American Journal of Physics, 1976, 44(3): 271-277. DOI:10.1119/1.10490.

[3] BERZI V, GORINI V. Reciprocity Principle and the Lorentz Transformations[J/OL]. Journal of Mathematical Physics, 1969, 10(8): 1518-1524. DOI:10.1063/1.1665000.

[4] LANDAU L D, LIFSHITZ E M. The Classical Theory of Fields: 卷 2[M]. 4 版. Oxford: Pergamon Press, 1975.

[5] JACKSON J D. Classical Electrodynamics[M]. 3 版. New York: John Wiley & Sons, 1999.

[6] FEYNMAN R P, LEIGHTON R B, SANDS M. 费曼物理学讲义: 新千年版. 第 2 卷 [M]. 李洪芳, 王子辅, 钟万蘅, 译. 第 1 版版. 上海: 上海科学技术出版社, 2020.

[7] GRIFFITHS D J. 电动力学导论 [M]. 贾瑜, 张鹏飞, 译. 4 版. 北京: 机械工业出版社, 2025.

[8] FIERZ M, PAULI W. On relativistic wave equations for particles of arbitrary spin in an electromagnetic field[J/OL]. Proceedings of the Royal Society of London. Series A, 1939, 173(953): 211-232. DOI:10.1098/rspa.1939.0140.

[9] GUPTA S N. Gravitation and electromagnetism[J/OL]. Physical Review, 1954, 96(6): 1683-1685. DOI:10.1103/PhysRev.96.1683.

[10] WEINBERG S. Photons and gravitons in S-matrix theory: Derivation of charge conservation and equality of gravitational and inertial mass[J/OL]. Physical Review, 1964, 135(4B): B1049-B1056. DOI:10.1103/PhysRev.135.B1049.

[11] ORTÍN T. Gravity and Strings[M/OL]. 2 版. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. DOI:10.1017/CBO9781139019750.

[12] BARCELÓ C, CARBALLO-RUBIO R, GARAY L J. Unimodular gravity and general relativity from graviton self-interactions[J/OL]. Physical Review D, 2014, 89(12): 124019. DOI:10.1103/PhysRevD.89.124019.

[13] ROSEN N. General relativity and flat space. I[J/OL]. Physical Review, 1940, 57(2): 147-150. DOI:10.1103/PhysRev.57.147.

[14] KRAICHNAN R H. Special-relativistic derivation of generally covariant gravitation theory[J/OL]. Physical Review, 1955, 98(4): 1118-1122. DOI:10.1103/PhysRev.98.1118.

[15] FEYNMAN R P, MORINIGO F B, WAGNER W G. Feynman Lectures on Gravitation[M]. Reading, MA: Addison-Wesley, 1995.

[16] DESER S. Self-interaction and gauge invariance[J/OL]. General Relativity and Gravitation, 1970, 1(1): 9-18. DOI:10.1007/BF00759198.

[17] DESER S. Gravity from self-interaction redux[J/OL]. General Relativity and Gravitation, 2010, 42(3): 641-646. DOI:10.1007/s10714-009-0912-9.

[18] PADMANABHAN T. From gravitons to gravity: Myths and reality[J/OL]. International Journal of Modern Physics D, 2008, 17(3): 367-398. DOI:10.1142/S0218271808012085.

[19] BUTCHER L M, HOBSON M, LASENBY A. Bootstrapping gravity: A consistent approach to energy-momentum self-coupling[J/OL]. Physical Review D, 2009, 80(8): 084014. DOI:10.1103/PhysRevD.80.084014.

[20] KRETSCHMANN E. Über den physikalischen Sinn der Relativitätspostulate. A. Einsteins neue und seine ursprüngliche Relativitätstheorie[J]. Annalen der Physik, 1917, 53: 575-614.

[21] WALD R M. Spin-2 fields and general covariance[J/OL]. Physical Review D, 1986, 33(12): 3613-3625. DOI:10.1103/PhysRevD.33.3613.

[22] DAM H van, VELTMAN M J G. Massive and massless Yang-Mills and gravitational fields[J/OL]. Nuclear Physics B, 1970, 22(2): 397-411. DOI:10.1016/0550-3213(70)90416-5.

[23] HOŘAVA P. Quantum gravity at a Lifshitz point[J/OL]. Physical Review D, 2009, 79(8): 084008. DOI:10.1103/PhysRevD.79.084008.

[24] DESER S. Higher curvature gravities, unlike GR, cannot be bootstrapped from their (usual) linearizations[J/OL]. General Relativity and Gravitation, 2017, 49(12): 149. DOI:10.1007/s10714-017-2308-6.

[25] HASSAN S F, ROSEN R A. Bimetric gravity from ghost-free massive gravity[J/OL]. Journal of High Energy Physics, 2012, 2012(2): 126. DOI:10.1007/JHEP02(2012)126.

[26] LE BELLAC M, LÉVY-LEBLOND J M. Galilean electromagnetism[J/OL]. Il Nuovo Cimento B, 1973, 14(2): 217-234. DOI:10.1007/BF02895715.

[27] HERTZ H. Ueber die Grundgleichungen der Electrodynamik für bewegte Körper[J/OL]. Annalen der Physik, 1890, 277(11): 369-399. DOI:10.1002/andp.18902771102.

[28] DUVAL C, BURDET G, KÜNZLE H P, 等. Bargmann structures and Newton–Cartan theory[J/OL]. Physical Review D, 1985, 31(8): 1841-1853. DOI:10.1103/PhysRevD.31.1841.

[29] NIELSEN M A, CHUANG I L. Quantum Computation and Quantum Information[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

[30] BUSCH P, GRABOWSKI M, LAHTI P J. Operational Quantum Physics: 卷 31[M/OL]. Berlin: Springer, 1995. DOI:10.1007/978-3-540-49239-9.

[31] PAGE D N, WOOTTERS W K. Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables[J/ OL]. Physical Review D, 1983, 27(12): 2885-2892. DOI:10.1103/PhysRevD.27.2885.

[32] MANDELSHTAM L I, TAMM I E. The uncertainty relation between energy and time in non-relativistic quantum mechanics[J]. Journal of Physics (USSR), 1945, 9: 249-254.