

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 16/09/2024



Esercizio 1

Il primo quesito consiste in 2 **domande a risposta aperta** da un punto ciascuna. Per i quesiti 2, 3 e 4 ci si deve esprimere sulla **correttezza o falsità di 6 affermazioni**. Si ottengono 0, 1 e 2 punti in base al numero di risposte corrette, errori o risposte in bianco, secondo lo schema:

6 corrette → 2 punti
5 corrette + 1 errore → 1 punto
5 corrette + 1 bianca → 1 punto
4 corrette + 2 bianche → 1 punto
Tutti gli altri casi → 0 punti

1. 2 Punti Si consideri un metodo iterativo per sistemi lineari della forma

$$x_{m+1} = Hx_m + c, \quad H \in \mathbb{C}^{n \times n}, \quad c \in \mathbb{C}^n.$$

Si scriva il codice Matlab/Octave di una funzione `metodo_it` che prende in ingresso la matrice H , il vettore c , un punto di partenza x_0 ed un numero di iterazioni k e restituisce la successione x_1, x_2, \dots, x_k memorizzata nelle colonne di una matrice $n \times k$.

```
function X = metodo_it(H, c, x0, k)
    X = zeros(size(H, 1), k);
    X(:, 1) = H * x0 + c;
    for j = 2:k
        X(:, j) = H * X(:, j-1) + c;
    end
end
```

2. 2 Punti Sia $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ e si consideri la successione di matrici

$$\begin{cases} A_0 = A \\ A_{k+1} = R_k Q_k, \end{cases}$$

dove Q_k ed R_k formano una fattorizzazione QR della matrice A_k (ovvero $A_k = Q_k R_k$). **Reminder:** questa successione è alla base del metodo QR per il calcolo di autovalori e autovettori.

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4**.

- ☒ ☐ Se A è simmetrica allora A_k è simmetrica per ogni $k \in \mathbb{N}$.
- ☐ ☒ Se A è tridiagonale allora A_k è tridiagonale per ogni $k \in \mathbb{N}$.
- ☒ ☐ Se A è in forma di Hessenberg superiore allora A_k è forma di Hessenberg superiore per ogni $k \in \mathbb{N}$.
- ☒ ☐ Le matrici A_k hanno tutte gli stessi autovalori.
- ☐ ☒ Le matrici A_k hanno tutte gli stessi autovettori.
- ☒ ☐ Le matrici A_k hanno tutte lo stesso numero di condizionamento in norma 2.

3. 2 Punti Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e sia $\alpha \in \mathbb{R}$ radice di ordine p dell'equazione non lineare $f(x) = 0$, con $0 < p < \infty$.

- ☒ ☐ Se $p > 1$ allora $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{|f(x)|}{|x - \alpha|} = 0$.
- ☒ ☐ Se $p > 1$ allora $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{|f(x)|}{|x - \alpha|^p} \in (0, \infty)$.
- ☒ ☐ Se $p > 1$ allora $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{|f(x)|}{|x - \alpha|^{p+1}} = \infty$.
- ☒ ☐ Se $0 < p < 1$ allora $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{|f(x)|}{|x - \alpha|} = \infty$.
- ☒ ☐ Nel caso $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $\alpha = 0$ si ha $p = \frac{1}{3}$.
- ☒ ☐ Se $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ allora p è sicuramente un numero intero.

4. 2 Punti Sia $n > 2$, dire in quale delle seguenti situazioni è richiesto di risolvere uno o più sistemi lineari $n \times n$.¹

- ☐ ☒ Applicare 10 iterazioni del metodo delle potenze ad $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$.
- ☐ ☒ Calcolare la fattorizzazione QR di $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$.
- ☐ ☒ Dati n punti $(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$ trovare la retta che li approssima nel senso dei minimi quadrati.
- ☒ ☐ Dati n punti $(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$ trovare il polinomio di grado al più $n - 1$ che li interpola.

¹La versione originale di questo esercizio coinvolgeva $n + 1$ punti al posto di n nelle risposte da 3 a 6; questo faceva diventare F le affermazioni 4 e 5 dato che il sistema lineare da risolvere risulta $(n + 1) \times (n + 1)$. Dato che non si intendeva togliere punti su questa sottigliezza, sono state considerate valide entrambe le configurazioni di risposte FF e VV per le affermazioni 4 e 5; infine si è conteggiato come una risposta giusta e una sbagliata, quando è stato indicato VF o FV.

- ☒ ☐ Dati n nodi in $[a, b]$, trovare i pesi della formula di quadratura che approssima $\int_a^b f(x)dx$ usando i nodi dati e massimizza il grado di precisione.
- ☐ ☒ Dati n pesi in $[a, b]$, trovare i nodi della formula di quadratura che approssima $\int_a^b f(x)dx$ usando i pesi dati e massimizza il grado di precisione.

Esercizio 2

Sia

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \beta & \dots & \beta \\ \alpha & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \alpha & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times n},$$

una matrice di dimensione $n \times n$, con $n \geq 3$, dipendente dai **parametri complessi** $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, con possibili elementi diversi da zero solo sulla prima riga, sulla diagonale principale e sulla prima sottodiagonale.

(i) 4 Punti Si dica per quali valori dei parametri α, β il metodo di Gauss Seidel è **applicabile** ad un sistema lineare della forma $Ax = b$ (quindi con matrice dei coefficienti uguale ad A) e si determini la matrice di iterazione H_{GS} (che dipenderà da α e β).

(ii) 4 Punti Nel caso $\alpha = 1$ dire per quali valori di β , la matrice H_{GS} risulta **convergente**.
Suggerimento: si divida l'analisi nei casi n pari ed n dispari.

(i) Il metodo di Gauss Seidel è applicabile per qualsiasi scelta dei parametri α, β . La matrice di iterazione è

$$H_{GS} = \begin{bmatrix} 0 & -\beta & \dots & -\beta \\ 0 & \alpha\beta & \dots & \alpha\beta \\ 0 & -\alpha^2\beta & \dots & -\alpha^2\beta \\ 0 & \alpha^3\beta & \dots & \alpha^3\beta \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & (-1)^n \alpha^{n-1} \beta & \dots & (-1)^n \alpha^{n-1} \beta \end{bmatrix}$$

(ii) Per n pari H_{GS} è convergente quando $|\beta| < 1$. Per n dispari H_{GS} è convergente per qualsiasi scelta di β .

Esercizio 3

Sia

$$f(x) = -100 \cdot \frac{(x-1)^2}{x}$$

e si consideri il problema di interpolazione polinomiale sull'intervallo $I = [0.5, 2.5]$.

- (i) 4 Punti Si determini il polinomio di interpolazione nella base di Lagrange su nodi equispaziati in I :

$$0.5 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 2.5$$

distanti fra di loro 0.5 (ovvero $x_{i+1} - x_i = 0.5$) e si determini il suo grado.

- (ii) 2 Punti Si dia un'espressione dell'errore di interpolazione.
- (iii) 2 Punti Usando l'espressione del punto precedente si dia una maggiorazione del valore assoluto dell'errore di interpolazione nel punto $x = \frac{3}{4}$.

- (i) Il polinomio di interpolazione nella base di lagrange è

$$\begin{aligned} p(x) = & -\frac{100}{3}(x-1)\left(x-\frac{3}{2}\right)(x-2)\left(x-\frac{5}{2}\right) - \frac{200}{3}\left(x-\frac{1}{2}\right)(x-1)(x-2)\left(x-\frac{5}{2}\right) \\ & + \frac{400}{3}\left(x-\frac{1}{2}\right)(x-1)\left(x-\frac{3}{2}\right)\left(x-\frac{5}{2}\right) - 60\left(x-\frac{1}{2}\right)(x-1)\left(x-\frac{3}{2}\right)(x-2) \end{aligned}$$

ed ha grado 4 (si può concludere calcolando il coefficiente di x^4 e verificando che è diverso da zero).

- (ii) Dato che f è sufficientemente derivabile, l'errore di interpolazione prende la forma

$$E = -100 \frac{\left(x-\frac{1}{2}\right)(x-1)\left(x-\frac{3}{2}\right)(x-2)\left(x-\frac{5}{2}\right)}{\zeta^6}$$

con $\zeta \in [0.5, 2.5]$.

- (iii) Sostituendo $x = \frac{3}{4}$ e prendendo $\zeta = 0.5$, si ottiene $|E| \leq \frac{2625}{4}$.

Esercizio 4

Sia data la funzione

$$f(x) = 3x^4 + x^2 - 2.$$

- (i) 2 Punti Si dimostri che $f(x)$ ha un'unica radice reale α nell'intervallo $[-1, -0.5]$.
- (ii) Si consideri il metodo di Newton $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ per il calcolo di α :
- 1 Punto si dimostri che il metodo di Newton converge localmente in modo quadratico ad α ;
 - 1 Punto si calcoli la prima iterazione del metodo di Newton (ovvero x_1) a partire da $x_0 = -1$;
 - 2 Punti Si trovi l'espressione di $\varphi'(x)$;
 - 2 Punti Assumendo di sapere che $\varphi'(x)$ è monotona in $[-1, \alpha]$, si dimostri che la successione generata dal metodo di Newton a partire da $x_0 = -1$ converge in modo monotono ad α .
- (i) Valutando la funzione negli estremi si vede che almeno una radice esiste; osservando la derivata si deduce che la funzione è strettamente decrescente su I per cui la radice è unica.
- (ii) – La derivata di f non si annulla in α quindi α è necessariamente radice semplice e questo implica la convergenza quadratica locale di Newton.
- $x_1 = -\frac{6}{7}$.
 - $\varphi'(x) = \frac{(3x^4+x^2-2)(36x^2+2)}{(12x^3+2x)^2}$
 - Dato che $\phi'(\alpha) = 0$, $\varphi'(-1) \in (0, 1)$ e che φ' è monotona, si ha che necessariamente $0 \leq \varphi'(x) < 1$ per ogni $x \in [-1, \alpha]$ e questo implica la convergenza monotona di Newton quando si parte da $x_0 = -1$.