



Fungicida

Químico con Actividad Multisitio
Inorgánico (Electrófilo) de Contacto – Preventivo



FICHA TÉCNICA - Protección Vegetal

RSCO-MEZC-1324-0613-008-53.06

Clasificación: Plaguicida Químico.
Ingrediente Activo: Azufre elemental + Oxicloruro de Cobre.
Composición: 47.84% + 5.22% en peso, equivalente a 687 + 44.63 g i.a./L.
Formulación: Suspensión Acuosa.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Precaución).

Patrón de Uso

Cultivos	Plaga	Dosis	Aplicaciones	Intervalo	Volumen
Aguacate SL	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	200 - 300 mL /100 L de agua	2	8 días	
Berenjena, Chile, Jitomate, Papa, Pimiento (SL)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	3.0 L/ha	3	7 días	240 - 340 L/ha
Calabacita, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (SL)	Mildíu (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	2.5 - 3.0 L/ha		7 días	300 - 400 L/ha
Cidro, Lima, Limón, Mandarina, Naranja, Pomelo, Tangerino, Toronja (SL)	Negrilla de los cítricos (<i>Phyllosticta oleivora</i>)	250-350 mL /100 L de agua	3	7 días	1950 - 2050 L/ha
Mango (O)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	200-400 mL / 100 L de agua	3	14 días	950 - 1050 L/ha

Tiempo de reentrada: 24 h.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: Sin límite (SL).

Límite máximo de residuos: Consultar las tolerancias establecidas para México y país destino de los productos cosechados.

Intervalo entre aplicaciones: 7 a 14 días.


Preparación del producto: El producto debe ser diluido en agua limpia. Vierta el agua en un recipiente, agregue la cantidad recomendada de Ataque® SulfoAmex debidamente medida con ayuda de una probeta, y agite utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos) hasta mezclar perfectamente. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Enjuague con agua limpia el recipiente donde se hizo la premezcla, las aguas de lavado deben ser vertidas al tanque de aplicación. Utilice la mezcla el mismo día de su aplicación.

Aplicación del producto: Inicie las aplicaciones al observar los primeros síntomas. Realice aplicaciones al follaje. En mango iniciar antes de la floración cuando los botones florales empiecen a hincharse. En cítricos iniciar en la etapa de floración y fructificación.


Compatibilidad: No mezclar con otros productos. No se aplique o mezcle con aceites o emulsiones de aceite. Sin embargo, si se desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación.

Contraindicaciones: No aplicar en presencia de viento o en las horas más calientes del día.

Acondicionamiento del Agua




Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Alternativa para manejar la resistencia, al prevenir o retrasar su desarrollo.
- Brinda niveles adicionales y espectro de control de enfermedades, aportando eficiencia con los fungicidas de sitios de acción específicos.
- Efectivo para realizar secuencias, alternancias o mezclas con fungicidas de modo de acción monositio.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de fina (f) a mediana (M).
- Tamaño de gota de 136 µm a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en el tejido a proteger.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimica.com

Elaboración: 06-Jun-2018.
Actualización: 29-Oct-2025.
Versión: 03.
Página: 1 de 1.