



Fungicida

Biológico con Múltiples Modos de Acción, Función e Integridad de la Membrana Celular, Inductor de Defensas en la planta
Contacto – Preventivo con efectos antagónicos hacia fitopatógenos



FICHA TÉCNICA - Protección Vegetal

RSCO-FUNG-0395-X0308-064-1.00

Clasificación: Plaguicida Microbiano.
Ingrediente Activo: *Bacillus subtilis* cepa ATCC 6633.
Composición: 1.00% en peso, equivalente a 9.887 g i.a./L (1.0 x 10¹¹ UFC/L).
Formulación: Suspensión Concentrada.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Oral: >5,000 mg/kg).

Patrón de Uso

Autorizado en Programas Inocuos o Certificados Orgánicos

Cultivo	Plaga	Dosis	Aplicaciones	Intervalo	Volumen
Aguacate (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	1.0 - 2.0 L/ha	3	6 y 7 días	1350 - 1450 L/ha
Ajedrea, Albahaca, Hierbabuena, Menta, Mejorana, Melisa, Orégano, Romero, Salvia, Tomillo (SL)	Mildió (<i>Peronospora spp.</i>)	500 - 1500 mL/100 L de agua	3	7 días	
Ajo, Cebolla, Cebollín, Espárrago (SL)	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>)	1.0 - 2.0 L/200 L de agua	3	7 días	
Arándano, Frambuesa, Fresa, Grosella, Zarzamora (SL)	Mildiu (<i>Peronospora rubi</i>)	1.0 - 2.0 L/ha	3	6 y 8 días	680 - 780 L/ha
Berenjena, Chile, Chile habanero, Jitomate, Pimiento, Tomate de cáscara (SL)	Pudrición de raíz y cuello (<i>Rhizoctonia solani</i>)	200 - 600 mL/ 200 L de agua	1	7 días	90 ml/planta
Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (SL)	Cenicilla (<i>Golovinomyces cichoracearum</i> Erysiphe cichoracearum)	1.0 - 2.0 L/ha	3	7 días	350 - 450 L/ha
Lima, Limonero, Naranja, Pomelo, Tangerino, Toronjo (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	1.0 - 3.0 L/ha	3	14 días	250 - 350 L/ha
Papayo (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	1.0 - 3.0 L/ha	3	14 días	350 - 450 L/ha
Piña (SL)	Pudrición del cogollo (<i>Phytophthora parasitica</i>)	2.0 - 6.0 L/ha	3	14 días	50 mL/planta y 2050-2150 L/ha
Vid (SL)	Mildiu (<i>Plasmopara viticola</i>)	5.0 - 9.0 L/ha	3	7 días	450 - 550 L/ha

Tiempo de reentrada: Esperar a que seque el rocío de la aplicación (4 h).
Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 0 días (Sin Límite).
Límite máximo de residuos: Exento.

Intervalo entre aplicaciones: 6, 7, 8 y 14 días.


Preparación del producto: Agite el producto antes de usarlo. Utilice agua limpia y acondicione el agua de aplicación a un pH de 5.0 a 8.0. Utilice recipientes plásticos para realizar la mezcla. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua en el orden adecuado de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla. Mantenga la agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea.

Aplicación del producto: Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Actúa sobre la pared celular de los hongos, provoca vacuolización y destruye el tubo germinativo y micelio, inhibiendo el proceso de germinación de esporas y el desarrollo de la infección. Realice las aplicaciones en forma preventiva, antes de observar los primeros síntomas de la presencia de la enfermedad y cuando las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo, asegure que el producto tenga contacto con los tejidos expuestos a la enfermedad. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas y cuando el follaje sea denso. Puede aplicarse durante todo el ciclo de cultivo. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del cultivo a asperjar.

Compatibilidad: Compatible con Nutripro® Xtra Alga (Extracto de alga marina *Ascophyllum nodosum*, y de yuca *Yucca schidigera*), Progranix® Mega (Extracto de gobernadora, *Larrea tridentata*), Cu-Back® (Gluconato de cobre), Prozycar® 500 SC (Carbendazim), Spectrum® Trico-Bio (*Trichoderma harzianum*) y Spectrum® Pae L (*Paecilomyces lilacinus*). No deberá mezclarse con bactericidas, productos cúpricos, alcalinos o que alteren el rango de pH de la mezcla. Para las mezclas que se realicen con otros productos se recomienda utilizar los que cuenten con registro autorizado y vigente para los cultivos indicados en su etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.


Contraindicaciones: No use el producto de forma diferente a lo recomendado en su etiqueta. Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté o amenace lluvia y cuando el viento favorezca la deriva. La viabilidad del producto se ve afectada si se expone directamente a los rayos solares. Evite temperaturas superiores a los 40 °C. Durante periodos largos consérvelo bajo refrigeración sin llegar a congelarlo para mantener su viabilidad.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO₃).
- Acondicione el agua para un pH de 5 a 8.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- Alternativa para manejar la resistencia, al prevenir o retrasar su desarrollo.
- Brinda niveles adicionales y espectro de control de enfermedades, aportando eficiencia con los fungicidas de sitios de acción específicos (p.e. Estrobilurinas).
- Efectivo para realizar secuencias, alternancias o mezclas con fungicidas de modo de acción monosito, en programas de manejo de enfermedades.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cona.
- Tamaño de gota fina a media, de 136 µm. a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Aplicación en la zona radicular, con suelo húmedo, en la siembra, emergencia, después del trasplante, y desarrollo.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquímica.com

Elaboración: 25-Oct-2022.
 Actualización: 25-Oct-2022.
 Versión: 01.
 Página: 1 de 1.