



Uso en Jardinería

Insecticida y Acaricida

Contacto e Ingestión



FICHA TÉCNICA - BIO-DIE

RSCO-MEZC-INAC-1101E-X0086-375-12.0

Clasificación: Plaguicida Botánico.
Ingrediente Activo: Argemonina, Berberina, Ricinina y α -Terthienil.
Composición: 3.50% + 2.20% + 2.80% + 3.50% en peso, equivalente a 35.7 + 22.20 + 28.0 + 35.35 g i. a./L.
Formulación: Concentrado Soluble.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Verde).

Patrón de Uso

Insumo para el control de plagas que dañan plantas en áreas verdes y campos de golf

Plaga	Nombre científico	Dosis
Ácaros	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Oligonychus sp.</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Raoiella indica</i>	5 a 15 ml/L de agua
Chinche	<i>Lygus lineolaris</i>	5 a 15 ml/L de agua
Cochinilla	<i>Dactylopius coccus</i>	5 a 15 ml/L de agua
Larva	<i>Trichoplusia ni</i>	5 a 15 ml/L de agua
Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	5 a 15 ml/L de agua
Psílido	<i>Diaphorina citri</i>	5 a 15 ml/L de agua
Pulgones	<i>Aphis spp.</i> <i>Brevicoryne sp.</i> <i>Eriosoma lanigerum</i> <i>Toxoptera aurantii</i>	5 a 15 ml/L de agua
Trips	<i>Thrips tabaci</i> <i>Thrips Palmi</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	5 a 15 ml/L de agua

Tiempo de reentrada: Esperar a que seque el rocío de la aplicación.

Intervalo entre aplicaciones: 4 a 7 días.


Método para preparar el producto: Agite el producto antes de usarlo. Acondicione el agua a un pH de 6 a 6.5. Utilice recipientes plásticos para realizar la mezcla. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua en el orden adecuado de adición de los insumos que contendrá la mezcla. Mantener la agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea.

Aplicación del producto: No use el producto de forma diferente a lo recomendado en su etiqueta. Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Realizar las aplicaciones al observar la presencia de la plaga. Procure que el producto tenga contacto con los insectos inmaduros o adultos presentes; asimismo, que el tamaño de gota y presión de aspersión permitan la cobertura de los sitios donde se localizan las plagas. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas y cuando el follaje sea denso.

Compatibilidad: No lo mezcle con fungicidas cúpricos, azufrados e hidróxido de calcio.


Contraindicaciones: Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo o amenace lluvia, y cuando el viento favorezca la deriva.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO_3).
- Acondicione el agua para un pH de 6 a 6.5.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Alternativa para prevenir o retrasar el riesgo de resistencia.
- No comparte un punto de acción común con otros compuestos y puede ser aplicado libremente.
- Efectivo para realizar secuencias, alternancias o mezclas con insecticidas de diferentes modos de acción.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de fina (F) a mediana (M), de 136 µm a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en los sitios donde se localiza la plaga.

