



Uso en Jardinería

Insecticida
Contacto



FICHA TÉCNICA - BioShot

RSCO-INAC-0910A-X0478-375-60.0

Clasificación: Plaguicida Botánico.
Ingrediente Activo: Extracto de epazote (*Chenopodium ambrosioides*).
Composición: 60.0% en peso, equivalente a 594 g i. a./L.
Formulación: Concentrado Soluble.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Verde).

Patrón de Uso

Insumo para el control de plagas que dañan plantas en áreas verdes y campos de golf

Plaga	Nombre científico	Dosis
Ácaro	<i>Tetranychus urticae</i>	5 a 20 ml/L de agua
Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	5 a 20 ml/L de agua
Pulgon	<i>Aphis gossypii</i> <i>Brevicoryne brassicae</i>	5 a 20 ml/L de agua
Trips	<i>Thrips tabaci</i>	5 a 20 ml/L de agua

Tiempo de reentrada: 2 h.

Intervalo entre aplicaciones: 7 días.


Método para preparar el producto: Agite el producto antes de usarlo. Utilice agua limpia para realizar la aspersión. Acondicione el pH del agua en el rango de 6.5 a 7.5. Utilice recipientes plásticos para realizar la mezcla. Mida la cantidad del producto a aplicar utilizando un recipiente graduado. Se deberá preparar la mezcla agregando la dosis recomendada del producto directamente en la mitad de agua requerida para su aplicación en el orden adecuado de adición a los otros insumos, agite y adicione la cantidad de agua restante. Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea.

Aplicación del producto: No use el producto de forma diferente a lo recomendado en su etiqueta. Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Realizar las aplicaciones al detectar la presencia de la plaga. Procure que el producto tenga contacto con los insectos, que el tamaño de gota y presión de aspersión permita la cobertura de sitios donde se localiza la plaga. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del área a asperjar. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas.

Compatibilidad: Compatible con extractos vegetales, aminoácidos, gluconato de cobre, y sales potásicas de ácidos grasos. Incompatible con sustancias alcalinas.


Contraindicaciones: Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando se prevea lluvia durante y dentro de 2h posteriores a su aplicación, en contra del viento y cuando éste favorezca la deriva.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO_3).
- Acondicione el agua para un pH de 6 a 7.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Alternativa para prevenir o retrasar el riesgo de resistencia.
- No comparta un punto de acción común con otros compuestos y puede ser aplicado libremente.
- Efectivo para realizar secuencias, alternancias o mezclas con insecticidas de diferentes modos de acción.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de fina (F) a mediana (M), de 136 μm a 218 μm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en los sitios donde se localiza la plaga.

