



Uso Urbano

Insecticida
Contacto



FICHA TÉCNICA - BioUrban

RSCO-URB-INAC-0910A-X0063-375-60.0

Clasificación: Plaguicida Botánico.
Ingrediente Activo: Extracto de epazote (*Chenopodium ambrosioides*).
Composición: 60.0% en peso, equivalente a 594 g i. a./L.
Formulación: Concentrado Soluble.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Verde).

Patrón de Uso

Insumo para el control de plagas en áreas urbanas,
predios baldíos y vías de ferrocarril

Plaga	Nombre científico	Dosis
Alacranes	<i>Centruroides</i> spp.	30 a 50 ml/L de agua
Arañas	<i>Argiope trifasciata</i> <i>Physocyclus dugesi</i> <i>Leucauge venusta</i> <i>Neoscona oaxacensis</i>	30 a 50 ml/L de agua
Cucaracha	<i>Blattella germanica</i>	30 a 50 ml/L de agua
Hormigas	<i>Camponotus</i> spp. <i>Paratrechina longicornis</i> <i>Tapinoma sessile</i> <i>Tetramorium</i> spp.	30 a 50 ml/L de agua
Mosca	<i>Musca domestica</i>	30 a 50 ml/L de agua
Mosquitos	<i>Aedes aegypti</i> <i>Culex quinquefasciatus</i> <i>Anopheles albimanus</i>	30 a 50 ml/L de agua

Tiempo de reentrada: 2 h.

Intervalo entre aplicaciones: 4 a 7 días.


Método para preparar el producto: Agite el producto antes de usarlo. Utilice agua limpia para realizar la aspersión. Acondicione el pH del agua en el rango de 6.5 a 7.5. Utilice recipientes plásticos para realizar la mezcla. Mida la cantidad del producto a aplicar utilizando un recipiente graduado. Se deberá preparar la mezcla agregando la dosis recomendada del producto directamente en la mitad de agua requerida para su aplicación en el orden adecuado de adición a los otros insumos, agite y adicione la cantidad de agua restante. Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea.

Aplicación del producto: No use el producto de forma diferente a lo recomendado en su etiqueta. Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Realizar las aplicaciones al detectar la presencia de la plaga. Procure que el producto tenga contacto con los insectos, que el tamaño de gota y presión de aspersión permita la cobertura de sitios donde se localiza la plaga. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del área a asperjar. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas.

Compatibilidad: Compatible con extractos vegetales, aminoácidos, gluconato de cobre, y sales potásicas de ácidos grasos. Incompatible con sustancias alcalinas.


Contraindicaciones: Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando se prevea lluvia durante y dentro de 2 h posteriores a su aplicación, en contra del viento y cuando éste favorezca la deriva.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO_3).
- Acondicione el agua para un pH de 6 a 7.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Alternativa para prevenir o retrasar el riesgo de resistencia.
- No comparte un punto de acción común con otros compuestos y puede ser aplicado libremente.
- Efectivo para realizar secuencias, alternancias o mezclas con insecticidas de diferentes modos de acción.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de fina (F) a mediana (M), de 136 µm a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en los sitios donde se localizan las plagas.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimica.com

Elaboración:
Actualización:
Versión:
Página:

04-Ago-2022.
04-Ago-2022.
01.
1 de 1.