



Herbicida de contacto.

Multisitio (MoA) - Disruptor de membranas celulares, microtúbulos y actividad proteica.

Post-emergente a la maleza, no selectivo, de amplio espectro y no residual.



FICHA TÉCNICA - Protección Vegetal

RSCO-HEDE-0307N-X0569-375-57.89

Clasificación: Herbicida de contacto.
Ingrediente Activo: Sales de amonio de ácidos grasos (C8-18 y C18-insaturados).
Composición: 57.89% en peso, equivalente a 550 g i.a./L (496.6 g/L de ácido pelargónico a 20 °C).
Formulación: Concentrado Soluble.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5.

Patrón de Uso

Permitido para su uso en la producción de cultivos orgánicos

Restricciones de uso NOP/USDA: como herbicida, puede usarse únicamente para el mantenimiento de granjas (carreteras, zanjas, servidumbres de paso, perímetros de construcciones) y cultivos ornamentales (NOP 7 CFR 205.601(b)(1)).

Herbicida de contacto, no selectivo de amplio espectro, para el control de malezas de hoja ancha y angosta, en post-emergencia temprana a la maleza.

Cultivo	Maleza	Dosis	Aplicaciones	Intervalo	Volumen
Arándano	Acahualillo o aceitilla (<i>Bidens aurea</i>)	50 - 100 ml/L de agua	2	7	300 L de agua/ha
Fresa	Acederilla (<i>Oxalis latifolia</i>)				
Frambuesa	Azotacristos (<i>Picris echioides</i>)				
Grosella	Gramma dulce (<i>Paspalum notatum</i>)				
Zarzamora	Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>)				
Vid (0)	Zacate de agua (<i>Echinochloa crus-galli</i>)				
Café (0)	Estrellita amarilla (<i>Jaegerina hirta</i>)	50 - 100 ml/L de agua	2	7	292 - 302 L de agua/ha
	Tripa de pollo (<i>Commelina diffusa</i>)				
	Pasto cuaresma (<i>Digitaria sanguinalis</i>)				
	Zacate de labor (<i>Oplismenus hirtellus</i>)				
Calabaza	Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>)	12 - 30 L/ha	2	7	240 a 244 L de agua/ha
Calabacita	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)				
Chayote	Acahual (<i>Tithonia tubaeformis</i>)				
Melón	Acahualillo (<i>Bidens spp.</i>)				
Pepino	Zacate guinea (<i>Panicum maximum</i>)				
Sandía (0)	Zacate cola de zorra (<i>Setaria geniculata</i>)				
	Zacate de agua (<i>Ixophorus unisetus</i>)				
Jitomate	Bledo verde (<i>Amaranthus spinosus</i>)	12 - 30 L/ha	2	7	240 L de agua/ha
Berenjena	Coquillo (<i>Cyperus sp.</i>)				
Chile	Lechuguilla común (<i>Sonchus oleraceus</i>)				
Okra	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)				
Papa	Hierba de gato (<i>Stachys arvensis</i>)				
Pimiento morrón	Lechosilla (<i>Euphorbia sp.</i>)				
Tomate de cáscara (0)	Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>)				
Limón	Escobilla (<i>Sida rhombifolia</i>)	50 - 100 ml/L de agua	2	7	300 L de agua/ha
Naranja	Pata de gallo (<i>Digitaria sanguinalis</i>)				
Lima	Amargosa (<i>Parthenium hysterophorus</i>)				
Pomelo	Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>)				
Mandarina	Zacate guinea (<i>Panicum maximum</i>)				
Tangerino	Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>)				
Toronjo (0)					
Maíz	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)	12 - 30 L/ha	2	7	250 L de agua/ha
Sorgo (0)	Malva (<i>Malva parviflora</i>)				
	Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>)				
	Pasto pegarropa (<i>Setaria adhaerens</i>)				
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)				
	Mala mujer (<i>Solanum rostratum</i>)				
	Estrellita (<i>Echinochloa colonum</i>)				
	Coquillo (<i>Cyperus esculentus</i>)				
	Campanita (<i>Ipomoea purpurea</i>)				

Tiempo de reentrada: 4 h con el equipo de protección personal puesto; cuando el ingreso se realice después de 24 h, el equipo de protección personal no será necesario.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 0 días.


Intervalo entre aplicaciones: 7 días.

Preparación del producto: agite antes de usarlo. Acondicione el agua a un pH de 5.5 a 6.5. El producto es soluble en agua, para diluirlo vierta la cantidad necesaria directamente en la suficiente cantidad de agua para lograr la cobertura uniforme de la maleza. Por su modo de acción, es necesario el uso de Prowet BioDYNA, surfactante no iónico para asegurar la cobertura y favorecer la efectividad. Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea.


Aplicación del producto: cuanto mayor sea la población de malezas, mayor será la concentración (menor dilución) necesaria para una acción rápida. Aplique cuando la maleza tenga una altura máxima de 10 cm, en condición de sol pleno, asegurando la cobertura total de la maleza, con el follaje completamente seco. Seleccione la dosis conforme al tamaño e infestación de malezas presente en el cultivo. Realice aplicaciones subsiguientes en malezas de difícil control y al observar el rebrote de la maleza. Dirigir las aplicaciones al follaje de las malezas, evite el contacto del cultivo.

Compatibilidad: compatible con coadyuvantes no iónicos. Para las mezclas que se realicen con otros productos, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.


Contraindicaciones: aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Evite aplicar con la maleza mojada por rocío, lluvia o irrigación, en condición de nublado, lloviendo o con previsión de lluvia. Aplicar de acuerdo con las recomendaciones de su etiqueta.




Orden de Mezcla del Producto



Secuencia para la Aplicación



Densidad de la Cobertura



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. pti@grupoultraquimia.com

Elaboración: 25-Sep-2024.
 Actualización: 24-Feb-2026.
 Versión: 02.
 Página: 1 de 1.