



Fungicida

Actividad Multi-sitio

Contacto – Preventivo con acción antiesporulante.



FICHA TÉCNICA – Protección Vegetal

RSCO-FUNG-0309-388-008-052

Clasificación: Plaguicida Químico.
Ingrediente Activo: Clorotalonil.
Composición: 52.00% en peso, equivalente a 720.0 g i.a./L.
Formulación: Suspensión Acuosa.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 4 (Oral: 2,000 mg/kg).

Patrón de Uso

Cultivos	Plaga	Dosis	Aplicaciones	Intervalo	Volumen
Apio (7)	Mancha foliar (<i>Cercospora apii</i>) Podrición del tallo (<i>Rhizoctonia solani</i>) Podrición rosada (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Tizón foliar (<i>Septoria apii</i>)	2.5 - 3.5 L/ha		3 a 4 días	
Cacahuete (14)	Peca de la hoja (<i>Cercospora personata</i>)	2.0 - 2.5 L/ha		10 a 12 días	
Cacao (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum sp.</i>) Mal de hilachas (<i>Corticium koleroga</i>) Podrición negra (<i>Phytophthora palmivora</i>)	200 - 350 ml/100 L de agua			
Cafeto (30)	Mal de hilachas (<i>Corticium koleroga</i>) Mancha de hierro (<i>Cercospora coffeicola</i>) Ojo de gallo (<i>Mycena citricolor</i>)	200 - 250 ml/100 L de agua		3 a 4 semanas	
Calabacita (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum sp.</i>) Cenicilla (<i>Erysiphe cichoracearum</i>) Mancha de la hoja (<i>Alternaria cucumerina</i>) Mildiu (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	1.7 - 2.5 L/ha		7 días	
Cebolla (14)	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>) Mildiu (<i>Peronospora destructor</i>)	2.0 - 3.0 L/ha		7 a 10 días	
Col Coliflor Col de bruselas (SL)	Mancha de la hoja (<i>Alternaria brassicae</i>) Mancha anular (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>) Mildiu (<i>Peronospora parasitica</i>)	2.0 - 3.0 L/ha		7 a 10 días	
Durazno (14)	Tiro de munición (<i>Coryneum beijerinckii</i>) Verrucosis (<i>Taphrina deformans</i>)	200 ml/100 L de agua		15 días	
Frijol (SL) Frijol ejotero (7)	Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>) Moho blanco (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>) Roya (<i>Uromyces phaseoli</i>) Tizón de la vaina y tallo (<i>Diaporthe phaseolorum</i>)	3.0 - 4.0 L/ha		8 días	
Jitomate (SL)	Mancha gris (<i>Stemphylium solani</i>) Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>) Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	2.5 - 3.5 L/ha		7 a 10 días	
Maíz (14)	Mancha foliar (<i>Helminthosporium turcicum</i>)	2.0 - 3.0 L/ha		4 a 7 días	
Melón Pepino Sandía (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum sp.</i>) Cenicilla (<i>Erysiphe cichoracearum</i>) Mancha foliar (<i>Corynespora casicola</i>) Mildiu (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) Roña (<i>Cladosporium sp.</i>)	2.0 - 3.0 L/ha		7 días	
Ornamentales (SL)	Mancha foliar (<i>Mycosphaerella spp.</i>) Mancha negra (<i>Diplocarpon rosae</i>) Podrición de la flor (<i>Botrytis spp.</i>)	125 - 200 ml/100 L de agua		10 a 15 días	
Papa (SL)	Mancha gris (<i>Stemphylium solani</i>) Podrición de semilla y raíz (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>) Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5 - 2.0 L/ha		7 a 10 días	
Papayo (14)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>) Podrición del fruto (<i>Phytophthora sp.</i>)	200 ml/100 L de agua		15 días	
Plátano (7)	Chamusco (<i>Mycosphaerella musicola</i>) Sigatoka negra (<i>M. fijiensis</i> var. <i>difformis</i>)	1.5 - 2.5 L/ha		7 a 10 días	
Soya (42)	Antracnosis (<i>Colletotrichum dematium</i>) Mancha de ojo de rana (<i>Cercospora sojae</i>) Tizón de la vaina y tallo (<i>Diaporthe phaseolorum</i>)	1.3 - 2.5 L/ha		10 a 14 días	

Tiempo de reentrada: 12 h.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 0 días (Sin Límite).

Límite máximo de residuos: Exento.

Intervalo entre aplicaciones: 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 21 y 28, días.


Preparación del producto: Agite el producto antes de usarlo. Acondicione el agua a un pH de 5.5 a 6.5 para una mejor acción del producto. Utilice recipientes plásticos para preparar el producto. Agregue la dosis recomendada del producto en una cubeta con un poco de agua y agite hasta producir una suspensión uniforme. Vierta esta mezcla en el tanque de aplicación que contenga la suficiente cantidad de agua. Calibre su equipo de aplicación para asegurar un cubrimiento uniforme de las superficies tratadas al asperjar hasta el punto de goteo. Para mayor calidad en la aplicación, es recomendable agregar un coadyuvante no iónico.

Aplicación del producto: Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. Inhibe la germinación de esporas y detiene el crecimiento del micelio. Realice las aplicaciones en horas tempranas del día o al atardecer. Aplíquelo contra etapas tempranas de desarrollo del hongo, cuando se presentan los primeros síntomas de la enfermedad. Iniciar aplicaciones después del trasplante o emergencia del cultivo, a la brotación de yemas, en temporada de dormancia, al aparecer las primeras hojas verdaderas, antes y en floración. Procure asperjar hasta el punto de goteo. Agite la mezcla cada vez que recargue el aspersor para asegurar una mezcla homogénea.

Compatibilidad: No mezcle con aceites ni sustancias alcalinas. Cuando se desconozca la compatibilidad con otros productos, deberá realizar una prueba antes de su aplicación para determinar efectos no deseados.

Contraindicaciones: Evite aplicar cuando amenace a lluvia, en horas de calor intenso, y cuando el viento exceda los 15 km/h. No aplicar en soluciones de aspersión con pH superior a 6.5.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO₃).
- Acondicione el agua para un pH de 5.5 a 6.5.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Alternativa para manejar la resistencia, al prevenir o retrasar su desarrollo.
- Brinda niveles adicionales y espectro de control de enfermedades, aportando eficiencia con los fungicidas de sitios de acción específicos.
- Efectivo para realizar secuencias, alternancias o mezclas con fungicidas de modo de acción monositio.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de fina (M) a mediana (M).
- Tamaño de gota de 136 µm a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en el tejido a proteger.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimia.com

Elaboración: 17-Mar-1998.
 Actualización: 12-Oct-2022.
 Versión: 03.
 Página: 1 de 1.