



Fungicida

Mitosis-Citoesqueleto y Proteínas Motoras (Código 1)
Sistémico, con traslocación acropétala – Preventivo y Curativo



FICHA TÉCNICA – Protección Vegetal

RSCO-FUNG-0307-314-002-050

Clasificación: Plaguicida Químico.
Ingrediente Activo: Carbendazim.
Composición: 50.00% en peso, equivalente a 500.00 g i.a./kg.
Formulación: Polvo Humectable.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 4 (Oral: 2,000 mg/kg).

Patrón de Uso

Cultivos	Plaga	Dosis	Aplicaciones	Intervalo	Volumen
Frijol (I4)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>) Tizón del tallo y vainas (<i>Diaporthe phaseolorum</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	500 g/ha		20 días	
Soya (SL)	Mancha ojo de rana (<i>Cercospora sojina</i>) Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>) Tizón del tallo y vainas (<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>Sojae</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	500 g/ha		20 días	
Cacahuete (I4)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>) Antracnosis (<i>Ascochyta</i> spp.) Mancha de la hoja (<i>Cercospora personata</i> , <i>Cercospora arachidicola</i>)	250 - 350 g/ha		14 días	
Ornamentales (SL)	Moho gris (<i>Botrytis</i> spp.) Mancha foliar (<i>Cercospora</i> spp., <i>Septoria chrysanthemi</i> , <i>Ascochyta chrysanthemi</i> , <i>Septoria chrysanthemi</i>) Mancha negra (<i>Diplocarpon rosae</i>) Cenicilla (<i>Sphaerotheca</i> spp.) Pudrición del cuello, Damping-Off, Pudrición radical (<i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Sclerotinia</i> spp.) Pudrición de la corteza (<i>Thielaviopsis</i> spp.)	60 - 90 g/100 L de agua		9 a 14 días	

Tiempo de reentrada: 24 h.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: Los indicados para cada cultivo (días).

Límite máximo de residuos: Consultar las tolerancias establecidas para México y el país destino de los productos cosechados.

Intervalo entre aplicaciones: 9, 14 y 20 días.


Preparación del producto: Acondicione el agua a un pH de 5 a 5.5 para una mejor acción del producto. Llene con agua la mitad de la capacidad del tanque del aspersor. En una cubeta y con un poco de agua, diluya la cantidad del producto a utilizar mezclando vigorosamente hasta formar una lechada; agregue la lechada al tanque del aspersor agitando continuamente. Llene finalmente el tanque con agua. El volumen de agua a aplicar dependerá de la calibración del equipo aspersor.

Aplicación del producto: Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. Actúa de forma preventiva y curativa; inhibiendo la formación del tubo germinativo en esporas, el desarrollo de hifas, la formación de apresorios, y el crecimiento de micelio. Aplíquelo contra etapas tempranas del desarrollo de la infección, cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Mantenga constante la dosis indicada, intervalos de aplicación pueden variar dependiendo de la severidad de la enfermedad. Calibre su equipo de aplicación para asegurar un cubrimiento uniforme de las superficies tratadas. Realice las aplicaciones en horas tempranas del día o al atardecer. Agite la mezcla cada vez que recargue el aspersor para asegurar una mezcla homogénea.

Compatibilidad: No lo mezcle con productos de reacción alcalina. Cuando se desconozca la compatibilidad con otro producto, realice una prueba física previa para evitar efectos no deseados. Para las mezclas que se realicen con otros productos, deberán estar debidamente registrados.


Contraindicaciones: No aplique en horas de calor intenso ni cuando el viento exceda 15 km/h.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO_3).
- Acondicione el agua para un pH de 5 a 5.5.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar



- No aplicar con con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.


Secuencia para la Aplicación

MdA Secuencia	MdA Alternancia	MdA Mezcla
---------------	-----------------	------------



- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Realice mezclas, secuencias o alternancias, con fungicidas de diferentes modos de acción para minimizar la selección de resistencia.
- Mezcle con fungicidas Multisitio (código M) en la misma aplicación, y alterne con ingredientes activos de diferentes modos de acción.
- Limite el número de aplicaciones consecutivas en el programa de control.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de mediana (M) a gruesa (C).
- Tamaño de gota de 177 µm a 349 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 20 a 30 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en el tejido a proteger.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimica.com

Elaboración:
Actualización:
Versión:
Página:

12-Jul-2004.
05-Oct-2022.
03.
1 de 1.