



Insecticida

Entomopatógeno con Modo de Acción Desconocido o Incierto

Contacto- Parasitismo, antibiosis y enzimas líticas



FICHA TÉCNICA - Protección Vegetal

Licencia de uso por la DGSV

Clasificación: Plaguicida Microbiano.
Ingrediente Activo: *Isaria javanica* cepa CHE-CNRCB 307.
Composición: 2.0×10^{12} conidios/500 ml.
Formulación: Dispersión en Aceite.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Oral: >5,000 mg/kg).

Patrón de Uso

Con Licencia de Uso para el Control de *Diaphorina citri*

Cultivo	Plaga	Dosis	Aplicaciones	Intervalo	Volumen
Cítricos (SL)	Psílido asiático de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	1.0 dosis/200 L de agua	Con base en el muestreo	Con base en el muestreo	Al punto de rocío

Tiempo de reentrada: Esperar a que seque la aspersión.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 0 días (Sin Límite).

Límite máximo de residuos: Exento.

Intervalo entre aplicaciones: Con base en el muestreo.


Preparación del producto: Adicione directamente el contenido de un envase en 200 L de agua limpia con un pH de 6 a 7 y con dureza inferior a 300 ppm, se agita hasta obtener una emulsión homogénea.

Aplicación del producto: Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Agite la mezcla cada vez que cargue el equipo de aplicación. Ajustar a 200 lb de presión para iniciar la aplicación. La suspensión se aplicará sobre el follaje y debe realizarse hasta punto de rocío, que se considera cuando la suspensión inicia a formar en la punta de la hoja una gota para derramarse. Las aplicaciones deben realizarse preferentemente por la tarde con la intención de proporcionar las condiciones ambientales más apropiadas. Asimismo, es importante considerar que si existe una baja humedad relativa (<80% HR), se haga la aplicación del hongo tan pronto como sea posible después de un riego.

Compatibilidad: No debe ser mezclado con fungicidas ni productos de reacción alcalina o que alteren el rango de pH de la mezcla. Evite el uso de coadyuvantes iónicos. Cuando se desconozca su compatibilidad con otros productos, se recomienda realizar una prueba previa a la aplicación.


Contraindicaciones: No lo exponga directamente a los rayos solares. Evite temperaturas superiores a los 30 °C durante tiempos prolongados. Durante periodos largos consérvelo bajo refrigeración (2 °C a 9 °C) y evite la congelación. Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté o amenace lluvia y cuando el viento favorezca la deriva.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO_3).
- Acondicione el agua para un pH de 6 a 7.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- Alternativa para manejar la resistencia, al prevenir o retrasar su desarrollo.
- Brinda niveles adicionales y espectro de control de plagas, aportando eficiencia con los insecticidas de sitios de acción específicos.
- Efectivo para realizar secuencias, alternancias o mezclas con insecticidas de modo de acción monosito, en programas de manejo de plagas.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono.
- Tamaño de gota fina a media, de 136 µm a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Determine la presencia de huevos, ninfas o adultos y aplique con población baja.
- Confirme la cobertura en los tejidos donde se localiza la plaga.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimica.com

Elaboración: 26-Sep-2017.
 Actualización: 17-Jun-2024.
 Versión: 06.
 Página: 1 de 1.