



Molusquicida

Modo de Acción Desconocido o Incierto
Contacto e Ingestión



FICHA TÉCNICA - Protección Vegetal

RSCO-MOLU-0802-X0002-375-35.00

Clasificación: Plaguicida Misceláneo.
Ingrediente Activo: Saponinas vegetales (*Q. saponaria*).
Composición: 35.00% en peso, equivalente a 435.155 g i.a./L.
Formulación: Concentrado Soluble.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Oral: >5,000 mg/kg).

Patrón de Uso

Autorizado en Programas Inocuos o Certificados Orgánicos

Cultivo	Plaga	Dosis	Aplicaciones	Intervalo	Volumen
Papaya (SL)	Babosas (<i>Vaginulus plebeius</i> y <i>Arion hortensis</i>)	1.0 a 3.0	3	7 días	Calibrar

Tiempo de reentrada: Esperar a que seque la aspersión.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 0 días (Sin Límite).

Límite máximo de residuos: Exento.

Intervalo entre aplicaciones: 7 días.


Preparación del producto: Agite el producto antes de usarlo. El producto está listo para aplicarse por aspersión utilizando agua como vehículo, no requiere de equipo especial para su aplicación. Utilice agua limpia para realizar la aspersión. Utilice recipientes plásticos para realizar la mezcla. Mida la cantidad del producto a aplicar utilizando un recipiente graduado. Se deberá preparar la mezcla agregando la dosis recomendada del producto directamente en la mitad de agua requerida para su aplicación, agite y adicione la cantidad de agua restante. Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del cultivo a asperjar.

Aplicación del producto: Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Aplique el producto en aspersiones al follaje y a la base de las plantas; iniciar al detectar la presencia de los moluscos y dirigir la aplicación en los sitios donde se localicen. Procure que el producto tenga contacto con los moluscos; asimismo, que el tamaño de gota y presión de aspersión permitan la cobertura de sitios donde se localizan. Aplíquelo en infestaciones bajas o a la primera infestación. Use la dosis mayor en infestaciones altas.

Compatibilidad: Compatible con Coraza 720 (Clorotalonil), Aminofit Xtra (Aminoácidos), Agrimycu 100 (Estreptomycin, Oxitetraciclina), Cu-Back (Gluconato de cobre), Progranic Mega (Extracto de gobernadora), Progranic Nimicide (Extracto de aceite de neem), Ultralux S (Sales potásicas de ácidos grasos), Bio-Die (Argemónina, Berberina, Ricinina, a-Terthienil), Progranic Cinnacar (Extracto de canela), Prowet Ovi-Die (Dioctil sulfosuccinato de sodio). Incompatible con surfactantes aniónicos y agentes oxidantes fuertes. No lo mezcle con productos azufrados, cúpricos ni hidróxido de calcio. Para las mezclas que se realicen con otros productos se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa aplicación.


Contraindicaciones: Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO_3).
- Acondicione el agua para un pH de 7.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Alternativa para prevenir o retrasar el riesgo de resistencia.
- No comparte un punto de acción común con otros compuestos y puede ser aplicado libremente.
- Efectivo para realizar secuencias, alternancias o mezclas con molusquicidas de diferentes modos de acción.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de fina (F) a mediana (M).
- Tamaño de gota fina a mediana, de 136 µm a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en el envés.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquímica.com

Elaboración:
Actualización:
Versión:
Página:

31-Ago-2020.
03-Ago-2022.
02.
1 de 1.