



Uso en Jardinería

Insecticida
Contacto e Ingestión



FICHA TÉCNICA - NATURACIDE Neem 80

RSCO-INAC-0104S-0003-009-080

Clasificación: Plaguicida Botánico.
Ingrediente Activo: Extracto de neem (*Azadirachta indica*).
Composición: 80.00% en peso, equivalente a 738.4 g i. a./L.
Formulación: Concentrado Emulsionable.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Verde).

Patrón de Uso

Insumo para el control de plagas que dañan plantas en áreas verdes y campos de golf

Plaga	Nombre científico	Dosis
Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	5 a 10 ml/L de agua
Cochinillas y piojos harinosos	<i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> <i>Aonidiella aurantii</i> <i>Aspidiotus nerii</i> <i>Lepidosaphes gloverii</i> <i>Lepidosaphes beckii</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Icerya purchasi</i>	5 a 10 ml/L de agua
Larvas	<i>Spodoptera</i> spp. <i>Pseudoplusia</i> sp.	5 a 10 ml/L de agua
Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	5 a 10 ml/L de agua
Pulgones	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i>	5 a 10 ml/L de agua
Trips	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	5 a 10 ml/L de agua

Tiempo de reentrada: Esperar a que seque el rocío de la aplicación.





Intervalo entre aplicaciones: 7 días.

Método para preparar el producto: Agite el producto antes de usarlo. Utilice agua limpia para realizar la aspersión. Acondicione el pH del agua en el rango de 5.5 a 7. Utilice recipientes plásticos para realizar la mezcla. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua en el orden adecuado de adición de los insumos que contendrá la mezcla. Mantener la agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea.

Aplicación del producto: No use el producto de forma diferente a lo recomendado en su etiqueta. Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Realizar las aplicaciones al observar las primeras infestaciones. Procure que el producto tenga contacto con los insectos, que el tamaño de gota y presión de aspersión permita la cobertura de sitios donde se localiza la plaga. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas y cuando el follaje sea denso. No aplicar en plantas recién trasplantadas, en cama de enraizamiento, esquejes, plantas bajo estrés hídrico o con puntos de crecimiento sensibles, cerciórese que no se presenta sensibilidad aplicando en 2 o 3 plantas.

Compatibilidad: Compatible con peróxido de hidrógeno, hidróxido de sodio, zinc y con productos que no modifiquen el rango de pH 5.5 a 7.0. Para las mezclas que se realicen con otros productos se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.

Contraindicaciones: Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo o amenace lluvia y cuando el viento favorezca la deriva.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupo@ultraquimica.com

Elaboración: 17-Ene-2024.
Actualización: 17-Ene-2024.
Versión: 01.
Página: 1 de 1.