



Insecticida

Modo de Acción Desconocido o Incierto
Contacto



FICHA TÉCNICA - Protección Vegetal

RSCO-INAC-0910A-X0384-009-60.00

Clasificación: Plaguicida Botánico.
Ingrediente Activo: Extracto de epazote (*Chenopodium ambrosioides*).
Composición: 60.0% en peso, equivalente a 594.0 g i.a./L.
Formulación: Concentrado Soluble.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Oral: >5,000 mg/kg).

Patrón de Uso

Autorizado en Programas Inocuos o Certificados Orgánicos

Cultivo	Plaga	Dosis	Aplicaciones	Intervalo	Volumen
Ajo, Cebolla, Cebollín, Espárrago, Poro (0)	Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	0.75 - 1.25 L/100 L de agua	3	7 días	444 - 544 L/ha
Brócoli, Col, Col de Bruselas, Coliflor, Colinabo, Colza (0)	Pulgón cenizo (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	0.5 - 1.25 L/100 L de agua	3	7 días	395 - 495 L/ha
Calabaza, Calabacita, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (0)	Pulgón del algodónero (<i>Aphis gossypii</i>) Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1.0 - 1.5 L/100 L de agua	3	7 días	176 - 276 L/ha
Chile, Papa, Pimiento morrón, Jitomate, Tomate de cáscara (SL)	Pulgón saltador (<i>Bactericera cockerelli</i>)	1.0 - 2.0 L/100 L de agua	3	7 días	
Mango (0)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1.0 - 3.0 L/ha	3	7 días	578 - 600 L de agua/ha
Zarzamora, Arándano, Frambuesa, Grosella, Fresa, Vid, Kiwi (0)	Trips (<i>Scirtothrips dorsalis</i>)	3.0 - 6.0 mL/L de agua	3	7 días	600 - 700 L de agua/ha

Tiempo de reentrada: Esperar a que seque la aspersión (2 h).

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 0 días (Sin Límite).

Límite máximo de residuos: Exento.

Intervalo entre aplicaciones: 7 días.


Preparación del producto: Agite el producto antes de usarlo. Utilice agua limpia para realizar la aspersión. Utilice recipientes plásticos para realizar la mezcla. Mida la cantidad del producto a aplicar utilizando un recipiente graduado. Se deberá preparar la mezcla agregando la dosis recomendada del producto directamente en la mitad de agua requerida para su aplicación en el orden adecuado de adición a los otros insumos, agite y adicione la cantidad de agua restante. Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea.

Aplicación del producto: Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Procure que el producto tenga contacto con los insectos, que el tamaño de gota y presión de aspersión permitan la cobertura de los sitios donde se localiza la plaga. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del cultivo a asperjar.

Compatibilidad: Para las mezclas que se realicen con otros productos se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación. Compatible con Biodie® (argemonina, berberina, ricinina y α-terthienil), Prowet® Ovidie (diocetil sulfosuccinato de sodio), Progran® Mega (extracto de gobernadora), Aminofit® Xtra (aminoácidos), Coraza® 720 S (clorotalonil), Cu-Back® (gluconato de cobre), Agrimycu® 100 (estreptomicina + oxitetraciclina), Progran® Nimicid 80 (extracto de aceite de neem), Ultralux® S (sales potásicas de ácidos grasos), Progran® Cinnacar (extracto de canela).


Contraindicaciones: Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando se prevea lluvia durante y dentro de 2 h posteriores a su aplicación, en contra del viento y cuando éste favorezca la deriva.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO₃).
- Acondicione el agua para un pH de 6 a 7.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Alternativa para prevenir o retrasar el riesgo de resistencia.
- No comparte un punto de acción común con otros compuestos y puede ser aplicado libremente.
- Efectivo para realizar secuencias, alternancias o mezclas con insecticidas de diferentes modos de acción.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de fina (F) a mediana (M).
- Tamaño de gota fina a mediana, de 136 µm a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en los sitios donde se localiza la plaga.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquímica.com

Elaboración:
Actualización:
Versión:
Página:

28-Oct-2020.
09-Sep-2025.
03.
1 de 1.