



Mejorador de Suelo Orgánico

Quitina, Nutrientes y Materia Orgánica



FICHA TÉCNICA - Nutrición Vegetal

Uso: Nutriente vegetal.

Composición: Quitina 26.5%, Materia orgánica 35.90%, Nitrógeno total 3.40%, Fósforo (P_2O_5) 10.00%, Potasio (K_2O) 0.21%, Calcio (Ca) 16.00%, Magnesio (Mg) 0.70%, Azufre (S) 0.90% y Hierro (Fe) 584.9217 ppm.

Formulación: Polvo.

La Quitina es un polisacárido natural, no tóxico y biodegradable, fuente de carbono orgánico oxidable, que promueve la diversidad y el crecimiento de microorganismos benéficos, mejora la disposición de nutrientes y las propiedades físico-químicas del suelo. Su estructura porosa favorece la absorción y liberación equilibrada de agua, incrementa la población de microorganismos quitinolíticos de patógenos y favorece la micorrización o simbiosis radicular. La quitina incrementa la actividad enzimática y metabólica de las plantas, con activación de los mecanismos de Resistencia Sistémica Inducida (Fitoalexinas, Proteínas, Inhibidores proteicos, Ligninas) frente a patógenos y condición de estrés. En su descomposición libera amonio y derivados que inhiben el crecimiento de nemátodos.

Patrón de Uso

NUTRIPRO-BIO® Quitina es un mejorador de suelo orgánico obtenido a través de un proceso biotecnológico orgánico, que aporta quitina, nutrientes asimilables (N, P, K, Ca, Mg, S, Fe) y materia orgánica. Se aplica al suelo inyectado a través del sistema de fertirriego completamente presurizado, y una vez agotado, se continúa la inyección de agua durante 10 a 20 min para limpiar el sistema. Aplique el producto para:

- Favorecer el crecimiento de microorganismos benéficos, modificar las condiciones del suelo, mejorar la disponibilidad y absorción de nutrientes.
- Disminuir la densidad aparente del suelo, favorecer la porosidad, conductividad hidráulica (permeabilidad) y movimiento del aire, con efecto en el crecimiento y desarrollo de las raíces.
- Favorecer la capacidad de campo, la humedad en el suelo y su disponibilidad para las plantas.
- Influir en el tamaño de la raíz (longitud) y del tallo (grosor), producción de hojas, flores y frutos, con efecto en el tamaño y peso de los frutos (rendimiento).

Cultivo

Agave	Cacao	Espárrago	Lilis	Nochebuena	Rábano
Aguacate	Cafeto	Frambueso	Lima	Nogal	Rosa
Ajo	Calabacita	Fresa	Limonero	Olivo	Sandía
Almendras	Calabaza	Gerbera	Macadamia	Orégano	Stevia
Amaranto	Cebolla	Gladiola	Mamey	Orquídea	Tomate
Apio	Chile	Granada	Mandarina	Papa	Tomate de
Arándano	Clavel	Guanábana	Mango	Papayo	cáscara
Avellana	Col	Guayaba	Manzanilla	Pepino	Toronja
Banano	Coliflor	Higuera	Manzano	Peral	Tulipán
Berenjena	Dalia	Kale	Melón	Piña	Vid
Betabel	Dátil	Lechuga	Menta	Pistachero	Zanahoria
Brócoli	Ejote	Lichi	Naranja	Pitahaya	Zarzamora

Dosis por aplicación

Época de aplicación

1.0 - 2.0 Kg/ha

Se recomienda realizar 3 aplicaciones: la primera en el desarrollo vegetativo a los 7 días después del trasplante o 15 días después de la siembra; segunda y tercera aplicación, en brotación y desarrollo reproductivo, con intervalos de 15 días.

En cultivos establecidos, realizar la primera aplicación al inicio de la brotación.


Intervalo entre aplicaciones: 7 a 15 días.

Método para preparar el producto: realizar la premezcla de la dosis a utilizar del producto en al menos 20 L de agua, agitar vigorosamente hasta obtener una mezcla homogénea. Posteriormente, en el tanque de mezclado con al menos 200 L de agua, incorporar la premezcla y mantener la agitación constante durante todo el proceso de aplicación.

Compatibilidad: nutrientes vegetales y plaguicidas.


Contraindicaciones: ninguna.

Acondicionamiento del Agua




■ Se puede aplicar en cualquier tipo de suelo y pH ligeramente ácido. El **NUTRIPRO-BIO® Quitina** tiene un pH con valor neutro.

Orden de Mezcla en Tanque



- Realice la mezcla al momento de la aplicación y aplique el mismo día de su preparación.
- Agitar vigorosamente y mantener la agitación durante todo el proceso de aplicación.

Quitina con Tecnología MAMP




- Quitina fragmentada en oligómeros de 6 a 8 unidades de longitud específica (Señal Activa), activada y biodisponible, que son reconocidos y se acoplan con los receptores CEBIP (Chitin Elicitor-Binding Protein) en las células de la raíz para activar la Resistencia Sistémica Inducida (RSI) en la planta.
- Los receptores CEBIP son componentes fundamentales del sistema inmunológico innato, especializado en la detección de hongos patógenos (Quitina) y diferenciar microorganismos benéficos (Oligosacáridos de lipquitina) mediante el reconocimiento de quitina en la rizósfera.

Momento de Aplicación



- Aplique 2 a 4 semanas antes de la siembra o mezclado con sustratos para germinación, en tratamiento a la semilla, inoculación, inmersión, drench y riego localizado.

Método de Aplicación



- En sistemas de riego localizado, se recomienda utilizar filtros, goteros y aspersores con tamaño de malla ≤200 (≥74 µm).
- Utilice boquillas de cono lleno para un espectro de gotas de gruesa (G) a muy gruesa (MG), con tamaño de gota de 349 a 428 µm (DVM) para aspersión.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimica.com

Elaboración: 05-Feb-2026.
Actualización: 05-Feb-2026.
Versión: 01.
Página: 1 de 1.