



Bioestimulante

Regulador de Crecimiento

Actúa en la diferenciación, embriogénesis y actividad fotosintética.



FICHA TÉCNICA - Nutrición Vegetal

Uso: Nutriente Vegetal.
Composición: Brasinolida, 0.01% p/p (100 ppm).
Formulación: Líquido soluble.

La brasinolida es una hormona esterooidal natural esencial para las plantas, con transporte acropétalo, que actúa en el crecimiento vegetal, diferenciación (estomatal, vascular, reproductivo) y embriogénesis (división y elongación celular, regeneración de la pared celular, formación del tubo polínico), germinación, elongación de raíz, actividad fotosintética, inmunidad y modulación del estrés. Actúa a concentraciones 100 veces menor que otros reguladores de crecimiento vegetal.

Patrón de Uso

Aplicarlo para estimular la germinación y promover el crecimiento de raíces en plántulas y plantas establecidas. En aplicación foliar provoca la asimilación, transporte y distribución de los nutrientes hacia los tejidos de la planta estimulando su crecimiento vegetativo, floración, amarre, peso y calidad de los frutos, especialmente el calibre y la firmeza. Prolonga la vida de anaquel de las partes de consumo cuando es aplicado poco antes de la cosecha.

Cultivo	Dosis	Época de Aplicación
Agave	Inmersión: 11.0 mL/L de agua Foliar: 1.0 - 2.0 mL/L de agua In drench: 1.0 - 2.0 mL/L de agua	Realizar 3 aplicaciones a intervalo de 30 días entre cada aplicación; la primera en inmersión de la raíz (hijuelos), previo al trasplante, las 2 aplicaciones posteriores con intervalos de 30 días entre cada aplicación vía foliar e "in drench" durante su desarrollo vegetativo para mejorar el peso y longitud de raíz, número de hojas, peso y altura de planta.
Agave	1.0 - 2.0 mL/L de agua	Realizar 6 aplicaciones vía foliar durante el desarrollo vegetativo del cultivo con intervalos de 60 días entre cada aplicación. La primera aplicación un año antes de la jima, para mejorar grados Brix, peso, diámetro y longitud de la piña.
Aguacate	0.5 - 2.0 mL/L de agua	Realizar 2 aplicaciones vía foliar durante la floración; la primera en yema hinchada y la segunda en botones florales visibles, para mejorar el número de frutos, longitud, diámetro y peso de fruto y el rendimiento.
Albaricoque, Almendra, Chabacano, Ciruelo, Durazno, Manzano, Membrillo, Peral, Tejocote	1.5 - 2 mL/L de agua	Realice las aplicaciones vía foliar y por fertirriego en la etapa vegetativa, floración, cuajado de frutos y fructificación.
Arándano, Cerezo, Frambuesa, Fresa, Grosella, Mora, Zarzamora	1.5 - 2 mL/L de agua	Realice las aplicaciones vía foliar y por fertirriego en la etapa vegetativa, floración, cuajado de frutos y fructificación.
Berenjena, Chile, Chile Bell, Jitomate, Papa, Tabaco, Tomate de cáscara	1.5 - 2.0 mL/L de agua	Realice las aplicaciones vía foliar y por fertirriego, en tratamiento de semilla, en la etapa de emergencia, al trasplante, floración, amare y cuajado de fruto.
Limón, Limón persa, Lima, Naranja, Toronjo, Tangerino, Mandarino, Cidra	0.5 - 2.0 mL/L de agua	Realizar 5 aplicaciones vía foliar iniciando en la floración, con intervalos de 21 días entre cada aplicación. Para mejorar número de flores y frutos por rama, diámetro, tamaño y peso de fruto, porcentaje de ácido cítrico, contenido de ácido ascórbico y sólidos solubles en fruto.
Mango	0.5 - 2.0 mL/L de agua	Realizar 3 aplicaciones vía foliar durante el desarrollo del órgano floral en estado uno, con intervalos de 15 días entre cada aplicación, para mejorar el número de frutos por inflorescencia y totales, longitud, diámetro y peso del fruto y el rendimiento.
Papaya	0.5 - 2.0 mL/L de agua	Realizar 4 aplicaciones vía foliar, la primera al momento de la aparición del botón floral y las 3 siguientes a intervalos de 30 días entre cada aplicación, para mejorar el número de botones emitidos por planta, frutos amarrados, diámetro, longitud y peso de fruto, grosor del mesocarpio del fruto, firmeza de la pulpa, grados Brix y rendimiento.
Rosa	1.5 - 2 mL/L de agua	Realice las aplicaciones vía foliar y por fertirriego en la etapa vegetativa y floración.
Vid	0.5 - 2.0 mL/L de agua	Realizar 4 aplicaciones vía foliar durante el cuajado y desarrollo del fruto, con intervalos de 21 días entre cada aplicación, para mejorar las bayas por racimo, diámetro de bayas, peso de racimo, grados Brix y rendimiento.

Intervalo entre aplicaciones: 15, 21, 30 y 60 días.


Método para preparar el producto: Agite el producto antes de usarlo. Acondicione el agua a un pH de 5 a 7 para una mejor acción del producto. Utilice recipientes plásticos para realizar la mezcla. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua siempre en el orden adecuado de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla. Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la planta a asperjar y equipo aspersor utilizado.

Compatibilidad: Es compatible con productos de reacción ácida a neutra, no lo mezcle con soluciones alcalinas. Se recomienda hacer una prueba física cuando se desee mezclar con otros insumos.

Contraindicaciones: Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo o amenace lluvia y cuando el viento favorezca la deriva.


No. Registro: RSCO-092/VI/19

Acondicionamiento del Agua




- Corregir la dureza para obtener agua blanda (°d= 0 a 8; de 0 a 142.5 ppm de CaCO₃ + MgCO₃).
- Acondicionar el agua para un pH entre 5 a 7.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Momento de Aplicación



- Tiene sinergismo aditivo con auxinas y giberelinas.
- No aplique subdosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- No causa deformaciones en las plantas, sin restricciones para su aplicación constante y consecutiva.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono lleno para un espectro de gotas de gruesa (G) a muy gruesa (MG), con tamaño de gota de 218 a 349 µm (DVM) para aplicaciones foliares, y de 349 a 428 µm (DVM) para aplicaciones al suelo.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquímica.com

Elaboración:
Actualización:
Versión:
Página:

17-Jun-2019.
31-Marzo-2026.
03.
1 de 1.