



Bioestimulante

Regulador de Crecimiento

Inductor de división, elongación y diferenciación celular en raíz, brotes, flor y frutos.



FICHA TÉCNICA - Nutrición Vegetal

No. Registro: RSCO-166/IX/19

Uso: Nutriente Vegetal.

Composición: Auxinas 50.048 ppm, Citocininas 99.875 ppm, Giberelinas 121.041 ppm, Nitrógeno 0.49%, Fósforo (P_2O_5) 0.21%, Potasio (K_2O) 0.401%, Hierro 0.508%, Boro 0.301%, Manganeseo 0.210%, Zinc 1.032%, Calcio 1.011%, Magnesio 0.251%, Azufre 0.752%, en peso.

Formulación: Líquido soluble.

Las auxinas son fitohormonas que intervienen en los procesos de división, elongación y diferenciación celular en raíces, tallos y hoja; inducen la elongación vegetal y la producción de raíces adventicias. Las giberelinas son fitohormonas involucradas en el desarrollo de tejidos, elongación de raíces, hojas jóvenes y floración, entre otros procesos vegetales. Las citoquininas estimulan e inducen la división celular, la producción y elongación de raíces, y la generación brotes vegetales. Los nutrientes son esenciales en el metabolismo vegetal, son constituyentes o activadores de enzimas que catalizan procesos biológicos imprescindibles para la planta.

Patrón de Uso

Regulador de crecimiento que contiene auxinas, citocininas, giberelinas, enriquecido con macronutrientes (N, P y K) y micronutrientes, elementos que intervienen en los procesos de formación de tejidos y órganos que determinan el crecimiento y desarrollo normal de las plantas. Aplíquelo para estimular el rendimiento en el cultivo (número de frutos por racimo, longitud, diámetro y peso de frutos), la firmeza, el contenido de sólidos solubles y la concentración nutrimental del fruto.

Cultivo	Dosis	Época de Aplicación
Agave	5.0 - 10.0 mL/L de agua	Aplicación foliar después del segundo mes posterior al trasplante con un intervalo de 60 días entre cada aplicación. Volumen de agua de 200 L/ha.
Fam. Rutacea: Limón Mexicano, Limón Persa, Naranja, Lima, Tangerino, Mandarino, Toronjo, Pomelo	1 - 2 L/ha	Aplicación foliar desde el inicio de la floración con intervalo de 30 días hasta la producción.
Mango	1 - 2 L/ha	Aplicación foliar desde el inicio de la floración con intervalo de 30 días hasta la producción.
Manzano, Peral, Membrillo	0.5 - 2.0 mL/L de agua	Realizar 5 aplicaciones vía foliar, durante la floración y desarrollo de fruto con intervalos de 21 días entre cada aplicación, para mejorar número de frutos, peso, longitud y diámetro de fruto, grados Brix, firmeza, acidez y color de fruto.


Intervalo entre aplicaciones: 21, 30 y 60 días.

Método para preparar el producto: Agite el producto antes de usarlo. Acondicione el agua a un pH de 5.5 a 7 para una mejor acción del producto. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua siempre en el orden adecuado de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla. Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del cultivo a asperjar y forma de aplicación.

Compatibilidad: Es compatible con productos de reacción ácida a neutra, no lo mezcle con soluciones alcalinas. Se recomienda hacer una prueba física cuando se desee mezclar con otros insumos.


Contraindicaciones: Evite aplicar en horas de sol intenso y cuando el viento favorezca la deriva.

Acondicionamiento del Agua




- Corregir la dureza para obtener agua blanda ($^{\circ}d = 0$ a 8; de 0 a 142.5 ppm de $CaCO_3 + MgCO_3$).
- Acondicionar el agua para un pH entre 5.5 a 7.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Momento de Aplicación



- No aplique subdosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Aplicación radicular al trasplante y post-trasplante.
- Aplicación foliar durante la brotación, floración y fructificación.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono lleno para un espectro de gotas de gruesa (G) a muy gruesa (MG), con tamaño de gota de 218 a 349 µm (DVM) para aplicaciones foliares, y de 349 a 428 µm (DVM) para aplicaciones al suelo.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquímica.com

Elaboración:
Actualización:
Versión:
Página:

16-Oct-2019.
31-Mar-2026.
04.
1 de 1.