



Coadyuvante

Produce Repelencia y Aversión a la Alimentación
Contacto e Inhalación



FICHA TÉCNICA - Protección Vegetal

Exento de registro COFEPRIS como Plaguicida

Clasificación: Misceláneo.
Ingrediente Activo: Carbometoxianilina + Mezcla de Poliéter polisiloxano modificado.
Composición: No menos de 100.00%.
Formulación: Solución Oleosa.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Oral: >5,000 mg/kg).

Patrón de Uso

Es un producto de origen natural, formulado en solución oleosa de liberación sostenida, con efecto irritante sensorial, pero no letal para aves. Es un producto amigable con el ambiente, seguro para los usuarios y animales domésticos.

Modo de acción: A través del aroma estimula e irrita las membranas mucosas y quimiorreceptores (nervio trigémino: olfativo y gustativo), produciendo repelencia y aversión a la alimentación.

Dosis de aplicación: 1 a 2 L/ha.

Tiempo de reentrada: 4 h portando el equipo de protección personal, y 12 h sin protección personal.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 0 días (Sin Límite).

Límite máximo de residuos: Exento. Su ingrediente activo está Generalmente Reconocido como Seguro (GRAS) por la FDA.

Intervalo entre aplicaciones: Realice de 2 a 3 aplicaciones continuas, y aplicaciones de mantenimiento cada 7 a 14 días.

Preparación del producto: Agite el producto antes de usarlo. Agite el producto con movimientos verticales antes de usarlo. Es un producto listo para diluirse en agua. No lo mezcle con aguas de elevada dureza y acondiciónela a un pH de 7.0. Utilice recipientes plásticos para realizar la mezcla. Antes de mezclar con agua, agite el producto para lograr una suspensión uniforme. Vierta la mitad del agua a utilizar en un contenedor, agregue la dosis total del producto y posteriormente el agua restante. Agite para lograr una mezcla homogénea. Cada ocasión que recargue el aspersor, deberá agitar la mezcla del contenedor.


Aplicación del producto: Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Aplicación foliar por aspersión directa o en mezcla diluido en agua, para identificar con su aroma las zonas donde se haya sembrado cualquier cultivo y se desee evitar daños por aves durante la germinación, etapa de plántula y durante la madurez de los productos de consumo. Utilice aspersores motorizados o manuales, con presión suficiente para lograr un buen cubrimiento de las superficies deseadas.

Compatibilidad: Para las mezclas que se realicen con otros productos, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad en tanque previa a su aplicación. Evite su mezcla en tanque con productos alcalinos y oxidantes fuertes.

Contraindicaciones: No lo exponga directamente a los rayos solares. Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva. Evite aplicar sobre fuentes de agua.




Orden de Mezcla del Producto




- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de fina (F) a mediana (M).
- Tamaño de gota fina a mediana, de 136 µm. a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en los tejidos donde se localiza la plaga.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimia.com

Elaboración:
Actualización:
Versión:
Página:

10-Mar-2022.
20-Oct-2022.
02.
1 de 1.