

Fungicida

Biológico con Múltiples Modos de Acción, Función e Integridad de la Membrana Celular, Inductor de Defensas en la planta

Contacto – Preventivo con efectos antagonísticos hacia fitopatógenos



FICHA TÉCNICA – Protección Vegetal

Clasificación: Plaguicida Microbiano.
Ingrediente Activo: *Bacillus subtilis*.
Formulación: Suspensión Concentrada.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Oral: >5,000 mg/kg).

Patrón de Uso

Autorizado en Programas Inocuos o Certificados Orgánicos


Bacillus subtilis, es una bacteria en forma de bacilo, Gram-positiva, aerobia estricta o anaerobia facultativa. Una característica muy importante es su capacidad para formar endosporas, las cuales son una estructura de resistencia que les permite sobrevivir a condiciones de estrés y que le permite permanecer viable durante largos periodos de tiempo aún bajo condiciones adversas, pero cuando las condiciones de su medio se tornan favorables, la endospora desarrolla la forma vegetativa. *B. subtilis* tiene la capacidad de formar una matriz polimérica que pueden presentarse en forma de películas o conglomerados en medios líquidos. Esta matriz no afecta sus características como agente de control biológico.

La resistencia de una endospora se puede explicar en parte por su estructura celular particular. La capa proteica externa que rodea la espora proporciona mucha de la resistencia química y enzimática. Debajo de la capa reside una capa muy gruesa de peptidoglicano especializada llamada la corteza. La formación apropiada de la corteza es necesaria para la deshidratación de la base de la espora, que ayuda en resistencia contra temperaturas altas.

El Producto **PROBAC**, está metabólicamente activo, por lo que puede presentar cambios en su apariencia que no afecta su efectividad biológica.


Se recomienda agitar el producto antes de su uso.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO_3).
- Acondicione el agua para un pH de 5 a 8.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- Alternativa para manejar la resistencia, al prevenir o retrasar su desarrollo.
- Brinda niveles adicionales y espectro de control de enfermedades, aportando eficiencia con los fungicidas de sitios de acción específicos (p.e. Estrobilurinas).
- Efectivo para realizar secuencias, alternancias o mezclas con fungicidas de modo de acción monositio, en programas de manejo de enfermedades.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cona.
- Tamaño de gota fina a media, de 136 µm. a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Aplicación en la zona radicular, con suelo húmedo, en la siembra, emergencia, después del trasplante, y desarrollo.