



Insecticida

Modo de Acción Desconocido o Incierto
Contacto, Ingestión e Inhalación



FICHA TÉCNICA - Protección Vegetal

RSCO-INAC-0104Z-301-375-094

Clasificación: Plaguicida Botánico.
Ingrediente Activo: Extracto de ajo (*Allium sativum*).
Composición: 94.00% en peso, equivalente a 956.92 g i.a./L.
Formulación: Concentrado Soluble.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Oral: >5,000 mg/kg).

Patrón de Uso

Autorizado en Programas Inocuos o Certificados Orgánicos

Cultivo	Plaga	Dosis	Aplicaciones	Intervalo	Volumen
Berenjena, Chile, Chile habanero, Chile Jalapeño, Jitomate, Papa, Pimiento, Tabaco, Tomate de cáscara (SL)	Adultos de Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1.5 - 2.0 L/ha	3	7 días	
Calabaza, Calabacita, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (SL)	Pulgón (<i>Aphis gossypii</i>)	1.0 - 2.0 L/ha	3	7 días	454 - 625 L/ha

Tiempo de reentrada: Esperar a que seque el rocío de la aplicación (4 h).

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 0 días (Sin Límite).

Límite máximo de residuos: Exento.

Intervalo entre aplicaciones: 7 días.


Preparación del producto: Agite el producto antes de usarlo. Acondicione el pH del agua en el rango de 6.5 a 7.5. Utilice recipientes plásticos para preparar el producto. Vierta la cantidad debidamente medida del producto directamente con la suficiente cantidad de agua siempre en el orden adecuado de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla. Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del cultivo a asperjar.

Aplicación del producto: Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Realice las aplicaciones al observar las primeras infestaciones. Procure que el producto tenga contacto con los insectos, que el tamaño de gota y presión de aspersión permitan la cobertura de sitios donde se localiza la plaga. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas y cuando el follaje sea denso.

Compatibilidad: Compatible con sustancias oxidantes y con sustancias reductoras, incompatible con sustancias alcalinas. Para las mezclas que se realicen con otros productos se recomienda utilizar los que cuenten con registro autorizado y vigente para el cultivo indicado en su etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.


Contraindicaciones: No aplicar en plantas estresadas por riegos inadecuados, y temperaturas extremas. Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO_3).
- Acondicione el agua para un pH de 6.5 a 7.5.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- Alternativa para prevenir o retrasar el riesgo de resistencia.
- No comparte un punto de acción común con otros compuestos y puede ser aplicado libremente.
- Efectivo para realizar secuencias, alternancias o mezclas con insecticidas de diferentes modos de acción.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono.
- Tamaño de gota fina a media, de 136 µm a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en los sitios donde se localiza la plaga.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimia.com

Elaboración:
Actualización:
Versión:
Página:

07-Abr-2010.
04-May-2026.
06.
1 de 1.