



Insecticida

Disruptor Mecánico no Específico
Contacto



FICHA TÉCNICA - Protección Vegetal

RSCO-INAC-0103Q-0488-009-95.0

Clasificación: Plaguicida Misceláneo.
Ingrediente Activo: Aceite vegetal de maíz.
Composición: 95.00% en peso, equivalente a 886.065 g i.a./L.
Formulación: Aceite Emulsionable.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Oral: >5,000 mg/kg).

Patrón de Uso

Cultivos	Plagas	Dosis	Aplicaciones	Intervalo	Volumen
Aguacatero (SL)	Araña roja (<i>Oligonychus punicae</i>)	5.0 - 8.0 L/ha	3	7 días	1500 - 2000 L/ha
Lima, Limonero, Mandarina, Naranja, Pomelo, Tangerina, Toronjo (SL)	Ninfas del Psílido asiático de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	1.0 - 1.5 L/100 L de agua	1		
Nopal (SL)	Cochinilla (<i>Dactylopius indicus</i>)	1.0 - 3.0 L/200 L de agua	2	7 días	
Papayo (SL)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.0 - 2.0 L/200 L de agua	2	7 días	

Tiempo de reentrada: Esperar a que seque la aspersión.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 0 días (Sin Límite).

Límite máximo de residuos: Exento.

Intervalo entre aplicaciones: 7 días.


Preparación del producto: Agite el producto antes de usarlo. No lo mezcle con aguas de elevada dureza y acondicione a un pH de 5.5 a 6.5 para una mejor acción del producto. Utilice recipientes plásticos para preparar el producto. Vierta la cantidad debidamente medida del producto directamente con la suficiente cantidad de agua siempre en el orden adecuado de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla. Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea.

Aplicación del producto: Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. Tiene acción sinérgica, al contacto reduce el consumo de oxígeno en insectos a través del bloqueo u obstrucción de los espiráculos, impidiendo el proceso respiratorio de huevecillos, larvas y adultos. Realice las aspersiones cuando se observen oviposiciones próximas a la eclosión, procure que el producto tenga contacto con los insectos inmaduros o adultos presentes; asimismo, que el tamaño de gota y presión de aspersión permitan la cobertura de sitios donde se localizan las plagas. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas. Aplique durante la mañana o atardecer para que la mezcla seque lentamente para mayor efectividad. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del cultivo a asperjar. Agite la mezcla cada vez que recargue el aspersor para asegurar una mezcla homogénea.

Compatibilidad: Compatible con Promyl (Benomilo), Ionic (Imidacloprid), Aminofit Xtra (Aminoácidos), Agrimycu 500 (Etreptomycin, Oxitetraciclina y Cobre). No lo mezcle con productos cuya compatibilidad no está completamente comprobada.


Contraindicaciones: Evite aplicar cuando esté lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva. No aplicar en condiciones de estrés hídrico o por enfermedad y temperaturas extremas. No aplique azufre dentro de los 10 días posteriores a la aplicación del producto, y no aplicar antes de 14 días después de la aplicación de azufre. No use anilazina, clorotalonil, dicloram, dicofol, dinocap y permetrina antes de las dos semanas de aplicado el producto. No aplicar captan o folpan dentro de 7 a 10 días antes o después de una aplicación del producto.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO_3).
- Acondicione el agua para un pH de 5.5 a 6.5.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Alternativa para prevenir o retrasar el riesgo de resistencia.
- No comparta un punto de acción común con otros compuestos y puede ser aplicado libremente.
- Efectivo para realizar secuencias, alternancias o mezclas con insecticidas de diferentes modos de acción.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de fina (F) a mediana (M).
- Tamaño de gota de 136 µm a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en los sitios donde se localiza la plaga.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquímica.com

Elaboración:
Actualización:
Versión:
Página:

16-May-2012.
12-Oct-2022.
05.
1 de 1.