



Fungicida y Bactericida

Disrupción de Membrana Celular

Contacto - Preventivo



FICHA TÉCNICA - Protección Vegetal

RSCO-FUNG-306T-X0046-375-006

Clasificación: Plaguicida Botánico.
Ingrediente Activo: Extracto de semilla de toronja (*Citrus x paradisi*).
Composición: 6.00% en peso, equivalente a 60.00 g i.a./L.
Formulación: Concentrado Soluble.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Oral: >5,000 mg/kg).

Patrón de Uso

Autorizado en Programas Inocuos o Certificados Orgánicos

Cultivos	Plagas	Dosis	Aplicaciones	Intervalo	Volumen
Albahaca, Estragón, Hierbabuena, Manzanilla, Menta, Orégano, Romero, Salvia, Tomillo (SL)	Mancha foliar (<i>Cercospora</i> sp.)	1.0 - 2.0 L/200 L de agua	2	7 días	
Berenjena, Chile, Chile bell pepper, Chile habanero, Chile manzano, Chile Tabasco, Pimiento morrón, Papa, Tabaco, Tomate, Tomate de cáscara (SL)	Mancha Bacteriana (<i>Xanthomonas campestris</i> p.v. <i>vesicatoria</i>)	1.0 - 3.0 L/ha	3	7 días	400 - 500 L/ha
Calabaza, Calabacita, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (SL)	Mancha angular (<i>Pseudomonas syringae</i> p.v. <i>lachrymans</i>)	2.0 - 3.0 L/ha	2	7 días	950 - 1050 L/ha
Ajo, Cebolla, Cebollín, Espárrago (SL)	Mancha bacteriana de la hoja (<i>Pseudomonas viridiflava</i>)	2.0 - 3.0 L/ha	2	7 días	340 - 440 L/ha

Tiempo de reentrada: Esperar a que seque el rocío de la aplicación (4 h).

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 0 días (Sin Límite).

Límite máximo de residuos: Exento.

Intervalo entre aplicaciones: 7 días.


Preparación del producto: Agite el producto antes de usarlo. Utilice agua limpia y acondicione a un pH entre 5 a 6.5. Para obtener una mayor calidad en la aplicación es recomendable adicionar a la mezcla un surfactante-penetrante. Utilice recipientes plásticos para realizar la mezcla. Vierta la dosis del producto directamente con la suficiente cantidad de agua siempre en el orden adecuado de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla. Mantenga la agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea.

Aplicación del producto: Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. En caso de infecciones severas, no aumentar la dosis, sino la frecuencia entre las aplicaciones. Se recomienda realizar las aplicaciones en forma preventiva, dentro de un programa de manejo de enfermedades, cuya frecuencia y número de aplicaciones dependerá del tipo de cultivo, presión de la enfermedad y condiciones climáticas. Asegúrese que la aplicación sea a punto de goteo, tratando de obtener una buena cobertura del follaje, tallo, o la base de la planta, según sea el caso. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del cultivo a asperjar.

Compatibilidad: Compatible con oxitetraciclina, aminoácidos, extracto de gobernadora (*Larrea tridentata*), argemonina, berberina, ricinina y a-terthienil. No lo mezcle con productos azufrados, cúpricos, hidróxido de calcio o productos alcalinos que modifiquen el rango de pH fuera del rango indicado. Para las mezclas que se realicen con otros productos se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.


Contraindicaciones: Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO_3).
- Acondicione el agua para un pH de 5 a 6.5.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Alternativa para manejar la resistencia, al prevenir o retrasar su desarrollo.
- Brinda niveles adicionales y espectro de control de enfermedades, aportando eficiencia con los fungicidas de sitios de acción específicos.
- Efectivo para realizar secuencias, alternancias o mezclas con fungicidas de modo de acción monosito.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de fina (F) a mediana (M).
- Tamaño de gota fina a media, de 136 µm a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en los sitios donde se localiza la plaga.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimica.com

Elaboración: 12-Sep-2012.
 Actualización: 12-Ago-2022.
 Versión: 05.
 Página: 1 de 1.