



Sinérgico y Adherente de plaguicidas

Acción por contacto, deshidratación y asfixia.

Aplicación foliar.



FICHA TÉCNICA – Coadyuvantes

No aplica registro ante la COFEPRIS

Clasificación: Coadyuvante.
Ingrediente Activo: Mezcla de aceites vegetales de soja (*Glycine max*), nim (*Azadirachta indica*) y casia (*Cassia sp.*).
Composición: No menos de 100.00% p/p.
Formulación: Concentrado Emulsionable (EC).
Uso Autorizado: Agrícola.

Patrón de Uso

Autorizado en Programas Inocuos o Certificados Orgánicos

Progranic Delphinus® es un coadyuvante de origen vegetal que mejora la retención e impide la remoción de los ingredientes activos de las superficies de las hojas provocada por la lluvia o el viento. Los aceites vegetales de soja, nim y casia, tienen efecto sinérgico en mezcla con plaguicidas; su acción por contacto causa deshidratación en insectos y ácaros de cuerpos blandos, y asfixia por obstrucción de estructuras respiratorias. La película de aceite persiste sobre las superficies tratadas el tiempo suficiente para ejercer su acción sin afectar los procesos fisiológicos de las plantas. Puede aplicarse solo o combinado con insumos fitosanitarios.

Dosis recomendada:

- Hortalizas: 0.5 a 2.0 L/100 L de agua.
- Ornamentales: 0.25 a 1.0 L/100 L de agua.
- Frutales: 0.5 a 3.0 L/100 L de agua.

Dosis para cultivos frutales:

- Aguacatero: 5.0 a 8.0 L/ha.
- Cítricos: 1.0 a 1.5 L/100 L de agua.
- Manzano: 0.25 a 2 L/100 L de agua.
- Papaya: 0.5 a 1.0 L/100 L de agua.
- Plátano: 12.0 L/ha; en aplicación aérea usar de 3.5 a 5.0 L/ha.

Tiempo de reentrada: Esperar a que seque la aspersión.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 0 días (Sin Límite). Cuando lo aplique en cultivos frutales sin ser mezclado con insumos fitosanitarios, deberá esperar a que desaparezca la película aceitosa previo a realizar la cosecha.

Intervalo entre aplicaciones: Acote las restricciones para el producto con el que se mezcle.


Preparación del producto: Agite el producto antes de usarlo. No lo mezcle con aguas de elevada dureza y acondicione a un pH de 5.5 a 6.5. Vierta la cantidad del producto directamente con la suficiente cantidad de agua en el orden adecuado de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla.

Aplicación del producto: Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Realice la aspersión durante la mañana o al atardecer para que la mezcla seque lentamente y favorezca su efectividad. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del cultivo a asperjar. Es recomendable mantener la agitación cada vez que recargue el aspersor para asegurar una mezcla homogénea.

Compatibilidad: Realice una prueba de compatibilidad previa a la aplicación cuando lo desee mezclar con azufre, cobres, captán, carbaril, dimetoato, endosulfan y folpan; no lo mezcle con productos cuya compatibilidad no está completamente comprobada.


Contraindicaciones: Evite aplicar cuando el viento favorezca la deriva, en condiciones de estrés hídrico y temperaturas extremas; evite aplicar en plantas recién trasplantadas, esquejes, plantas con puntos de crecimiento sensibles. No aplique azufre dentro de los 10 días posteriores a la aplicación del producto, y antes de 14 días después de la aplicación de azufre. No lo mezcle con sulfato de zinc.

Acondicionamiento del Agua




- Realice correcciones en la calidad del agua antes de realizar la mezcla en tanque.
- Corrija el pH y dureza del agua conforme a las indicaciones para los insumos incluidos en la solución de aspersión.

Orden de Mezcla del Producto



- Acote el orden de adición de insumos en la mezcla para evitar incompatibilidades físicas y químicas.
- Mantener la agitación al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa, y estrés hídrico.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- Aplique las dosis indicadas en el patrón de uso, solo o en mezcla con plaguicidas.
- Mejora la retención e impide la remoción de los ingredientes activos.
- Con efecto sinérgico en mezcla con plaguicidas.

Densidad de la Cobertura



- Seleccione el tipo de boquilla para una pulverización óptima (tamaño de gota), y reduzca pérdidas de aplicación (deriva, lavado).
- Asegure y confirme la cobertura de acuerdo con el tipo de producto aplicado (20 a 70 gotas/cm²).



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimia.com

Elaboración: 30-Oct-2024.
Actualización: 30-Oct-2024.
Versión: 01.
Página: 1 de 1.