



Insecticida y Acaricida

Modo de Acción Desconocido o Incierto
Contacto



FICHA TÉCNICA - Protección Vegetal

RSCO-INAC-1106-X0136-009-018

Clasificación: Plaguicida Botánico.
Ingrediente Activo: Extracto de alcaloides (*Argemone mexicana*).
Composición: 18.00% en peso, equivalente a 179.766 g i.a./L.
Formulación: Concentrado Emulsionable.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Oral: >5,000 mg/kg).

Patrón de Uso

Autorizado en Programas Inocuos o Certificados Orgánicos

Cultivo	Plaga	Dosis	Aplicaciones	Intervalo	Volumen
Aguacate (O)	Araña roja (<i>Oligonychus puniceae</i>)	1.0 - 3.0 L/ha	3	7 días	506 - 606 L/ha
Arándano, Frambuesa, Fresa, Grosella, Vid, Zarcamora (O)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.0 - 3.0 L/200 L de agua	3	7 días	571 - 671 L/ha
Berenjena, Chile, Jitomate, Papa, Pimiento, Tabaco, Tomate de cáscara (SL)	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1.5 - 2.0 L/ha	3	7 días	330 - 430 L/ha
Brócoli, Col, Coliflor, Col de Bruselas, Colinabo, Colza (O)	Pulgón de la col (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	0.5 - 1.5 L/100 L de agua	3	7 días	350 - 450 L/ha
Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (O)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1.0 - 2.0 L/ha	3	7 días	192 - 292 L/ha
Lima, Limón mexicano, Limón persa, Mandarino, Naranja, Pomelo, Tangerino, Toronjo (O)	Psílido asiático de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	1.0 - 2.0 L/ha	3	7 días	330 - 430 L/ha
Manzana, Membrillo, Peral (O)	Pulgón lanígero (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	1.0 - 2.0 L/200 L de agua	3	7 días	666 - 807 L/ha

Tiempo de reentrada: Esperar a que seque el rocío de la aplicación.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 0 días (Sin Límite).

Límite máximo de residuos: Exento.

Intervalo entre aplicaciones: 7 días.


Preparación del producto: Agite el producto antes de usarlo. Acondicione el pH del agua en el rango de 6 a 7. Utilice recipientes plásticos para preparar el producto. Vierta la cantidad debidamente medida del producto directamente con la suficiente cantidad de agua siempre en el orden adecuado de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del cultivo a asperjar. Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea.

Aplicación del producto: Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Se recomienda iniciar las aplicaciones al observar las primeras infestaciones de la plaga. Procure que el producto tenga contacto con los insectos inmaduros o adultos presentes; asimismo, que el tamaño de gota y presión de aspersión permitan la cobertura de los sitios donde se localizan las plagas. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas y cuando el follaje sea denso.

Compatibilidad: No lo mezcle con productos cuya compatibilidad no está completamente comprobada. Compatible con Coraza® 720 (Clorotalonil), Aminofit® Xtra (Aminoácidos), Agrimycu® 50 (Estreptomycin, Oxitetraciclina y Cobre), Anibac® Plus (Sales cuaternarias de amonio + sulfato de cobre pentahidratado).


Contraindicaciones: Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté o amenace lluvia y cuando el viento favorezca la deriva.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO_3).
- Acondicione el agua para un pH de 6 a 7.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- Alternativa para prevenir o retrasar el riesgo de resistencia.
- No comparte un punto de acción común con otros compuestos y puede ser aplicado libremente.
- Efectivo para realizar secuencias, alternancias o mezclas con insecticidas de diferentes modos de acción.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de fina (F) a mediana (M).
- Tamaño de gota fina a media, de 136 µm a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en el envás.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquímica.com

Elaboración:
Actualización:
Versión:
Página:

11-Abr-2017.
03-Mar-2025.
05.
1 de 1.