



Uso en Jardinería

Fungicida y Bactericida

Contacto, Ingestión e Inhalación



FICHA TÉCNICA - PROGRANIC Mega

RSCO-FUNG-0301M-0428-052-95

Clasificación: Plaguicida Botánico.
Ingrediente Activo: Extracto de gobernadora (*Larrea tridentata*).
Composición: 95.00% en peso, equivalente a 768.55 g i. a./L.
Formulación: Líquido Soluble.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Verde).

Patrón de Uso

Insumo para el control de plagas que dañan plantas en áreas verdes y campos de golf

Plaga	Nombre científico	Dosis
Hongos	<i>Acrosporium</i> sp. <i>Alternaria</i> spp. <i>Armillaria</i> spp. <i>Botrytis</i> spp. <i>Cercospora</i> spp. <i>Colletotrichum</i> spp. <i>Curvularia</i> spp. <i>Diplocarpon</i> sp. <i>Erysiphe</i> spp. <i>Oidium</i> spp. <i>Pestalotia</i> spp. <i>Pseudoperonospora</i> spp. <i>Rhizoctonia</i> sp.	5 a 15 ml/L de agua
Bacterias	<i>Agrobacterium</i> spp. <i>Erwinia</i> spp. <i>Pseudomonas</i> spp. <i>Xanthomonas</i> spp.	5 a 15 ml/L de agua

Tiempo de reentrada: Esperar a que seque el rocío de la aplicación.

Intervalo entre aplicaciones: 7 días.


Método para preparar el producto: Agite el producto antes de usarlo. Acondicione el pH del agua en el rango de 6 a 6.5. Utilice recipientes plásticos para realizar la mezcla. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua en el orden adecuado de adición de los insumos que contendrá la mezcla. Mantener la agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea.

Aplicación del producto: No use el producto de forma diferente a lo recomendado en su etiqueta. Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Realice las aplicaciones en forma preventiva, antes de observar los primeros síntomas de la presencia de la enfermedad y cuando las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo, asegúrese que el producto tenga contacto con los tejidos expuestos a la enfermedad. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas.

Compatibilidad: Compatible con peróxido de hidrógeno, zinc y con productos que no modifiquen el rango de pH indicado. Incompatible con hidróxido de sodio. Para las mezclas que se realicen con otros productos se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.


Contraindicaciones: Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo o amenace lluvia y cuando el viento favorezca la deriva.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO_3).
- Acondicione el agua para un pH de 6 a 6.5.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Alternativa para manejar la resistencia, al prevenir o retrasar su desarrollo.
- Brinda niveles adicionales y espectro de control de enfermedades, aportando eficiencia con los fungicidas de sitios de acción específicos.
- Efectivo para realizar secuencias, alternancias o mezclas con fungicidas de modo de acción monositio.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de fina (F) a mediana (M), de 136 µm a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en el tejido a proteger.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquímica.com

Elaboración: 24-Oct-2013.
 Actualización: 29-Mar-2023.
 Versión: 03.
 Página: 1 de 1.