



Sinergista de Ingredientes Activos

Protector de degradación, persistencia y lavado
Aplicación Foliar



FICHA TÉCNICA – Coadyuvantes

No aplica registro ante la COFEPRIS

Clasificación: Coadyuvante.
Ingrediente Activo: Mezcla de aceites vegetales y emulsificantes.
Composición: No menos de 100.0% p/p.
Formulación: Concentrado emulsionable (CE).
Uso Autorizado: Agrícola.

Patrón de Uso

Progran Oil Premium es un coadyuvante desarrollado a partir de aceites vegetales emulsificables. Sus aceites forman una película alrededor de ingredientes activos encapsulándolos y protegiéndolos de la degradación por efecto de factores adversos, prolongando su persistencia y acentuando su efectividad biológica. Mejora las características de humectación y adhesión de soluciones de aspersión, facilitando la cobertura en aplicaciones foliares. La película de aceite persiste sobre las superficies tratadas el tiempo suficiente para ejercer su acción sin afectar los procesos fisiológicos de las plantas.

Dosis de aplicación:

- Hortalizas: 0.7 a 2.5 L/100 L de agua.
- Frutales: 1.0 a 3.0 L/100 L de agua.
- Plátano: 12 L/ha; en aplicación aérea usar de 3.5 a 5.0 L/ha.
- Cítricos: 10 a 12 L/ha.

Tiempo de reentrada: espere a que seque el rocío de la aspersión.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 0 días (Sin Límite). En frutas esperar de 5 a 8 días para que desaparezca la película aceitosa.

Intervalo entre aplicaciones: acote las recomendaciones indicadas para el insumo con el que se mezcle.


Preparación del producto: agite el producto antes de usarlo. No lo mezcle con aguas de elevada dureza y acondicione el agua a un pH de 6.0 a 6.5 para una mejor acción del producto. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua siempre en el orden adecuado de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla. Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del cultivo a asperjar.

Aplicación del producto: no use el producto de forma diferente a lo recomendado en esta etiqueta. Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. Aplique durante la mañana o atardecer para que la mezcla seque lentamente para mayor efectividad. Puede aplicarse solo o combinado con insumos fitosanitarios, en sistemas de producción convencional, manejo integrado, sistema de producción agrícola sustentable y agricultura orgánica. Aplíquelo en tratamientos de otoño, invierno y verano sin acumulación ni riesgo de fitotoxicidad como ocurre con el uso de derivados parafínicos; realice las aplicaciones cada 15 a 30 días. No altera el color, olor, ni sabor de los productos de consumo cosechados.

Compatibilidad: es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación, especialmente con azufre, cobres, captan, carbaril, dimetoato, endosulfan y folpan. No mezclar con metidation para evitar manchado de fruta. No lo mezcle con sulfato de zinc.


Contraindicaciones: evite aplicar cuando esté lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva. No aplicar en condiciones de estrés hídrico o por enfermedad y temperaturas extremas. No aplique azufre dentro de los 10 días posteriores a la aplicación del producto, y no aplicar antes de 14 días después de la aplicación de azufre. No use anilazina, clorotalonil, dicloram, dicofof, dinocap y permetrina antes de las dos semanas de aplicado el producto. No aplicar captan o folpan dentro de 7 a 10 días antes o después de una aplicación del producto.

Acondicionamiento del Agua




- Realice correcciones en la calidad del agua antes de realizar la mezcla en tanque.
- Corrija el pH y dureza del agua conforme a las indicaciones para los insumos incluidos en la solución de aspersión.

Orden de Mezcla del Producto



- Acote el orden de adición de insumos en la mezcla para evitar incompatibilidades físicas y químicas.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- Aplique las dosis indicadas en el patrón de uso. Mezclar con insumos para encapsular los ingredientes activos.
- Proteja la degradación prolongando la persistencia y acentuando la efectividad biológica.

Densidad de la Cobertura



- Seleccione el tipo de boquilla para una pulverización óptima (tamaño de gota), y reduzca pérdidas de aplicación (deriva, lavado).
- Asegure y confirme la cobertura de acuerdo al tipo de producto aplicado (20 a 70 gotas/cm²).



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimia.com

Elaboración:
Actualización:
Versión:
Página:

04-Nov-2013.
27-Jul-2023.
05.
1 de 1.