



Uso en Jardinería

Insecticida
Contacto



FICHA TÉCNICA - PROGRANIC Omega

RSCO-INAC-0105-0273-009-90

Clasificación: Plaguicida Botánico.
Ingrediente Activo: Extracto de chicalote (*Argemone mexicana*).
Composición: 90.00% en peso, equivalente a 831.60 g i. a./L.
Formulación: Concentrado Emulsionable.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Verde).

Patrón de Uso

Insumo para el control de plagas que dañan plantas en áreas verdes y campos de golf

Plaga	Nombre científico	Dosis
Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	10 a 15 ml/L de agua
Cochinillas y piojos harinosos	<i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> <i>Aonidiella aurantii</i> <i>Aspidiotus nerii</i> <i>Lepidosaphes gloverii</i> <i>Lepidosaphes beekii</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Icerya purchasi</i>	10 a 15 ml/L de agua
Larvas	<i>Spodoptera</i> spp. <i>Pseudoplusia</i> sp.	10 a 15 ml/L de agua
Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	10 a 15 ml/L de agua
Pulgones	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i>	10 a 15 ml/L de agua
Trips	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	10 a 15 ml/L de agua

Tiempo de reentrada: Esperar a que seque el rocío de la aplicación.

Intervalo entre aplicaciones: 7 días.


Método para preparar el producto: Agite el producto antes de usarlo. Acondicione el pH del agua en el rango de 6 a 6.5. Utilice recipientes plásticos para realizar la mezcla. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua en el orden adecuado de adición de los insumos que contendrá la mezcla. Mantener la agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea.

Aplicación del producto: No use el producto de forma diferente a lo recomendado en su etiqueta. Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Realizar las aplicaciones al observar las primeras infestaciones. Procure que el producto tenga contacto con los insectos, que el tamaño de gota y presión de aspersión permita la cobertura de sitios donde se localiza la plaga. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas y cuando el follaje sea denso.

Compatibilidad: Compatible con peróxido de hidrógeno, zinc y con productos que no modifique el rango de pH indicado. Incompatible con hidróxido de sodio. Para las mezclas que se realicen con otros productos se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.


Contraindicaciones: Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo o amenace lluvia y cuando el viento favorezca la deriva.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO_3).
- Acondicione el agua para un pH de 6 a 6.5.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Alternativa para prevenir o retrasar el riesgo de resistencia.
- No comparte un punto de acción común con otros compuestos y puede ser aplicado libremente.
- Efectivo para realizar secuencias, alternancias o mezclas con insecticidas de diferentes modos de acción.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de fina (F) a mediana (M), de 136 µm a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en el envés.

