



# Nutriente Vegetal

Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio y micronutrientes.

Elementos esenciales con movilidad acropétala.



## FICHA TÉCNICA – Nutrición Vegetal

No. Registro: RSCO-062/II/13

### Uso:

Fertilizante inorgánico.

### Composición:

Nitrógeno (N) 20.00%, Fósforo ( $P_2O_5$ ) 20.00%, Potasio ( $K_2O$ ) 20.00%, Magnesio ( $MgO$ ) 1.50%, Hierro (Fe EDTA) 0.146%, Zinc (Zn EDTA) 0.073%, Cobre (Cu EDTA) 0.073%, Manganeseo (Mn EDTA) 0.073%, Boro (B) 0.029%, Molibdeno (Mo) 0.0012%, Cobalto (Co) 0.0012%, en peso/volumen.

### Formulación:

Líquido.

El Nitrógeno, Fósforo y Potasio son macronutrientes esenciales con alta movilidad en el floema. El Nitrógeno es un componente de la clorofila, aminoácidos, nucleoproteínas, ácidos nucleicos y enzimas, relacionadas con el metabolismo vegetal. El fósforo participa en la fotosíntesis (síntesis de clorofila), respiración y síntesis de carbohidratos, grasas y proteínas; es un componente estructural de los ácidos nucleicos, fosfolípidos y fosfoproteínas, y es componente esencial de las membranas citoplasmáticas; está involucrado en la regulación metabólica y energética celular, y relacionado con la fijación simbiótica del nitrógeno. El Potasio es un activador enzimático que participa en el crecimiento vegetal, desarrollo de la pared y turgencia celular, transporte xilemático, fotosíntesis, apertura estomatal, producción, almacenamiento de fotosintatos. El Magnesio es un macronutriente secundario móvil, constituyente principal de la molécula de clorofila y estabilizador de la membrana celular por activación de hidratos de carbono y proteínas.

## Patrón de Uso

**PROGROW® 20 NPK** es un fertilizante foliar soluble en agua para aplicación en pulverización foliar o a través del riego. Está formulado con los elementos esenciales de las plantas para aumentar la biomasa radicular, optimizar el uso del agua y nutrientes. **PROGROW® 20 NPK** aporta principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, que ejercen las siguientes funciones en la planta: a) El nitrógeno estimula el crecimiento de la planta, especialmente en la etapa inicial de crecimiento vegetativo; b) El fósforo promueve el desarrollo de raíces, área foliar, floración y adelanta la maduración; es importante en las primeras etapas de crecimiento ya que cumple un rol importante en el almacenamiento y transferencia de energía; c) El potasio aumenta el área de la hoja, el contenido de clorofila y retrasa la senectud.

| Cultivos     | Dosis (L/ha) | Momento de aplicación                 |
|--------------|--------------|---------------------------------------|
| Cereales     | 2 a 3        | 1 a 2 aplicaciones.                   |
| Cítricos     | 2 a 3        | 2 a 3 aplicaciones.                   |
| Frutales     | 2 a 3        | Después de la floración cada 15 días. |
| Ornamentales | 0.1 a 0.5    |                                       |
| Papa         | 2 a 3        | 2 a 4 aplicaciones.                   |
| Pepino       | 2 a 3        | 2 a 4 aplicaciones.                   |
| Tomate       | 2 a 3        | 2 a 4 aplicaciones.                   |
| Chile        | 2 a 3        | 2 a 4 aplicaciones.                   |

Para volúmenes de aplicación de 500 a 1,500 L/ha.


**Intervalo entre aplicaciones:** 10 a 14 días.

**Método para preparar el producto:** Agite el producto antes de abrir. Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. En una cubeta con agua premezcle la dosis necesaria de **PROGROW® 20 NPK**. Agregue agua al tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad, incorpore la premezcla de **PROGROW® 20 NPK** y finalmente incorpore la cantidad restante del agua. Mantenga la mezcla en agitación constante. Mezcle los preparativos con un agitador.

**Compatibilidad:** Compatible con agroquímicos de uso común; sin embargo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa. Cuando aplique **PROGROW® 20 NPK** se recomienda usar un agente adherente no iónico.


**Contraindicaciones:** No aplicar en mezcla de tanque con plaguicidas cuando el cultivo muestre síntomas de deficiencia, esté bajo estrés o en condiciones climáticas adversas.

### Acondicionamiento del Agua



■ Acondicionar el agua para un pH entre 5.5 a 6.5.


### Orden de Mezcla del Producto



■ Realice la mezcla al momento de la aplicación.  
■ Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

## Tecnología Biodisponibilidad Mejorada (EBA).


■ Suspensión concentrada soluble para aplicación foliar y riego por goteo.  
■ Gel de fuentes orgánicas con efecto sinérgico que estimula microorganismos epifíticos en la superficie foliar que mejoran la absorción, asimilación y movimiento en la planta.



### Momento de Aplicación

■ Aplique la dosis indicada en el patrón de uso en post trasplante, desarrollo vegetativo, floración y fructificación.  
■ Mejora la calidad, el color, el calibre y el peso de frutos. Promueve resistencia a los problemas causados por el estrés abiótico (hídrico) y abiótico.  
■ En aplicación foliar activa el crecimiento, desarrollo y aumenta el vigor vegetal.  
■ En aplicación al suelo, reduce el impacto al trasplante, mejora el crecimiento radicular y la absorción de nutrientes.

### Diagnóstico de Deficiencia Nutricional



■ Utilice boquillas de cono lleno para un espectro de gotas de gruesa (G) a muy gruesa (MG), con tamaño de gota de 218 a 349 µm (DVM) para aplicaciones foliares, y de 349 a 428 µm (DVM) para aplicaciones al suelo.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquímica.com

Elaboración:  
Actualización:  
Versión:  
Página:

11-Abr-2025.  
11-Abr-2025.  
01.  
1 de 1.