



Bioestimulante

Regulador de Crecimiento

Inductor de división y elongación celular, diferenciación meristemática, crecimiento embrionario y dominancia apical.



FICHA TÉCNICA - Nutrición Vegetal

No. Registro: RSCO-150/VIII/19

Uso: Nutriente Vegetal.
Composición: Ácido giberélico 1,451 ppm, ácido 3-Indolacético 4,070 ppm, Ácido glutámico 1,117 ppm, Aminoácidos 0.737 ppm, Niacina 1,048.10 ppm, Tiamina 1,019.27 ppm, Glucosa 2,051.70 ppm, Fructuosa 1,798.50 ppm, Galactosa 279.48 ppm, Fósforo (P₂O₅) 1,052.10 ppm, Potasio (K₂O) 876.20 ppm, y Nitrógeno total (N) 12.21% en peso.
Formulación: Líquido soluble.

El ácido giberélico (giberelina) produce el alargamiento de los segmentos nodales por estimulación de la elongación celular, induce la germinación de semillas, el crecimiento embrionario, el desarrollo apical y los procesos de iniciación de la floración. El ácido indolacético (auxina) interviene en los procesos de división y elongación celular, induce la diferenciación meristemática y dominancia apical. Los aminoácidos promueven la producción de fitohormonas, intervienen en la regulación del crecimiento y desarrollo vegetal, facilitan la absorción de nutrientes y mitigan los efectos del estrés. Las vitaminas mejoran las funciones metabólicas de las plantas. Los macronutrientes son elementos esenciales para el crecimiento y desarrollo vegetal.

Patrón de Uso

PROGROW® Activador es un regulador de crecimiento que interviene en los procesos metabólicos y fisiológicos de las plantas, división celular, síntesis de clorofila, aporte de energía y sustancias nutritivas. Aplíquelo para estimular la condición nutricional de la planta, el volumen radicular, la altura de planta y biomasa seca de la planta. Promueve la penetración y movilización de nutrientes hacia los tejidos activando el crecimiento equilibrado de las plantas, especialmente en frutos, logrando mayor rendimiento, calibre y calidad (diámetro, longitud y firmeza).

Cultivo	Dosis	Época de Aplicación
Agave	2.0 mL/L de agua 1.25 - 3.75 mL/L de agua	Se recomienda una primera aplicación en inmersión de la raíz (hijuelos) previo al trasplante. Si la planta está en desarrollo se recomienda aplicaciones foliares cada 30 días, se recomienda aplicar con un volumen de 200 L de agua/ha. Si la planta está en desarrollo y la aplicación es por drench se recomienda aplicar cada 30 días, en un volumen de aplicación de 500 ml de mezcla/planta. Si la planta está por entrar a producción se recomienda realizar 6 aplicaciones, la primera aplicación un año antes de la jima con intervalos de 60 días por cada aplicación, se recomienda aplicar con un volumen de 200 L de agua/ha.
Berenjena, Chile, Chile bel, Jitomate, Papa, Tabaco, Tomate de cáscara	500 - 750 mL/ha	Aplicaciones cada 15 días desde la aparición del botón floral hasta el llenado de frutos.
Calabaza, Calabacita, Chayote, Melón, Pepino, Sandía	500 - 750 mL/ha	Aplicaciones cada 15 días desde la aparición del botón floral hasta el llenado de frutos.


Intervalo entre aplicaciones: 15 días.

Método para preparar el producto: Agite el producto antes de usarlo. Acondicione el agua a un pH de 5.5 a 7 para una mejor acción del producto. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua siempre en el orden adecuado de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla. Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del cultivo a asperjar y forma de aplicación.

Compatibilidad: Es compatible con productos de reacción ácida a neutra. Se recomienda realizar una prueba previa antes de proceder con su mezcla.

Contraindicaciones: Evite aplicar en horas de sol intenso.

Acondicionamiento del Agua




- Corregir la dureza para obtener agua blanda (°d= 0 a 8; de 0 a 142.5 ppm de CaCO₃ + MgCO₃).
- Acondicionar el agua para un pH entre 5.5 a 7.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Momento de Aplicación



- No aplique subdosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Aplicación foliar y radicular después del trasplante, en amacollamiento, tuberización, emisión de yemas, floración, amarre y llenado de fruto.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono lleno para un espectro de gotas de gruesa (G) a muy gruesa (MG), con tamaño de gota de 218 a 349 µm (DVM) para aplicaciones foliares, y de 349 a 428 µm (DVM) para aplicaciones al suelo.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimica.com

Elaboración: 19-Sep-2019.
 Actualización: 04-Sep-2025.
 Versión: 03.
 Página: 1 de 1.