



Nutriente Vegetal

Nitrógeno, Fósforo y Potasio.

Elementos esenciales con movilidad acropétala y basipétala.



FICHA TÉCNICA – Nutrición Vegetal

No. Registro: RSCO-064/II/13

Uso: Fertilizante inorgánico.
Composición: Nitrógeno (N) 4.00%, Fósforo (P_2O_5) 37.80%, Potasio (K_2O) 17.50%, en peso/volumen.
Formulación: Líquido.

El Nitrógeno, Fósforo y Potasio son macronutrientes esenciales con alta movilidad en el floema. El Nitrógeno es un componente de la clorofila, aminoácidos, nucleoproteínas, ácidos nucleicos y enzimas, relacionadas con el metabolismo vegetal. El fósforo participa en la fotosíntesis (síntesis de clorofila), respiración y síntesis de carbohidratos, grasas y proteínas; es un componente estructural de los ácidos nucleicos, fosfolípidos y fosfoproteínas, y es componente esencial de las membranas citoplasmáticas; está involucrado en la regulación metabólica y energética celular, y relacionado con la fijación simbiótica del nitrógeno. El Potasio es un activador enzimático que participa en el crecimiento vegetal, desarrollo de la pared y turgencia celular, transporte xilemático, fotosíntesis, apertura estomatal, producción y almacenamiento de fotosintatos.

Patrón de Uso

PROGROW® P37 es un fertilizante foliar, fuente de fósforo con alta solubilidad de rápida absorción y movimiento. El fósforo tiene un papel central en la transferencia de energía; los carbohidratos antes de ser metabolizados son fosforilados; la presencia del fósforo en la estructura molecular de los azúcares los hace más reactivos. El fósforo participa en un gran número de reacciones enzimáticas que dependen de la fosforilación, y es esencial para la división celular y el desarrollo de los tejidos meristemáticos. El fosfato se distribuye fácilmente en las plantas y se mueve de las hojas viejas hacia las jóvenes en las que se almacena; también se acumula en las flores en proceso de desarrollo y en las semillas. **PROGROW® P37** se mueve por el xilema y el floema llevando fósforo esencial a la zona de la raíz.

Cultivos	Dosis (L/ha)	Momento de aplicación
Brassicas	2 a 4	2 a 4 hojas.
Cebolla	2	3 a 4 hojas.
Cítricos	4	3 aplicaciones con intervalo de 10 días.
Fresa	4	Botón verde.
Lechuga	4	10 días después del trasplante.
Manzana	4	Caída de pétalos.
Papa	2 a 4	Inicio de tubérculos.
Uva	2.4	3 aplicaciones con intervalo de 10 días.
Zanahoría	2 a 3	3 a 4 hojas.

Para volúmenes de aplicación de 500 a 1,500 L/ha.


Intervalo entre aplicaciones: 10 a 14 días.

Método para preparar el producto: Agite el producto antes de abrir. Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. En una cubeta con agua premezcle la dosis necesaria de **PROGROW® P37**. Agregue agua al tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad, incorpore la premezcla de **PROGROW® P37** y finalmente incorpore la cantidad restante del agua. Mantenga la mezcla en agitación constante. El pH de la mezcla (solución) debe ser de 5.0 a 7.0. Mezcle los preparativos con un agitador. Aplicar en pulverización foliar o a través del riego.

Compatibilidad: Compatible con agroquímicos de uso común; sin embargo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa. Cuando aplique **PROGROW® P37** se recomienda usar un agente adherente no iónico.


Contraindicaciones: Ninguna.

Acondicionamiento del Agua



■ Acondicionar el agua para un pH entre 5 a 7.


Orden de Mezcla del Producto



■ Realice la mezcla al momento de la aplicación.
■ Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Tecnología Biodisponibilidad Mejorada (EBA).


■ Suspensión concentrada soluble para aplicación foliar y riego por goteo.
■ Gel de fuentes orgánicas con efecto sinérgico que estimula microorganismos epifíticos en la superficie foliar que mejoran la absorción, asimilación y movimiento en la planta.



Momento de Aplicación

■ Aplicación foliar y al suelo en fertirriego, en postrasplante con hojas verdaderas, tuberización, yema floral, floración, caída de pétalos y cuajado de frutos.
■ En dosis baja actúa como bioestimulante para mejorar el crecimiento radicular, formación de tubérculos, establecimiento y resistir el estrés abiótico.
■ Contiene Ethil Fosfonato de Potasio, con función nutrimental, transportador de nutrientes (cationes) e inductor de resistencia.
■ Se mueve por floema y xilema, mejorando el transporte de cationes (Ca, Mg, Mn).

Diagnóstico de Deficiencia Nutricional



■ Utilice boquillas de cono lleno para un espectro de gotas de gruesa (G) a muy gruesa (MG), con tamaño de gota de 218 a 349 μm (DVM) para aplicaciones foliares, y de 349 a 428 μm (DVM) para aplicaciones al suelo.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimica.com

Elaboración:
Actualización:
Versión:
Página:

11-Abr-2025.
11-Abr-2025.
01.
1 de 1.