



Nutriente Vegetal

Zinc (EDTA).

Nanopartículas de penetración estomatal y cuticular.



FICHA TÉCNICA – Nutrición Vegetal

No. Registro: RSCO-063/II/13

Uso: Fertilizante inorgánico.
Composición: Zinc EDTA (Zn) 70.00%, en peso/volumen.
Formulación: Líquido.

El zinc es un microelemento inmóvil esencial como cofactor enzimático, regulador y estabilizador de la estructura proteica. El zinc es esencial en la síntesis de clorofila, la regulación hormonal (auxinas), la activación de enzimas y la defensa contra estrés ambiental. Es esencial para la fotosíntesis, conversión de aminoácidos, transformación de azúcares en almidón y el mantenimiento de la integridad de las membranas celulares. Esencial en los sistemas de defensa de las células en contra de los radicales libres altamente tóxicos, participa en la biosíntesis del ácido indolacético (AIA) así como en su protección al ataque oxidativo, participa en la viabilidad del polen y formación de semillas.

Patrón de Uso

PROGROW® ZN ESPECIAL es un fertilizante en suspensión concentrada de zinc, soluble en agua, desarrollado para la prevención y corrección de deficiencias de zinc. El zinc es un estimulante metabólico en semillas y plántulas, donde activa enzimas para el desarrollo radicular. Participa en la conversión de aminoácidos, proteínas y hormonas. Debido a la formulación de **PROGROW® ZN ESPECIAL**, las pérdidas por escurrimiento son muy bajas, ya que se adhiere bien a la hoja.

Cultivos	Dosis (L/ha)	Momento de aplicación
Ajo, Cebolla, Flor bulbosa.	0.3 a 0.5	Aplicar 30 y 60 días después del trasplante.
Almendra, Nogal.	0.5 a 0.75	Aplicar a inicios de flor, repetir aplicación con brote de 15-18 cm. Aplicar la dosis mayor en postcosecha 30 días antes del inicio de caída de hojas.
Arándano, Frambuesa, Frutillo, Grosella, Mora, Zarzaparrilla.	0.3 a 0.5	Aplicar 1 a 2 veces preferentemente antes de floración.
Avena, Arroz.	0.5	Deficiencia severa.
Trigo.	0.3	Deficiencia moderada.
Avellano, Olivo.	1.0	En postcosecha antes del inicio de la caída de hojas.
Cerezo, Ciruelo, Damasco.	0.5	Aplicar desde el fruto cuajado cada 2 o 3 semanas hasta un mes antes de la cosecha.
Durazno, Nectarino.	0.75	Aplicar en yema hinchada y repetir en botón floral.
Clementina, Limón, Mandarino, Naranja, Tangelo.	0.75 a 1.0	Aplicar en los flujos de crecimiento de otoño y primavera.
Espárrago.	0.3 a 0.5	Aplicar 15 días después de la apertura del meristemo apical, repetir a los 20 días.
Kiwi.	0.5	Aplicar desde brote de 15 cm, cada 15 días (mojamiento de 600 a 800 L/ha).
Maíz.	0.3 a 0.5	Aplicar a partir de 3 a 8 hojas, repetir al inicio de panoja.
Manzano.	0.5 a 0.75	Aplicar en apertura de yema. No aplicar durante floración.
Membrillo.	0.75 a 1.0	En postcosecha antes de la caída de las hojas.
Peral.	0.5	A partir de 6 semanas después de caída de pétalos y repetir según necesidad en intervalos de 14 a 21 días, hasta un mes antes de la cosecha.
Ornamental.	0.3 a 0.5	Aplicar al inicio de crecimiento de brotes.
Papa.	0.5 a 0.75	Aplicar una semana después de que ha emergido el 100% del cultivo. Con deficiencia moderada, repetir 10 a 14 días después.
Remolacha.	0.3 a 0.5	Aplicar desde 4 a 8 hojas.
Uva de mesa, Uva vinífera.	0.5 a 0.75	Aplicar 20 días antes de inicio de flor y repetir a los 15 días.


Intervalo entre aplicaciones: 14 a 15, 20 a 21 días.

Método para preparar el producto: Agite el producto antes de abrir. Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. Agregue agua al tanque de aplicación hasta aproximadamente la mitad de su capacidad, incorpore la dosis recomendada de **PROGROW® ZN ESPECIAL** y finalmente incorpore la cantidad restante de agua. Mantenga la mezcla en agitación constante. Mezcle los preparativos con un agitador.

Compatibilidad: Compatible con agroquímicos, reguladores de crecimiento y nutrientes de uso común; sin embargo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa. Cuando aplique **PROGROW® ZN ESPECIAL** se recomienda usar un agente humectante no iónico.


Contraindicaciones: No aplicar en mezcla de tanque con plaguicidas en condiciones climáticas adversas.

Acondicionamiento del Agua



■ Acondicionar el agua para un pH entre 5 a 5.5.


Orden de Mezcla del Producto



■ Realice la mezcla al momento de la aplicación.
■ Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Tecnología Biodisponibilidad Mejorada (EBA).


■ Suspensión concentrada soluble para aplicación foliar y riego por goteo.
■ Gel de fuentes orgánicas con efecto sinérgico que estimula microorganismos epifíticos en la superficie foliar que mejoran la absorción, asimilación y movimiento en la planta.



Momento de Aplicación

■ Aplique la dosis indicada en el patrón de uso. Aplicación foliar o fertirriego, en siembra, post trasplante, brotación, prefloración (yema hinchada), caída de pétalos y cuajado de frutos.
■ Mejora la germinación de semilla, promueve el desarrollo radicular, acelera la emergencia de plántulas, promueve mayor número de flores y evita el aborto (amarre).
■ Formulación concentrada de liberación lenta. Micropartículas que penetran por estomas y por la cutícula de la hoja.

Diagnóstico de Deficiencia Nutricional



■ Utilice boquillas de cono lleno para un espectro de gotas de gruesa (G) a muy gruesa (MG), con tamaño de gota de 218 a 349 µm (DVM) para aplicaciones foliares, y de 349 a 428 µm (DVM) para aplicaciones al suelo.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquímica.com

Elaboración: 11-Abr-2025.
Actualización: 11-Abr-2025.
Versión: 01.
Página: 1 de 1.