



Humectante y Extensor


Depósito y Retención de Soluciones de Aspersión
Aplicación Foliar



FICHA TÉCNICA – Coadyuvantes


No aplica registro ante la COFEPRIS

Clasificación: Coadyuvante.
Ingrediente Activo: Mezcla de alquil polioxietilenado, monoetilenglicol, organosilicona y disolvente acuoso.
Composición: No menos de 100.0% p/p.
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Uso Autorizado: Agrícola.




- Realice correcciones en la calidad del agua antes de realizar la mezcla en tanque.
- Corrija el pH y dureza del agua conforme a las indicaciones para los insumos incluidos en la solución de aspersión.

Orden de Mezcla del Producto



- Acote el orden de adición de insumos en la mezcla para evitar incompatibilidades físicas y químicas.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- Aplique las dosis indicadas en el patrón de uso. Mezclar con el agua para acondicionar las características de la solución de aspersión.
- Mejora el depósito y retención del ingrediente activo en la planta.

Densidad de la Cobertura



- Seleccione el tipo de boquilla para una pulverización óptima (tamaño de gota), y reduzca pérdidas de aplicación (deriva, lavado).
- Asegure y confirme la cobertura de acuerdo al tipo de producto aplicado (20 a 70 gotas/cm²).

Patrón de Uso

Prolux® es un coadyuvante no iónico que mejora las características de dispersión, humectación y adherencia de soluciones de aspersión que involucran plaguicidas, facilitando su cobertura y acentuando su efectividad en aplicaciones foliares en soluciones acuosas.

Dosis de aplicación: deberá hacer uso de la dosis mayor de preferencia cuando se desee mayor cobertura de las superficies foliares.

Productos	Dosis
Insecticidas, fungicidas, desecantes, herbicidas post-emergentes.	1 a 2 cc por cada litro de agua.
Herbicidas de traslocación y herbicidas de contacto.	3 a 4 cc por cada litro de agua.
Herbicidas pre-emergentes.	600 a 700 cc por hectárea.

Tiempo de reentrada: espere a que seque el rocío de la aspersión.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 0 días (Sin Límite).

Intervalo entre aplicaciones: acote las recomendaciones indicadas para el insumo con el que se mezcle.

Preparación del producto: vierta la cantidad necesaria de producto directamente con la suficiente cantidad de agua siempre en el orden adecuado de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla. Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del cultivo a asperjar.

Aplicación del producto: no use el producto de forma diferente a lo recomendado en esta etiqueta. Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. Aplique el coadyuvante en mezcla con insumos fitosanitarios y nutrientes vegetales en aplicaciones foliares de soluciones acuosas.

Compatibilidad: no presenta cuadros de incompatibilidad.

Contraindicaciones: evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva. No almacenar con agentes oxidantes.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimia.com

Elaboración:
Actualización:
Versión:
Página:

05-Dic-2003.
27-Jul-2023.
06.
1 de 1.