



Fungicida

Mitosis- Citoesqueleto y Proteínas Motoras (Código 1)

Sistémico, con traslocación acropétala - Preventivo y Curativo de amplio espectro



FICHA TÉCNICA - Protección Vegetal

RSCO-FUNG-0369-X0114-064-42.14

Clasificación: Plaguicida Químico.
Ingrediente Activo: Tiofanato de metilo.
Composición: 42.14% en peso, equivalente a 503.53 g i.a./L.
Formulación: Suspensión Concentrada.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 4 (Oral: 2,000 mg/kg).

Patrón de Uso

Cultivos	Enfermedad	Dosis	Aplicaciones	Intervalo	Volumen
Cebolla, Ajo, Cebollín, Espárrago (SL)	Pudrición blanca (<i>Sclerotium cepivorum</i>)	0.5 - 1.5 L/ha	3	14 días	1150 - 1250 L/ha
Limón mexicano, Limón persa, Naranja, Lima, Mandarin, Tangerino, Toronjo (28)	Antracnosis (<i>Colletotrichum acutatum</i>)	1.0 - 2.0/ L de agua	2	7 días	550 - 650 L/ha
Calabaza, Calabacita, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (1)	Marchitez del pepino (<i>Fusarium sp.</i>)	1.0 - 1.5 L/ha	3	20 días	110 - 210 L/ha
Manzano, Peral (1)	Pudrición morena (<i>Monilinia fructicola</i>)	60 - 100 ml/100 L de agua	2	7 días	675 - 775 L/ha

Tiempo de reentrada: 24 h.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: Los indicados para cada cultivo (días).

Límite máximo de residuos: Consultar las tolerancias establecidas para México y el país destino de los productos cosechados.

Intervalo entre aplicaciones: 7, 14 y 20 días.


Preparación del producto: Agite el producto antes de usarlo. Acondicione el agua a un pH de 5 a 5.5 para una mejor acción del producto. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua que contendrá la mezcla. Para mayor penetración foliar es recomendable agregar un coadyuvante.

Aplicación del producto: Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. Evita la infección inicial causada por la germinación y penetración de las estructuras reproductivas de los hongos (preventivo), y detiene el crecimiento fungoso cuando la enfermedad está presente (curativo). Realice las aplicaciones en forma preventiva, antes de observar los primeros síntomas de la presencia de la enfermedad y cuando las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo, asegurándose que el producto tenga contacto con los tejidos expuestos a la enfermedad. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas y cuando el follaje sea denso. Agite la mezcla cada vez que recargue el aspersor para asegurar una mezcla homogénea. Realice las aplicaciones en horas tempranas del día o al atardecer.

Compatibilidad: compatible con Clorotalonil, imidacloprid, oxitetraciclina y aminoácidos; no lo mezcle con aceites ni sustancias alcalinas. Cuando se desconozca la compatibilidad con otro producto, realice una prueba física previa para evitar efectos no deseados.


Contraindicaciones: No lo aplique en soluciones de aspersión con pH superior a 7 debido a que puede sufrir degradación. Evite aplicarlo en suelos con textura arenosa para evitar lixiviación. Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO_3).
- Acondicione el agua para un pH de 5 a 5.5.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Realice mezclas, secuencias o alternancias, con fungicidas de diferentes modos de acción para minimizar la selección de resistencia.
- Mezcle con fungicidas Multisitio (código M) en la misma aplicación, y alterne con ingredientes activos de diferentes modos de acción.
- Limite el número de aplicaciones consecutivas en el programa de control.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de mediana (M) a gruesa (C).
- Tamaño de gota media a gruesa, de 177 µm a 349 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 20 a 30 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en el tejido a proteger.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimica.com

Elaboración:
Actualización:
Versión:
Página:

18-Dic-2017.
01-Sep-2022.
03.
1 de 1.