

Insecticida

Modo de Acción Desconocido o Incierto
Contacto e Ingestión



FICHA TÉCNICA - Protección Vegetal

Registro No. 025-001/EV

Clasificación: Plaguicida biológico (Extracto vegetal).
Ingrediente Activo: Extracto de alcaloides (*Argemone mexicana*).
Composición: 179.76 g i.a./L.
Formulación: Concentrado emulsionable (CE).
Uso Autorizado: Agrícola.

Instrucciones de Uso y Manejo Seguro

Lea la Etiqueta y Hoja Informativa antes de usar el producto
Consérvese en lugar cerrado fuera del alcance de los niños

PRONTIUS IO es un insecticida botánico formulado con extracto de argemone, que tiene efecto tóxico hacia insectos, bloqueando los neuro-receptores intermediarios de la transducción de la señal neuronal y canales iónicos, inhibe las enzimas necesarias para la síntesis y el rompimiento del neurotransmisor acetilcolina, impidiendo la transducción de la señal neuronal.

Agite el producto antes de usarlo. Acondicione el pH del agua en el rango de 6 a 7 para una mejor acción del producto. Vierta la cantidad necesaria del producto debidamente medida del producto conforme a lo indicado en su etiqueta con la suficiente cantidad de agua. Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea. Para obtener una mayor calidad en la aplicación del producto, es recomendable adicionar a la mezcla un surfactante-penetrante a base de organosilicona. No es necesario un intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha. Se recomienda realizar la aplicación durante la mañana o por la tarde para no exponer al producto a condiciones adversas.

Contraindicaciones: evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo o amenace a llover y cuando el viento favorezca la deriva. No use el producto de forma diferente a lo recomendado en su etiqueta. Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C.
Rosas (<i>Rosa sp.</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1.5 mL/L	N/A
	Ácaros (<i>Tetranychus urticae</i>)		
Gipsófila (<i>Gypsophila paniculata</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	2.0 mL/L	N/A
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Trips de la mancha roja (<i>Chaetanaphothrips signipennis</i>)	10 mL/L	N/A
Arándano (<i>Vaccinium corymbosum</i>)	Araña Roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.0 - 3.0 L / 200 L de agua	N/A
Frambuesa roja (<i>Rubus idaeus</i>)			
Fresa (<i>Fragaria ananassa</i>)			
Grosella (<i>Ribes punctatum</i>)			
Vid (<i>Vitis vinifera</i>)			
Berenjena (<i>Solanum melongena</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1.5 - 2.0 L/ha	N/A
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)			
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)			
Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>)	Pulgón de la col (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	0.5 - 1.5 L / 100 L de agua	N/A
Col (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>)			
Col de bruselas (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i>)			
Coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>)			
Melón (<i>Cucumis melo</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1.0 - 2.0 L/ha	N/A
Pepino (<i>Cucumis sativus</i>)			
Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>)			
Lima (<i>Citrus aurantiifolia</i>)	Psílido asiático de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	1.0 - 2.0 L/ha	N/A
Limón (<i>Citrus limon</i>)			
Mandarina (<i>Citrus reticulata</i>)			
Naranja (<i>Citrus sinensis</i>)			
Torónja (<i>Citrus paradisi</i>)			
Manzana (<i>Malus domestica</i>)	Pulgón lanígero (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	1.0 - 2.0 L / 200 L de agua	N/A
Membrillo (<i>Cydonia oblonga</i>)			
Pera (<i>Pyrus communis</i>)			

Periodo de carencia (P.C.): 0 días (N/A= No Aplica).

Límite máximo de residuos (LMR): exento.

Gasto de agua: Banano: 125 L/ha; Rosa (Trips) y Gipsófila: 1000 L/ha; Rosa (Ácaro): 2800 L/ha; Arándano, Frambuesa roja, Fresa, Grosella, Vid: 571-671 L/ha; Berenjena, Pimiento, Tabaco: 330-430 L/ha; Melón, Pepino, Sandía: 192-292 L/ha; Brócoli, Col, Col de bruselas, Coliflor: 350-450 L/ha; Lima, Limón, Mandarina, Naranja, Torónja: 330-430 L/ha; Manzana, Membrillo, Pera: 666-807 L/ha.


Frecuencia y época de aplicación: Banano: aplicar por aspersión, cuando el cultivo se encuentre en desarrollo vegetativo (plántula), con un ataque de la plaga entre 4.4 y 5.02 insectos por planta; realice tres aplicaciones del producto con un intervalo de 5 días. Rosa-Ácaros y Gipsófila: realizar como mínimo dos aplicaciones de manera homogénea cubriendo el botón floral durante la fase de producción, cuando se presenten los primeros individuos, cada 7 días. Rosa-Trips: realizar como mínimo dos aplicaciones cubriendo de manera homogénea el área foliar durante la fase de producción, cada 5 días.

Incompatibilidad: no es compatible con fungicidas de hidróxido de calcio y azufre. Para mezclas con otros productos fitosanitarios es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.

Fitotoxicidad: no es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado en su etiqueta.


Disposición final del envase: ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Enjuague tres veces el envase después de usar el contenido y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturándolo o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final. No arroje los envases vacíos al campo, fuentes de agua, acequias, ríos o al sistema de alcantarillado.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO_3).
- Acondicione el agua para un pH de 6 a 7.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación

MdA Secuencia	MdA Alternancia	MdA Mezcla
---------------	-----------------	------------

- PRONTIUS IO 1a Aplicación** **PRONTIUS IO 2a Aplicación** **PRONTIUS IO 3a Aplicación**
- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
 - Alternativa para prevenir o retrasar el riesgo de resistencia.
 - No comparte un punto de acción común con otros compuestos y puede ser aplicado libremente.
 - Efectivo para realizar secuencias, alternancias o mezclas con insecticidas de diferentes modos de acción.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de fina (F) a mediana (M).
- Tamaño de gota de 136 µm a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en el envés.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquímica.com

Elaboración: 06-Dic-2022.
Actualización: 24-Abr-2026.
Versión: 04.
Página: 1 de 1.