



Surfactante y Sinergista de plaguicidas

Degrada lipoproteínas, quitina y ceras del integumento o exoesqueleto.

Aplicación Foliar.




FICHA TÉCNICA – Coadyuvantes

No aplica registro ante la COFEPRIS


Clasificación: Coadyuvante.
Ingrediente Activo: Dioctil sulfosuccinato de sodio y diluyente.
Composición: No menos de 100.00% p/p.
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Uso Autorizado: Agrícola.

Acondicionamiento del Agua




- Realice correcciones en la calidad del agua antes de realizar la mezcla en tanque.
- Corrija el pH y dureza del agua conforme a las indicaciones para los insumos incluidos en la solución de aspersión.

Orden de Mezcla del Producto



- Acote el orden de adición de insumos en la mezcla para evitar incompatibilidades físicas y químicas.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación para evitar pérdidas.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- Aplique las dosis indicadas en el patrón de uso. Aplíquelo en mezcla para mejorar la efectividad de los ingredientes activos.
- Mejora la calidad de la aspersión (humectante y dispersión) y el movimiento del ingrediente activo en la planta (penetración).

Densidad de la Cobertura



- Seleccione el tipo de boquilla para una pulverización óptima (tamaño de gota), y reduzca pérdidas de aplicación (deriva, lavado).
- Asegure y confirme la cobertura de acuerdo al tipo de producto aplicado (20 a 70 gotas/cm²).

Patrón de Uso

Autorizado en Programas Inocuos o Certificados Orgánicos

PROWET® Ovi-Die es un coadyuvante aniónico para su aplicación solo o en mezcla con plaguicidas. Por el contacto sinergiza la efectividad biológica de plaguicidas, su ingrediente activo es un inhibidor de lipoproteínas de la cutícula y membranas celulares, degradador de quitina y ceras del integumento o exoesqueleto.

Su ingrediente activo es de riesgo reducido, su uso no afecta negativamente la salud o el ambiente; está autorizado como coadyuvante en formulaciones de plaguicidas para su aplicación directa en cultivos o en productos agrícolas cosechados.

Dosis de aplicación:

- Se aplica en dosis de 20 a 125 ml/100 L de agua.
- En concentraciones de 50 a 125 ml/100 L de agua, tiene un efecto penetrante y sinérgico con plaguicidas.
- En concentraciones de 20 a 25 ml/100 L de agua, actúa como tensoactivo, mejorando la dispersión y humectación de las mezclas acuosas.

Tiempo de reentrada: espere a que seque el rocío de la aspersión.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 0 días (Sin Límite). Está exento del requisito de tolerancia para residuos (LMR) para usos previos y posteriores a la cosecha.

Intervalo entre aplicaciones: acote las recomendaciones indicadas para el insumo con el que se mezcle.

Preparación del producto: agite el producto antes de usarlo con movimientos verticales. No lo mezcle con aguas de elevada dureza y acondicione a un pH de 6.5 a 7.0. Utilice recipientes plásticos para realizar la mezcla. Agregue la dosis recomendada del producto directamente con el agua requerida para su aplicación, en el orden adecuado de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla. Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición de asegurar una mezcla homogénea.

Aplicación del producto: aplicación foliar. Aplique durante la mañana o atardecer para que la mezcla seque lentamente para mayor efectividad. Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación.

Compatibilidad: para las mezclas que se realicen con otros productos, se recomienda da realizar una prueba de compatibilidad previa a su mezcla y aplicación.

Contraindicaciones: evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva. No aplicar en plantas estresadas por riegos inadecuados, recién trasplantadas, en camas de enraizamiento, esquejes, plantas bajo estrés hídrico o con puntos de crecimiento sensibles.

