



Encapsulador y Adherente


Protector de degradación, persistencia y lavado
Aplicación Foliar



FICHA TÉCNICA – Coadyuvantes


No aplica registro ante la COFEPRIS

Clasificación: Coadyuvante.
Ingrediente Activo: Mezcla de pinenos, aceites vegetales y emulsificantes.
Composición: No menos de 100.0% p/p.
Formulación: Concentrado emulsionable (CE).
Uso Autorizado: Agrícola.




- Realice correcciones en la calidad del agua antes de realizar la mezcla en tanque.
- Corrija el pH y dureza del agua conforme a las indicaciones para los insumos incluidos en la solución de aspersión.

Orden de Mezcla del Producto



- Acote el orden de adición de insumos en la mezcla para evitar incompatibilidades físicas y químicas.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- Aplique las dosis indicadas en el patrón de uso. Mezclar para permitir una acción prolongada del producto aplicado.
- Forma una película que encapsula y protege a los activos, reduce su degradación y remoción por lluvia o viento.

Densidad de la Cobertura



- Seleccione el tipo de boquilla para una pulverización óptima (tamaño de gota), y reduzca pérdidas de aplicación (deriva, lavado).
- Asegure y confirme la cobertura de acuerdo al tipo de producto aplicado (20 a 70 gotas/cm²).

Patrón de Uso

Prowet® Pine Oil es un coadyuvante no iónico que facilita la adherencia al follaje de los productos con que se mezcla y aplica. Forma una película pegajosa, que encapsula y protege de la radiación ultravioleta al plaguicida, reduce la degradación provocada por factores ambientales, lo que permite una acción más prolongada del producto aplicado. Impide la remoción de los ingredientes activos de las superficies de las hojas provocada por la lluvia o el viento.

Dosis de aplicación:

- 0.4 a 0.6 L/ha en aplicaciones aéreas.
- 1 L/ha en aplicaciones terrestres, con volumen de agua de 800 a 1000 L/ha.

Deberá hacer uso de la dosis mayor de preferencia cuando se desee una mayor protección al lavado por lluvia.

Tiempo de reentrada: 1 h después de la aspersión.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: No se aplique a los cultivos comestibles 30 días previos a la cosecha.

Intervalo entre aplicaciones: acote las recomendaciones indicadas para el insumo con el que se mezcle.

Preparación del producto: agite el producto antes de usarlo. No lo mezcle con aguas de elevada dureza y acondicione el agua al pH indicado para los productos que contendrá la mezcla. Dosifique el producto directamente con la suficiente cantidad de agua en el orden adecuado de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla. Agite la mezcla cada ocasión que cargue el aspersor. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del cultivo a asperjar.

Aplicación del producto: no use el producto de forma diferente a lo recomendado en su etiqueta. Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. Aplique el coadyuvante en mezcla con insumos fitosanitarios y nutrientes vegetales en aplicaciones foliares de soluciones acuosas. La aplicación debe realizarse como mínimo una hora antes en condiciones de lluvia, intervalo de tiempo necesario para la formación de la película protectora. No es fitotóxico si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de su etiqueta.

Compatibilidad: incompatible con productos de fuerte reacción alcalina. Para las mezclas que se realicen con otros productos, es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa aplicación.

Contraindicaciones: evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva.

