



Fungicida

Mitosis– Citoesqueleto y Proteínas Motoras (Código 1)
Sistémico, con traslocación acropétala – Preventivo y Curativo



FICHA TÉCNICA – Protección Vegetal

RSCO-FUNG-0307-320-342-043

Clasificación: Plaguicida Químico.
Ingrediente Activo: Carbendazim.
Composición: 42.80% en peso, equivalente a 500.76 g i.a./L.
Formulación: Suspensión Concentrada.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 4 (Oral: 2,000 mg/kg).

Patrón de Uso

Cultivo	Plaga	Dosis	Aplicaciones	Intervalo	Volumen
Soya (SL) Frijol (14)	Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	566 - 600 ml/ha	2	7 días	
Piña (30)	Pudrición de raíz y cuello (<i>Fusarium oxysporum</i>)	3 a 5 L/ha	2	14 días	2,075 L/ha 50 mL por planta
Tomate (30)	Pudrición de raíz y cuello (<i>Fusarium oxysporum</i>)	500 - 1,500 ml /ha	2	14 días	950 - 1,000 L/ha

Tiempo de reentrada: 24 h.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: Los indicados para cada cultivo (días).

Límite máximo de residuos: Consultar las tolerancias establecidas para México y el país destino de los productos cosechados.

Intervalo entre aplicaciones: 7, 14 y 20 días.


Preparación del producto: Agite el producto antes de usarlo. Acondicione el agua a un pH de 5 a 5.5 para una mejor acción del producto. Se debe preparar la mezcla agregando la dosis recomendada del producto en una cubeta con un poco de agua y se agita hasta producir una mezcla uniforme. Vierta esta mezcla en el tanque de aplicación que contenga la suficiente cantidad de agua para asegurar un cubrimiento uniforme de las superficies tratadas. Agite la mezcla cada vez que cargue el aspersor para asegurar una mezcla homogénea.

Aplicación del producto: Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. Aplique en tratamiento al follaje, y dirigido al cuello y drenchado. Interfiere con funciones vitales en las células de los hongos, interrumpe la división celular y transporte intracelular, evitando la infección inicial causada por la germinación y penetración de las estructuras reproductivas de los hongos (preventivo), y deteniendo el crecimiento fungoso cuando la enfermedad está presente (curativo). Realice las aplicaciones en forma preventiva, iniciando al momento de la siembra, o dirigidas al cuello y drenchado a los hijuelos o coronas. Agite la mezcla cada vez que recargue el aspersor para asegurar una mezcla homogénea. Realice las aplicaciones en horas tempranas del día o al atardecer.

Compatibilidad: No lo mezcle con aceites ni sustancias alcalinas. Cuando se desconozca la compatibilidad con otros productos, deberá hacerse una prueba antes de su aplicación para determinar efectos no deseados. Para las mezclas que se realicen con otros productos se recomienda utilizar los que cuenten con registro autorizado y vigente en los cultivos recomendados.


Contraindicaciones: No lo aplique en soluciones de aspersión con pH superior a 7 debido a que puede sufrir degradación. No lo aplique en horas de calor intenso ni cuando el viento exceda los 15 km/h.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO_3).
- Acondicione el agua para un pH de 5 a 5.5.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Realice mezclas, secuencias o alternancias, con fungicidas de diferentes modos de acción para minimizar la selección de resistencia.
- Mezcle con fungicidas Multisitio (código M) en la misma aplicación, y alterne con ingredientes activos de diferentes modos de acción.
- Limite el número de aplicaciones consecutivas en el programa de control.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de mediana (M) a gruesa (C).
- Tamaño de gota media a gruesa, de 177 µm a 349 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 20 a 30 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en el tejido a proteger.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimica.com

Elaboración:
Actualización:
Versión:
Página:

16-Ene-2004.
05-Sep-2022.
03.
1 de 1.