



Fungicida

Respiración – Inhibidor Externo de la Quinona (Código 11)

Sistémico, translaminar y locosistémico

Preventivo, Curativo y Erradicante

FICHA TÉCNICA – Protección Vegetal

RSCO-FUNG-03010-X0295-009-24.50

Clasificación: Plaguicida Químico.
Ingrediente Activo: Piraclostrobina.
Composición: 24.50% en peso, equivalente a 250.00 g i.a./L.
Formulación: Concentrado Emulsionable.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 4 (Precaución).

Patrón de Uso

Cultivo	Plaga	Dosis (L/ha)	Aplicaciones	Intervalo	Volumen
Aguacate (15)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	0.25 - 0.5	2	14 días	731 - 831 L/ha
Algodón (30)	Viruela (<i>Puccinia cacabata</i>)	0.5 - 1.0	1		500 L/ha
Chile, Berenjena, Jitomate, Pimiento morrón, Tomate verde (7)	Cenicilla (<i>Leveillula taurica</i>)	0.4 - 0.6	2	7 días	541 - 575 L/ha
Durazno, Manzano, Membrillo, Peral (60)	Cenicilla (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	0.75	2	7 días	650 L/ha
Limonero, Naranja, Lima, Tangerino, Mandarin, Toronjo (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	0.25 - 0.75 L/2000 L de agua	3	7 días	
Maíz, Sorgo (7)	Tizón foliar (<i>Exserohilum turcicum</i>)	0.3 - 0.5	2	14 días	300 L/ha
Mango (30)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	0.4 - 0.6	2	14 días	600 - 760 L/ha
Nogal, Nogal de castilla, Nogal pecanero (14)	Antracnosis (<i>Gnomonia leptostyla</i>)	0.4 - 0.6	2	7 días	1000 L/ha
	Mancha vellosa (<i>Mycosphaerella carygena</i>)	0.4 - 0.6	2	14 días	1000 L/ha

Tiempo de reentrada: 24 h.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: Los indicados en cada cultivo (días).

Límite máximo de residuos: Consultar las tolerancias establecidas para México y el país destino de los productos cosechados.

Intervalo entre aplicaciones: 7 y 14 días.

Preparación del producto: Agite el producto antes de usarlo. Utilice agua limpia para realizar la aspersión. Utilice recipientes plásticos para realizar la mezcla. Se deberá preparar la mezcla agregando la dosis recomendada del producto directamente en la mitad de agua requerida para su aplicación, agite y adicione la cantidad de agua restante. Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del cultivo a asperjar.


Aplicación del producto: Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. Actúa de forma preventiva y curativa, inhibe la germinación de las esporas, controla el crecimiento micelial y la esporulación del hongo. Aplique el producto de manera preventiva, no espere hasta que los valores de infección de la enfermedad sean altos. Aplique un máximo de 3 aplicaciones consecutivas y máximo 1/3 del total de las aplicaciones por cultivo. Agite la mezcla cada vez que recargue el aspersor para asegurar una mezcla homogénea.

Compatibilidad: Compatible con argemoneína, berberina, ricinina, α-terthienil, clorotalonil, aminoácidos libres, extracto de gobernadora, sales potásicas de ácidos grasos, extracto del aceite de neem, gluconato de cobre, estreptomycin y oxitetraciclina. Cuando se desconozca la compatibilidad con otro producto, realice una prueba física previa para evitar efectos no deseados. Cuando requiera mezclarlo con otros productos, deberá hacerlo con aquellos registrados para los cultivos recomendados en su etiqueta.

Contraindicaciones: Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva.




Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO₃).
- Acondicione el agua para un pH de 5 a 6.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Realice mezclas, secuencias o alternancias, con fungicidas de diferentes modos de acción para minimizar la selección de resistencia.
- Mezcle con fungicidas Multisitio (código M) en la misma aplicación, y alterne con ingredientes activos de diferentes modos de acción.
- Limite el número de aplicaciones consecutivas en el programa de control.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de mediana (M) a gruesa (C).
- Tamaño de gota media a gruesa, de 177 µm a 349 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 20 a 30 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en el tejido a proteger.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimica.com

Elaboración:
 Actualización:
 Versión:
 Página:

11-Mar-2021.
 04-Jun-2026.
 03.
 1 de 1.