



Fungicida

Actividad Multi-sitio

Contacto- Preventivo



FICHA TÉCNICA - Protección Vegetal

RSCO-FUNG-0329-308-034-084

Clasificación: Plaguicida Químico.
Ingrediente Activo: Oxido cuproso.
Composición: 84.44% en peso, equivalente a 750.0 g i.a./kg.
Formulación: Gránulos Dispersables.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Oral: >5,000 mg/kg).

Patrón de Uso

Cultivo	Plaga	Dosis	Aplicaciones	Intervalo	Volumen
Cafeto (SL)	Ojo de gallo (<i>Mycena citricolor</i>) Mal de hilachas (<i>Corticium koleraga</i>) Roya (<i>Hemileia vastatrix</i>)	1.5 kg/ha	3	7	
Aguacate (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>) Roña (<i>Sphaceloma persea</i>)	1.0 kg/ha	3	7	
Manzano (SL)	Roña (<i>Venturia inaequalis</i>)	1.0 kg/ha	3	7	
Cítricos (Naranja, Limón, Toronjo, Mandarin, Lima) (SL)	Mancha grasienta (<i>Mycosphaerella citri</i>) Antracnosis o Tizón de la flor (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	1.0 - 1.3 kg/ha	3	7	
Calabaza (SL)	Mildiu (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	1.25 kg/ha	4	7	
Jitomate (SL)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.25 - 1.5 kg/ha	4	7	
Plátano (SL)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaella fijiensis</i>)	0.4 - 0.5 kg/ha	5	7	1,100-1,200 L de agua/ha

Tiempo de reentrada: 12 h.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 0 días (Sin Límite).

Límite máximo de residuos: Consultar las tolerancias establecidas para México y el país destino de los productos cosechados.

Intervalo entre aplicaciones: 7 días.


Preparación del producto: Llène con agua hasta la mitad, el tanque de la aspersora. En un recipiente aparte, y en poca agua, diluya la dosis recomendada del producto, agitando enérgicamente hasta formar una lechada. Agregue esta mezcla al tanque de la aspersora, bajo agitación. Llène finalmente hasta su capacidad total el tanque de la aspersora con agua, agitando. Asegúrese que el valor del pH oscile entre 6 y 7. Mantenga la mezcla en agitación durante el tratamiento.

Aplicación del producto: Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. El fungicida-bactericida contiene alto contenido en cobre metálico, y su formulación aumenta la humectación, suspensión, adherencia y persistencia, permitiendo su distribución uniforme en las superficies tratadas. Realice las aplicaciones en forma preventiva, al detectar las condiciones óptimas para la enfermedad. Inicie las aplicaciones al observar los primeros síntomas de las enfermedades, al inicio de la maduración de frutos.

Compatibilidad: No mezclarlo con agroquímicos de fuerte reacción alcalina, en caso que requiera mezclarlo con otro producto; realice pruebas a baja escala antes de aplicar las mezclas, con la finalidad de evitar efectos fitotóxicos.


Contraindicaciones: No aplicar ni manejar este producto sin el equipo de protección adecuado.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO_3).
- Acondicione el agua para un pH de 6 a 7.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Alternativa para manejar la resistencia, al prevenir o retrasar su desarrollo.
- Brinda niveles adicionales y espectro de control de enfermedades, aportando eficiencia con los fungicidas de sitios de acción específicos.
- Efectivo para realizar secuencias, alternancias o mezclas con fungicidas de modo de acción monositio.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de fina (F) a mediana (M).
- Tamaño de gota de 136 µm a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en el tejido a proteger.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimica.com

Elaboración:
Actualización:
Versión:
Página:

24-Sep-2012.
27-Oct-2022.
04.
1 de 1.