



# Fungicida

Mitosis-Citoesqueleto y Proteínas Motoras (Código 1)  
Sistémico, con traslocación acropétala – Preventivo y Curativo



## FICHA TÉCNICA – Protección Vegetal

RSCO-FUNG-0303-304-002-050

**Clasificación:** Plaguicida Químico.  
**Ingrediente Activo:** Benomilo.  
**Composición:** 50.00% en peso, equivalente a 500.00 g i.a./kg.  
**Formulación:** Polvo Humectable.  
**Toxicidad:** Categoría Toxicológica 4 (Oral: 2,000 mg/kg).

### Patrón de Uso

| Cultivos                                              | Plaga                                                                                                                                                                                               | Dosis                   | Aplicaciones | Intervalo | Volumen |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|---------|
| Aguacatero (30)                                       | Antracnosis ( <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> )<br>Fumagina ( <i>Capnodium</i> spp.)<br>Mancha de la hoja ( <i>Cercospora purpurea</i> )<br>Roña o sarna ( <i>Sphaceloma perseae</i> )        | 30 - 60 / 100 L de agua |              |           |         |
| Apio (7)                                              | Tizón o mancha foliar ( <i>Septoria apii</i> )<br>Tizón temprano ( <i>Cercospora apii</i> )                                                                                                         | 200 - 250 g/ha          |              |           |         |
| Ciruelo (SL)                                          | Fumagina ( <i>Capnodium</i> spp.)<br>Pudrición del fruto ( <i>Monilinia fructicola</i> )<br>Roña ( <i>Venturia cerasi</i> )                                                                         | 60 - 90 / 100 L de agua |              |           |         |
| CÍTRICOS: Limonero, Mandarinero, Naranja, Toronjo (1) | Antracnosis ( <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> )<br>Cenicilla ( <i>Oidium tingenianum</i> )<br>Moho gris ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                           | 60 - 90 / 100 L de agua |              |           |         |
| Col (SL)                                              | Pudrición de raíz y tallo ( <i>Sclerotinia</i> sp.)                                                                                                                                                 | 1200 g/ha               |              |           |         |
| CUCURBITÁCEAS: Calabacita, Melón, Pepino (SL)         | Antracnosis ( <i>Colletotrichum lagenarium</i> )<br>Cenicilla ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )<br>Moho gris ( <i>Botrytis cinerea</i> )<br>Pudrición gomosa ( <i>Mycosphaerella citrulina</i> )    | 300 - 350 g/ha          |              |           |         |
| Durazno (SL)                                          | Fumagina ( <i>Capnodium</i> spp.)<br>Pudrición del fruto ( <i>Monilinia fructicola</i> )<br>Roña ( <i>Cladosporium carpophilum</i> )<br>Tiro de munición ( <i>Coryneum beijerinckii</i> )           | 60 - 90 / 100 L de agua |              |           |         |
| Fresa (SL)                                            | Mancha de la hoja ( <i>Mycosphaerella fragariae</i> )<br>Moho gris ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                                                                      | 250 - 350 g/ha          |              |           |         |
| Frijol (14)                                           | Antracnosis ( <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> )<br>Moho blanco ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )<br>Moho gris ( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                    | 300 - 500 g/ha          |              |           |         |
| Jitomate (1)                                          | Antracnosis ( <i>Colletotrichum phomoides</i> )<br>Mancha de la hoja ( <i>Septoria lycopersici</i> )<br>Moho gris ( <i>Cladosporium fulvum</i> )<br>Pudrición del fruto ( <i>Botrytis cinerea</i> ) | 400 - 500 g/ha          |              |           |         |
| Mango (14)                                            | Antracnosis ( <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> )<br>Cenicilla ( <i>Oidium</i> spp.)<br>Fumagina ( <i>Capnodium</i> spp.)                                                                       | 40 - 60 / 100 L de agua |              |           |         |
| Manzano (SL)                                          | Fumagina ( <i>Capnodium</i> spp.)<br>Pudrición amarga ( <i>Glomerella cingulata</i> )<br>Roña ( <i>Venturia inaequalis</i> )                                                                        | 60 - 90 / 100 L de agua |              |           |         |
| Peral (SL)                                            | Fumagina ( <i>Capnodium</i> spp.)<br>Pudrición amarga ( <i>Glomerella cingulata</i> )<br>Sarna o roña ( <i>Venturia pirina</i> )                                                                    | 60 - 90 / 100 L de agua |              |           |         |
| Plátano (7)                                           | Sigatoka amarilla o chamusco ( <i>Mycosphaerella musicola</i> )<br>Sigatoka negra ( <i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. <i>Difformis</i> )                                                         | 60 - 90 / 100 L de agua |              |           |         |
| Soya (14)                                             | Antracnosis ( <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> )<br>Mancha de la hoja ( <i>Cercospora kikuchii</i> )<br>Tizón de tallos y vainas ( <i>Diaporthe phaseolorum</i> )                               | 300 - 500 g/ha          |              |           |         |
| Vid (7)                                               | Moho gris ( <i>Botrytis cinerea</i> )<br>Pudrición negra del fruto ( <i>Guignardia bidwellii</i> )                                                                                                  | 50 - 70 / 100 L de agua |              |           |         |

**Tiempo de reentrada:** 24 h.

**Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha:** Los indicados para cada cultivo (días).

**Límite máximo de residuos:** Consultar las tolerancias establecidas para México y el país destino de los productos cosechados.

**Intervalo entre aplicaciones:** 7, 14 y 21 días.


**Preparación del producto:** Acondicione el agua a un pH de 5 a 5.5 para una mejor acción del producto. Se debe preparar la mezcla agregando la dosis recomendada en una cubeta con un poco de agua y se agita hasta producir una suspensión uniforme. Vierta esta mezcla en el tanque de aplicación que contenga la suficiente cantidad de agua para asegurar un cubrimiento uniforme de las superficies. El volumen de agua a aplicar dependerá de la calibración del equipo aspersor.

**Aplicación del producto:** Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. Actúa en forma preventiva y curativa; inhibe la germinación de esporas, formación de aporios y haustorios, y el crecimiento del micelio. Aplíquelo contra etapas tempranas del desarrollo de la infección, cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Mantenga constante la dosis indicada, los intervalos de aplicación pueden variar dependiendo de la severidad de la enfermedad. Calibre el equipo de aplicación para asegurar un cubrimiento uniforme de las superficies tratadas. Realice las aplicaciones en horas tempranas del día o al atardecer. Agite la mezcla cada vez que recargue el aspersor para asegurar una mezcla homogénea.

**Compatibilidad:** No lo mezcle con aceites y productos de reacción alcalina. Cuando se desconozca la compatibilidad con otro producto, realice una prueba física previa para evitar efectos no deseados. Para las mezclas que se realicen con otros productos, deberán estar debidamente registrados.


**Contraindicaciones:** No aplique en horas de calor intenso ni cuando el viento exceda 15 km/h.

### Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de  $\text{CaCO}_3$ ).
- Acondicione el agua para un pH de 5 a 5.5.

### Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

### Condiciones para Aplicar



- No aplicar con con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.


### Secuencia para la Aplicación

| MdA Secuencia | MdA Alternancia | MdA Mezcla |
|---------------|-----------------|------------|
|---------------|-----------------|------------|

| Robust R      | Robust R      | Robust R      |
|---------------|---------------|---------------|
| 1a Aplicación | 2a Aplicación | 3a Aplicación |

- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Realice mezclas, secuencias o alternancias, con fungicidas de diferentes modos de acción para minimizar la selección de resistencia.
- Mezcle con fungicidas Multisitio (código M) en la misma aplicación, y alterne con ingredientes activos de diferentes modos de acción.
- Limite el número de aplicaciones consecutivas en el programa de control.

### Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de mediana (M) a gruesa (C).
- Tamaño de gota media a gruesa, de 177 µm a 349 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 20 a 30 gotas/cm<sup>2</sup>.
- Confirme la cobertura en el tejido a proteger.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimica.com

Elaboración:  
Actualización:  
Versión:  
Página:

02-Mar-2004.  
06-Oct-2022.  
03.  
1 de 1.