



Nematicida

Biológico con Múltiples Modos de Acción

Contacto- Parasita huevos y larvas, afecta el sistema nervioso y deforma estiletes.



FICHA TÉCNICA - Protección Vegetal

RSCO-NEMA-0907-X0007-009-0.40

Clasificación: Plaguicida Microbiano.
Ingrediente Activo: *Paecilomyces lilacinus*.
Composición: 0.40% en peso, equivalente a 3.6784 g i.a./L (1.0 x 10¹¹ UFC/L).
Formulación: Concentrado Emulsionable.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Oral: >5,000 mg/kg).

Patrón de Uso

Autorizado en Programas Inocuos o Certificados Orgánicos

Cultivo	Plaga	Dosis	Aplicaciones	Intervalo	Volumen
Berenjena, Chile, Chile habanero, Chile jalapeño, Jitomate, Papa, Pimiento morrón, Tabaco, Tomate de cáscara (SL)	Nemátodo agallador (<i>Meloidogyne sp.</i>)	4.0 L/ha	2	14 días	
Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (SL)	Nemátodo agallador (<i>Meloidogyne incognita</i>)	4.0 - 6.0 L/ha	2	14 días	10,000 L/ha
Piña (SL)	Nemátodo agallador (<i>Meloidogyne incognita</i>) Nematodo lesionador (<i>Pratylenchus spp.</i>)	8.0 L/ha	2	7 días	100 ml/planta

Tiempo de reentrada: Esperar a que seque el rocío de la aplicación (4 h).
Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 0 días (Sin Límite).
Límite máximo de residuos: Exento.
Intervalo entre aplicaciones: 7 y 14 días.


Preparación del producto: Agite el producto antes de usarlo. Utilice agua limpia para realizar la aplicación. Acondicione el pH del agua en el rango de 5.5 a 7.0, con dureza inferior a 75 ppm. La mezcla del producto con el agua debe realizarse cuando ésta tenga el pH adecuado. Utilice recipientes de plástico para realizar la mezcla. Vierte el producto directamente con el volumen total de agua para realizar la aplicación, determine previamente el volumen de agua por unidad de superficie a aplicar calibrando el equipo de aplicación, agite la mezcla cada vez que cargue el equipo de aplicación; cuando la aplicación se realice a través del sistema de riego por goteo, deberá verter el producto directamente en el volumen total de agua, o bien realizar la mezcla en un volumen de agua que permita aplicar el producto con el uso de un sistema de inyección (venturi), la cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración del sistema de riego en función del cultivo a tratar.

Aplicación del producto: Aplique la solución en aspersión directa, en drench, por inyección o sistema de riego por goteo, el mismo día de su preparación. Este hongo parasita los huevos y hembras de los nematodos con la participación de enzimas líticas causando deformaciones, destrucción de ovarios y reducción de la eclosión; produce toxinas que afectan el sistema nervioso y causan deformación en el estilete de los nemátodos. Aplique siempre por la tarde para no exponer al hongo a condiciones de temperatura y de radiación adversas. Aplíquelo al suelo en drench o a través del sistema de riego por goteo todo el ciclo de cultivo. Cuando la aplicación se realice a través del sistema de riego por goteo, deberá aplicarlo en el segundo tercio del riego.

Compatibilidad: Compatible con Bio-Die (argemónina, berberina, ricinina, α -terthienil), Nutripro Xtra-Ala (fertilizante orgánico), Progranix Nemicide 80 (extracto de aceite de *Azadirachta indica*), Probac BS (*Bacillus subtilis*), Probac BT (*Bacillus thuringiensis*). No lo mezcle con fungicidas ni productos de reacción alcalina, o que alteren el rango de pH de la mezcla. La adición de humectantes o aceites vegetales emulsionables produce un mayor efecto de producto, y protege al hongo de condiciones ambientales no óptimas. Evite el uso de coadyuvantes iónicos. Cuando se desconozca su compatibilidad con otros productos, se recomienda realizar una prueba previa a la aplicación.

Contraindicaciones: No lo exponga directamente a los rayos solares. Evite temperaturas superiores a los 30 °C durante tiempos prolongados. Durante periodos largos consérvolo bajo refrigeración a 2 °C a 9 °C sin llegar a congelarlo. Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté o amenace lluvia y cuando el viento favorezca la deriva.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO₃).
- Acondicione el agua para un pH de 5.5 a 7.0.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Alternativa para prevenir o retrasar el riesgo de resistencia.
- Brinda niveles adicionales y espectro de control de nematodos, aportando eficiencia con los nematocidas de sitios de acción específicos.
- Efectivo para realizar secuencias, alternancias o mezclas con nematocidas de diferentes modos de acción.

Densidad de la Cobertura



- Aplíquelo al suelo colocando el producto en el área radicular.
- El suelo deberá estar húmedo a capacidad de campo (CC) 1 o 2 días después de riego.
- Realizar la primera aplicación de 1 a 3 días después del trasplante.
- Aplicar en el segundo tercio del riego.
- Asegurar el bulbo de humedad y reparto del producto en el área radicular.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquímica.com

Elaboración: 13-Abr-2013.
 Actualización: 22-Ago-2022.
 Versión: 05.
 Página: 1 de 1.