



Uso Urbano

Insecticida y Acaricida
Contacto, Ingestión e Inhalación



FICHA TÉCNICA - Star NeemAcar CE

RSCO-MEZC-INAC-0104S-0427-009-70

Clasificación: Plaguicida Botánico.
Ingrediente Activo: Extracto de neem (*Azadirachta indica*) + extracto de canela (*Cinnamomum zeylanicum*).
Composición: 55.00% + 15.00% en peso, equivalente a 514.25 + 140.25 g i. a./L.
Formulación: Concentrado Emulsionable.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Verde).

Patrón de Uso

Insumo para el control de plagas en áreas urbanas, predios baldíos y vías de ferrocarril

Plaga	Nombre científico	Dosis
Arañas	<i>Latrodectus mactans</i> <i>Dolomedes fimbriatus</i> <i>Loxosceles reclusa</i> <i>Hadronyche modesta</i>	15 a 20 ml/2 L de agua
Jején	<i>Phlebotomus papatasi</i>	
Moscas	<i>Musca domestica</i> <i>Stomoxys calcitrans</i>	
Mosquitos	<i>Aedes aegypti</i> <i>Culex quinquefasciatus</i> <i>Anopheles albimanus</i>	15 a 20 ml/2 L de agua
Pulgas	<i>Pulex irritans</i> <i>Ctenocephalides canis</i> <i>Ctenocephalides felis</i>	15 a 20 ml/2 L de agua

Tiempo de reentrada: Esperar a que seque el rocío de la aplicación.

Intervalo entre aplicaciones: 7 días.


Método para preparar el producto: Agite el producto antes de usarlo. Utilice agua limpia para realizar la aspersión. Acondicione el agua a un pH de 5 a 6. Utilice recipientes plásticos para realizar la mezcla. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua en el orden adecuado de adición de los insumos que contendrá la mezcla. Mantener la agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea.

Aplicación del producto: No use el producto de forma diferente a lo recomendado en su etiqueta. Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Realizar las aplicaciones al observar las primeras infestaciones. Procure que el producto tenga contacto con los insectos, que el tamaño de gota y presión de aspersión permita la cobertura de sitios donde se localiza la plaga. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas.


Compatibilidad: Compatible con peróxido de hidrógeno, zinc y con productos que no modifique el rango de pH indicado. Incompatible con hidróxido de sodio. Para las mezclas que se realicen con otros productos se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.

Contraindicaciones: Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva.

Acondicionamiento del Agua




Orden de Mezcla del Producto




- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de fina (F) a mediana (M), de 136 µm a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en los tejidos donde se alojan las plagas.

