



Uso Urbano

Insecticida y Acaricida
Contacto



FICHA TÉCNICA - Star Orgánico

RSCO-URB-INAC-1106-X0066-009-18.0

Clasificación: Plaguicida Botánico.
Ingrediente Activo: Extracto de alcaloides (*Argemone mexicana*).
Composición: 18.00% en peso, equivalente a 179.766 g i. a./L.
Formulación: Concentrado Emulsionable.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Verde).

Patrón de Uso

Insumo para el control de plagas en áreas urbanas,
predios baldíos y vías de ferrocarril

Plaga	Nombre científico	Dosis
Alacranes	<i>Centruroides noxius</i> <i>Centruroides elegans</i> <i>Centruroides gracilis</i> <i>Centruroides limpidus tecomanus</i> <i>Centruroides suffusus</i> <i>Centruroides infamatus infamatus</i>	50 ml/L de agua
Arañas	<i>Latrodectus mactans</i> <i>Dolomedes fimbriatus</i> <i>Loxosceles reclusa</i> <i>Hadronyche modesta</i>	50 ml/L de agua
Cucaracha	<i>Blattella germanica</i>	50 ml/L de agua
Hormigas	<i>Liometopum</i> spp. <i>Monomorium pharaonis</i> <i>Tapinoma sessile</i> <i>Monomorium mínimum</i> <i>Solenopsis</i> spp. <i>Paratrechina longicornis</i> <i>Camponotus</i> spp. <i>Pheidole</i> spp. <i>Iridomyrmex humilis</i> <i>Crematogaster</i> spp.	50 ml/L de agua
Moscas	<i>Musca domestica</i> <i>Stomoxys calcitrans</i>	50 ml/L de agua
Mosquitos	<i>Aedes aegypti</i> <i>Culex quinquefasciatus</i> <i>Anopheles albimanus</i>	50 ml/L de agua

Tiempo de reentrada: Esperar a que seque el rocío de la aplicación.

Intervalo entre aplicaciones: 4 a 7 días.


Método para preparar el producto: Agite el producto antes de usarlo. Acondicione el agua a un pH de 6 a 7. Utilice recipientes plásticos para realizar la mezcla. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua en el orden adecuado de adición de los insumos que contendrá la mezcla. Mantener la agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea.

Aplicación del producto: No use el producto de forma diferente a lo recomendado en su etiqueta. Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Realizar las aplicaciones al observar las primeras infestaciones. Procure que el producto tenga contacto con las plagas; asimismo, que el tamaño de gota y presión de aspersión permitan la cobertura de los sitios donde se aloja. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas.

Compatibilidad: No lo mezcle con productos cuya compatibilidad no esté completamente comprobada.


Contraindicaciones: Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo o amenace lluvia y cuando el viento favorezca la deriva.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO_3).
- Acondicione el agua para un pH de 6 a 7.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Alternativa para prevenir o retrasar el riesgo de resistencia.
- No comparte un punto de acción común con otros compuestos y puede ser aplicado libremente.
- Efectivo para realizar secuencias, alternancias o mezclas con insecticidas de diferentes modos de acción.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de fina (F) a mediana (M), de 136 µm a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura los sitios donde se alojan las plagas.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquímica.com

Elaboración: 27-Feb-2023.
Actualización: 27-Feb-2023.
Versión: 01.
Página: 1 de 1.