



Fungicida

Mitosis- Citoesqueleto y Proteínas Motoras (Código 1)

Sistémico, con traslocación acropétala - Preventivo y Curativo de amplio espectro

FICHA TÉCNICA - Protección Vegetal

RSCO-FUNG-0369-309-002-070

Clasificación:
Ingrediente Activo:
Composición:
Formulación:
Toxicidad:

Plaguicida Químico.
Tiofanato de metilo.
70.00% en peso, equivalente a 700.00 g i.a./kg.
Polvo Humectable.
Categoría Toxicológica 4 (Oral: 2,000 mg/kg).

Patrón de Uso

Cultivos	Plaga	Dosis	Aplicaciones	Intervalo	Volumen
Apio (7)	Cenicilla (<i>Oidium</i> sp.) Moho blanco (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	0.7 - 1.0 Kg/ha			
Berenjena, Tomate, Tomate de Cáscara (21)	Pudrición de raíz y cuello (<i>Fusarium oxysporum</i>)	0.5 - 1.5 Kg/ha	2	14 días	950 - 1050 L/ha
Papa (14)				14 días	
Chile, Chile bell (7)				14 días	
Cebolla, Ajo, Cebollín, Espárrago (1)	Moho gris (<i>Botrytis allii</i>)	1.0 - 1.5 Kg/ha			
Chabacano (1)	Antracnosis (<i>Colletotrichum</i> sp.) Moho gris (<i>Botrytis</i> sp.) Pudrición morena (<i>Monilia fructicola</i>)	60 - 100 g/100 L de agua			
Ciruelo (1)	Antracnosis (<i>Colletotrichum</i> sp.) Moho gris (<i>Botrytis</i> sp.) Pudrición morena (<i>Monilia fructicola</i>)	60 - 100 g/100 L de agua			
Durazno (1)	Antracnosis (<i>Colletotrichum</i> sp.) Moho gris (<i>Botrytis</i> sp.) Pudrición morena (<i>Monilia fructicola</i>)	60 - 100 g/100 L de agua			
Fresa (1)	Cenicilla (<i>Sphaerotheca macularis</i>) Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.7 - 1.0 Kg/ha			
Frijol (14)	Moho blanco (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	0.7 - 1.0 Kg/ha			
Limón mexicano, Limón persa, Naranja, Lima, Tangerino, Toronjo, Mandarino, Pomelo (28)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	60 - 100 g/100 L de agua	2	14 días	400 - 500 L/ha
Mango (21)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	60 - 150 g/100 L de agua	2	14 días	350 - 450 L/ha
Manzano (1)	Antracnosis (<i>Colletotrichum</i> sp.) Moho gris (<i>Botrytis</i> sp.) Roña o sarna (<i>Spilocaea pomi</i>)	60 - 100 g/100 L de agua			
Melón (1)	Antracnosis (<i>Colletotrichum lagenarium</i>) Pudrición de tallo y raíz (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Pudrición radical (<i>Verticillium</i> sp.)	0.7 - 1.0 Kg/ha			
Nectarino (2)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>) Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>) Pudrición morena (<i>Monilia fructicola</i>)	60 - 100 g/100 L de agua			
Papa (SL)	Costra negra (<i>Rhizoctonia solani</i>) Pudrición radical (<i>Fusarium oxysporum</i>)	0.5 - 0.75 Kg/ha			
Pepino (1)	Antracnosis (<i>Colletotrichum lagenarium</i>) Pudrición de tallo y raíz (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Pudrición radical (<i>Verticillium</i> sp.)	0.7 - 1.0 Kg/ha			
Plátano (1)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. <i>difformis</i>)	0.3 - 0.4 Kg/ha			
Piña (30)	Pudrición de la raíz y cuello (<i>Fusarium oxysporum</i>)	3 - 5 Kg/ha	2	14 días	50 mL/planta 2000-2100 L de agua/ha.
Sandía (1)	Antracnosis (<i>Colletotrichum lagenarium</i>) Pudrición de tallo y raíz (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Pudrición radical (<i>Verticillium</i> sp.)	0.7 - 1.0 Kg/ha			
Trigo (14)	Cenicilla (<i>Erysiphe graminis</i>) Mancha de hoja y tallos (<i>Septoria tritici</i>)	0.5 - 1.0 Kg/ha			

Tiempo de reentrada: 24 h.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: Los indicados para cada cultivo (días).

Límite máximo de residuos: Consultar las tolerancias establecidas para México y el país destino de los productos cosechados.

Intervalo entre aplicaciones: 7 y 14 días.

Preparación del producto: Acondicione el agua a un pH de 5 a 5.5 para una mejor acción del producto. Se debe preparar la mezcla agregando la dosis recomendada en una cubeta con un poco de agua y se agita hasta producir una suspensión uniforme. Vierta esta mezcla en el tanque de aplicación que contenga la suficiente cantidad de agua. Para mayor penetración foliar es recomendable agregar un coadyuvante.


Aplicación del producto: Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. Este producto es tolerado por los cultivos, no causa daño a los cultivos su follaje, a los frutos a las dosis indicadas. Actúa de forma preventiva y curativa. Aplíquelo contra etapas tempranas del desarrollo del hongo, cuando se presentan los primeros síntomas de la enfermedad. La aplicación en el cultivo de papa será al fondo del surco al momento de la siembra. Mantenga constante la dosis indicada, los intervalos de aplicación pueden variar dependiendo de la severidad de la enfermedad. Calibre su equipo de aplicación para asegurar un cubrimiento uniforme de las superficies tratadas, asperjar hasta el punto de goteo. Realice las aplicaciones en horas tempranas del día o al atardecer. Agite la mezcla cada vez que recargue la aspersora para asegurar una mezcla homogénea.

Compatibilidad: No lo mezcle con aceites ni sustancias alcalinas. Cuando se desconozca la compatibilidad con otro producto, realice una prueba física previa para evitar efectos no deseados. Los productos con los que se mezcle deberán estar debidamente registrados.

Contraindicaciones: No aplique en soluciones de aspersión con pH superior a 7 debido a que puede sufrir degradación. Evite aplicarlo durante periodos de temperaturas superiores a 25° C, así como en suelos con textura arenosa para evitar lixiviación.




Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO₃).
- Acondicione el agua para un pH de 5 a 5.5.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar



- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.


Secuencia para la Aplicación

MdA Secuencia	MdA Alternancia	MdA Mezcla
---------------	-----------------	------------



- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Realice mezclas, secuencias o alternancias, con fungicidas de diferentes modos de acción para minimizar la selección de resistencia.
- Mezcle con fungicidas Multisitio (código M) en la misma aplicación, y alterne con ingredientes activos de diferentes modos de acción.
- Limite el número de aplicaciones consecutivas en el programa de control.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de mediana (M) a gruesa (C).
- Tamaño de gota media a gruesa, de 177 µm a 349 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 20 a 30 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en el tejido a proteger.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimica.com

Elaboración: 24-Jun-2012.
Actualización: 07-Sep-2023.
Versión: 03.
Página: 1 de 1.